



T A B L E A U
DE
L'ÉCOLE DE BOTANIQUE
DU
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

20248/B

42132
TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE,

PAR M. DESFONTAINES,

MEMBRE DE L'INSTITUT, ET PROFESSEUR DE BOTANIQUE.

A PARIS,

Chez J. A. BROSSON, Libraire, rue Pierre-Sarrazin, n° 6.

M. DCCC. IV.

Je préviens les CONTREFACTEURS et les DÉBITANS de Contre-
façons, que j'userai de tous mes droits.



AVERTISSEMENT.

LE Tableau que j'offre au Public renferme les noms latins et français des plantes cultivées dans le jardin et dans les serres du Muséum d'Histoire naturelle. Ce petit Ouvrage est particulièrement destiné à faciliter la correspondance avec les Étrangers, et à leur indiquer les végétaux qu'ils peuvent acquérir, et ceux dont ils peuvent enrichir le Muséum par des échanges réciproques.

J'ai suivi les familles naturelles de M. de Jussieu, établies depuis un grand nombre d'années dans l'École de Botanique, et dont les avantages se font sentir de jour en jour. Les espèces ont été disposées méthodiquement, et, autant qu'il m'a été possible, d'après leurs rapports, afin d'en faciliter l'étude, et d'avoir un plan fixe pour un second ouvrage dont celui-ci est le type, et qui ne tardera pas à paroître. Chaque espèce y sera accompagnée d'une description abrégée, pour l'instruction de ceux qui suivent le Cours public que je fais tous les ans.

Les noms des auteurs ont été rapportés à chaque plante avec toute l'exactitude dont je suis capable, et ce travail a demandé beaucoup de soins et de recherches. J'ai ajouté à plusieurs espèces des synonymes dont quelques-uns étoient difficiles à trouver, afin que les Botanistes évitent à l'avenir d'indiquer, comme espèces distinctes, des plantes qui sont les mêmes, quoique désignées dans divers ouvrages sous des noms différens. Celles qui sont annuelles, bisannuelles, vivaces ou ligneuses, ont été distinguées par les signes universellement adoptés, et j'ai noté par des abréviations dont je donne l'explication, celles qu'il faut abriter dans la serre chaude ou tempérée sous le climat de Paris. M. Thouin l'aîné a bien voulu se charger de revoir cette partie de mon travail, et d'y faire les changemens qu'il a

jugés convenables. M. Cels m'a donné des renseignemens utiles sur plusieurs plantes étrangères qu'il cultive dans son jardin ; et M. de la Marck m'a communiqué ses herbiers ; de sorte que j'ai pu comparer un grand nombre de plantes du jardin avec celles qu'il a décrites dans son Dictionnaire de Botanique , et que l'on peut compter sur l'exactitude des noms que j'ai donnés d'après lui.

J'ai desséché un individu de chaque espèce désignée dans mon Tableau , et j'ai écrit à côté le nom qu'elle y porte ; de manière qu'on pourra toujours en reconnoître l'identité , et même rectifier les erreurs de nomenclature qui pourroient m'être échappées. Cette précaution sera également utile pour vérifier facilement les plantes qui seront envoyées par les correspondans, et pour corriger, sans beaucoup de peine , les fautes inévitables qui se commettent chaque année dans l'École de Botanique, soit par la dissémination des graines d'une place dans une autre, soit par la transposition des étiquettes, ou autres accidens.

La collection de plantes vivantes cultivées au Muséum, et dont le nombre est de plus de six mille , sans y comprendre les variétés, est sans contredit une des plus riches de l'Europe ; elle offre un champ vaste à l'étude , et de grandes ressources à l'agriculture par les nombreuses distributions de graines que l'on y fait chaque année. Le jardin du Muséum est un dépôt où viennent se rendre toutes les richesses végétales que l'on peut se procurer des diverses parties du globe , et d'où elles se répandent dans nos départemens, chez les autres nations de l'Europe, et souvent même au-delà des mers. La France lui doit, depuis l'époque de sa création, un grand nombre d'arbres étrangers, de plantes économiques et d'agrément qui se sont multipliés sur son sol ; en un mot, cet Établissement, par son but d'utilité publique et par sa magnificence, est digne de la protection que le Gouvernement lui accorde.

EXPLICATION des signes et des abréviations.

⊙.... Annuelle.	am. m. Amérique méridionale (partie comprise entre les tropiques).
♂.... Bisannuelle.	n. esp. Nouvelle-Espagne.
ψ.... Vivace.	n. holl. Nouvelle-Hollande.
h.... Ligneuse.	(alim.) Alimentaire.
or.... Orangerie.	(écon.) Economique.
s. ch. Serre-chaude.	(méd.) Médicinale.
f.... France.	(orn.) Ornement.
eur... Europe.	(ven.) Vénéneuse.
as.... Asie.	
af.... Afrique.	
am. s. Amérique septentrionale.	

Noms d'Auteurs par abréviation.

all... Allioni.	l'her. L'Héritier.
andr. Andrews.	l.... Linnæus.
bill... Billardièr.	l. f... Linnæus filius.
bull. Bulliard.	mass. Masson.
cav... Cavanilles.	mich.. Michaux.
curt. Curtis.	mill... Miller.
dec... Decandolle.	murr. Murray.
desf.. Desfontaines.	pers.. Persoon.
forsk. Forskal.	retz.. Retzius.
haw. Haworth.	salisb. Salisbury.
hoff.. Hoffmann.	thunb. Thunberg.
h. k.. Hortus Kewensis.	vent.. Ventenat.
jacq. Jacquin.	vill... Villars.
juss.. Jussieu.	wald. Waldstein.
lmk.. Lamarek.	wild. Wildenow.
lapeyr. Lapeyrouse.	

ERRATA.

<i>Pagina</i>	14,	<i>linea</i>	50,	ÆGYLOPS,	<i>lege</i> ÆGILOPS.
	19,		5,	lacrima,	lacryma.
	28,		10,	POLYANTHES,	POLIANTHES.
	31,		36,	ATHOLIZA,	ANTHOLYZA.
	35,		6,	HEDICHUM,	HEDYCHIMUM <i>retz.</i>
	43,		52,	circinnatus,	circinatus.
	53,		8,	MONGORIUM,	MOGORIUM.
	71,		23,	MESSERCHMIDIA,	MESSERSCHMIDIA.
	77,		9,	APOCINEÆ,	APOCYNEÆ.
	100,		25,	ægyptica,	ægyptiaca.
	102,		28,	pyrenæus <i>lmk</i> ,	pyrenæus.
	113,		29,	POEDERIA,	PÆDERIA.
	121,		14,	<i>Herbaceæ</i> ,	<i>Herbacea.</i>
	133,		40,	KAKILE,	CAKILE.
	136,		16,	HYPOCRATEA,	HIPPOCRATEA.
	159,		41,	AGROSTEMA,	AGROSTEMMA.
	170,		2,	FUSCHIA,	FUCHSIA.
	174,		5,	MESPYLUS,	MESPILUS.
	186,		52,	RAPHNIA,	RAFNIA.
	197,		22,	verpertilionis,	vespertilionis.
	198,		10,	latisiliqua,	latisiliqua.
	200,		29,	SPAPHYLEA,	STAPHYLEA.
	203,	16 et	17,	<i>thumb</i> ,	<i>thumb.</i>
	211,		11,	cynocrambre,	cynocrambe.
	222,		17,	gangeticum <i>deleatur.</i>	

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

DE PARIS.

CLASSIS I.

ACOTYLEDONES.

ORDO I.

FUNGI.

I. Fungi pileo destituti;

MUCOR
mucedo *L.*

TRICHIA
cinnabaris *Bull.*

RETICULARIA
hortensis *Bull.*

SPHÆRIA
disciformis *Hoff.*

ÆCIDIUM
berberidis *Pers.*

LYCOPERDON
bovista *L.*
stellatum *L.*

TUBER
cibarium *Bull.*

CLATHRUS
cancellatus *L.*

CLASSE I.

LES ACOTYLÉDONS.

ORDRE I.

LES CHAMPIGNONS.

I. Champignons sans chapeau:

MOISSISSURE
commune. f.

CAPILLINE
rouge. f.

RÉTICULAIRE
des jardins. f.

SPHÆRIA
en disque. f.

ÆCIDIUM
du Berberis. f.

LYCOPERDON
vesse de loup. f.
étoilé. f.

TRUFFE
comestible. f. (alim.)

CLATHRE
à réseau. f.

NIDULARIA
striata *Bull.*

PEZIZA
cochleata *L.*

CLAVARIA
ophioglossoides *L.*
coralloïdes *L.*

II. *Fungi pileati.*

PHALLUS
esculentus *L.*
impudicus *L.*

HELVELLA
mitra *L.*

AURICULARIA
reflexa *Bull.*

HYDNUM
repandum *L.*

BOLETUS
igniarius *L.*
versicolor *L.*

AGARICUS
campestris *L.*
aurantiacus *Bull.*

ORDO II.

ALGÆ.

BYSSUS
aurea *L.*
botryoïdes *L.*

TREMELLA
atrovirens *Bull.*

CONFERVA
rivularis *L.*

ULVA
intestinalis *L.*

FUCUS
nodosus *L.*

LICHEN
rugosus *L.*
parietinus *L.*
ciliaris *L.*

NIDULAIRE
striée. *F.*

PÉZIZE
limaçon. *F.*

CLAVAIRE
ophioglosse. *F.*
corail. *F.*

II. Champignons à chapeau.

MORILLE
comestible. *F.* (alim.)
fétide. *F.*

HELVELLE
mitrée. *F.*

AURICULAIRE
réfléchie. *F.*

HYDNUM
festonné. *F.*

BOLET
amadouvier. *F.* ψ (écon. méd.)
bigarré. *F.* ψ

AGARIC
des champs. *F.*
orange. *F.* (alim.)

ORDRE II.

LES ALGUES.

BYSSUS
doré. *F.*
vert. *F.*

TREMELLE
verte *F.*

CONFERVE
des ruisseaux. *F.*

ULVE
intestinale. *F.* ⊙

VAREC
vésiculeux. *F.*

LICHEN
ridé. *F.*
des murs. *F.*
cilié. *F.*

caninus *L.*
 deustus *L.*
 pyxidatus *L.*
 raugiferinus *L.*

des chiens. F.
charbonné. F.
en coupe. F.
des rennes. F.

ORDO III.

H E P A T I C Æ.

RICCIA
 glauca L.
 BLASIA
 pusilla L.
 ANTHOCEROS
 lævis L.
 JUNGERMANNIA
 tamarisci L.
 MARCHANTIA
 polymorpha L.

ORDO IV.

M U S C I.

SPLACHNUM
 ampullaceum L.
 POLYTRICHUM
 commune L.
 HYPNUM
 sericeum L.
 FONTINALIS
 antipyretica L.
 BRYUM
 scoparium L.
 PHASCUM
 acaulon L.
 BUXBAUMIA
 aphylla L.
 SPHAGNUM
 palustre L.
 LYCOPodium
 clavatum L.

ORDRE III.

LES HÉPATIQUES.

RICCIE
 glauque. F.
 BLASIE
 naine. F.
 ANTHOCÉROS
 lisse. F.
 JUNGERMANNIE
 tamarix. F.
 HÉPATIQUE
 de fontaine. F. ♀

ORDRE IV.

LES MOUSSES.

SPLACHNUM
 vésiculeux. F. ♀
 POLYTRIC
 commun. F. ♀
 HYPNUM
 soyeux. F. ♀
 FONTINALE
 des ruisseaux. F. ♀
 BRYUM
 à balais. F. ♀
 PHASCUM
 sans tige. F.
 BUXBAUMIA
 sans feuill. F.
 SPHAGNUM
 des marais. F. ♀
 LYCOPODE
 à massue. F. ♀ (arts.)

ORDO V.

FILICES.

I. *Fructificatio in spicas distinctas disposita.*

OPHIOGLOSSUM
vulgatum L.

ONOCLEA
sensibilis L.

OSMUNDA
lunaria L.
regalis L.
spicant L.
crispa L.

II. *Fructificatio in altera foliorum superficie.*

ACROSTICHUM
septentrionale L.
aurum L.
marantæ L.
ilvense Vill.

POLYPODIUM.

1. *Fronde indivisa.*

crassifolium L.

2. *Fronde pinnatifida.*

vulgare L.
cambricum L.
aureum L.

3. *Fronde trifoliata.*

trifoliatum L.

4. *Fronde pinnata.*

lonchitis L.
reticulatum L.

5. *Fronde sub-bipinnata.*

phægopteris L.
fragrans L.
dilatatum Hoff.
fontanum L.
cristatum L.
filix mas L.
filix foemina L.

ORDRE V.

LES FOUGÈRES.

I. *Fructification en épis distincts.*

OPHIOGLOSSE
commune. F. ψ

ONOCLEA
sensible. Am. s. ψ

OSMONDE
lunaire. F. ψ
officinale. F. ψ (méd.)
spicant. F. ψ
crépue. F. Alpes. ψ

II. *Fructification sur le dos des feuilles.*

ACROSTIC
du Nord. F. ψ
dore. Am. m., s. ch. ψ
de Maranta. F. Alpes. ψ
velu. F. Alpes. ψ

POLYPODE.

1. *Feuilles entières.*

à feuill. épaisses. Am. m., s. ch. ψ

2. *Feuilles presque pennées.*

commun. F. ψ (méd.)
lacinié. F. ψ
doré. Am. m., s. ch. ψ

3. *Feuilles ternées.*

à trois feuill. Am. m., s. ch. ψ

4. *Feuilles pennées.*

lonchitis. F. ψ
à réseau. Am. m., s. ch. ψ

5. *Feuilles presque deux fois pennées.*

phægopteris. F. ψ
odorant. F. Alpes. ψ
dilaté. F. ψ
de fontaine. F. ψ
à crêtes. F. ψ
fougère mâle. F. (méd.)
fougère femelle. F. ψ

thelipteris L.
aculeatum L.
bulbiferum L.
rhæticum L.

6. *Aculeata.*

arboreum L.

7. *Fronde supra-decomposita.*

dryopteris L.
myrrhidifolium Will.

ASPLENIUM.

1. *Fronde simplici.*

serratum L.
scolopendrium L.
 — *crispum*.
hemionitis L.

2. *Fronde pinnatifida.*
ceterach L.

3. *Fronde pinnata.*

denticulatum.
trichomanes L.
adiantum nigrum L.
risa muraria L.
marinum L.

BLECHNUM

occidentale L.

PTERIS

aquilina L.
cretica L.
longifolia L.

ADIANTHUM.

1. *Fronde simplici.*

reniforme L.

2. *Fronde supra-decomposita.*

pedatum L.
capillus veneris L.

DAVALLIA

canariensis Smith.

TRICHOMANES

membranaceum L.

thelipteris. F. ψ
à aiguillons. F. ψ
bulbifère. F. ψ
de Rhétie. F. Alpes. ψ

6. Pétioles garnis d'épines.

en arbre. Am. m., s. ch. ψ

7. Feuillage décomposé.

dryopteris. F. ψ
à feüill. de myrrhis. F. Alp. ψ

SCOLOPENDRE.

1. Feuilles simples.

en scie. Am. m., s. ch. ψ
officinale. F. ψ (méd.)
 — *crépue*.
hemionitis. F. m., or. ψ

2. Feuilles presque pennées.

céterac. F. ψ (méd.)

3. Feuilles pennées.

dentelée. Am. s. ψ
trichomanès. F. ψ
capillaire noir. F. ψ (méd.)
des murailles. F. ψ (méd.)
maritime. F. ψ

BLECHNUM

d'Occident. Am. m., s. ch. ψ

PTÉRIS

commun. F. ψ
de Crète. or. ψ
à feüill. longues. Am. m., s. ch. ψ

ADIANTHUM.

1. Feuilles simples.

reniforme. canaries., or. ψ

2. Feuilles décomposées,

de Canada. Am. s. ψ (méd.)
Capillaire de Montpellier. F.,
 or. ψ (méd.)

DAVALLIA

des Canaries. canaries., or. ψ

TRICHOMANÈS

membraneux. Am. m., s. ch. ψ

III. *Anthera strobilo imposita*, pistilla a staminibus segregata.

III. Fleurs en chatons, pistils séparés des étamines.

ZAMIA

cycadis L.
furfuracea H. K.
debilis H. K.
integrifolia H. K.

ZAMIA

des Hottent. cap., s. ch. ♀
furfuracé. inde., s. ch. ♀
foible. inde., s. ch. ♀
à feuell. entières. AM. S., or. ♀

CYCAS

circinalis L.
revoluta L.
Ridlei.

CYCAS

arrondi. inde, s. ch. ♀ (alim.)
roulé. chine, s. ch. ♀
de Riedlé. N. HOLL., s. ch. ♀

IV. *Anthera pistillis mixta in eodem involucro.*

IV. Anthères mêlées avec les pistils dans une enveloppe commune.

PILULARIA

globulifera L.

PILULAIRE

à globules. F. ♀

MARSILEA

quadrifolia L.

MARSILEA

à quatre feuell. F. ♀

V. *Plantæ filicibus affines, foliis non convolutis.*

V. Plantes qui ont de l'affinité avec les fougères, et dont les feuilles ne sont pas roulées.

SALVINIA

natans.

SALVINIA

flottant. F.

ISOETES

lacustris L.

ISOËTES

des marais. F. m. ♀

EQUISETUM

arvense L.
sylvaticum L.
palustre L.
fluviale L.
hyemale L.

PRÉLE

des champs. F. ♀ (arts.)
des bois. F. ♀
des marais. F. ♀
des rivières. F. ♀
d'hiver. F. ♀

ORDO VI.

NAIADES.

HIPPURIS

vulgaris L.

HIPPURIS

aquatique. F. ♀

CHARA

vulgaris L.
hispida L.
flexilis L.

CHARA

commun. F. ☉
hérissé. F. ☉
flexible. F. ☉

CERATOPHYLLUM

submersum L.
demersum L.

CERATOPHYLLUM

à fruit lisse. F. ♀
à fruit épineux. F. ♀

NAIAS

- marina L.
— angustifolia.

SAURURUS

- cernuus L.

POTAMOGETON

- natans L.
perfoliatum L.
densum L.
lucens L.
crispum L.
compressum L.
pectinatum L.
gramineum L.
pusillum L.

RUPPIA

- maritima L.

ZANICHELLIA

- palustris L.

CALLITRICHE

- verna L.
— autumnalis.

LEMNA

- polyrhiza L.
minor L.
— gibba.
trisulca L.

NAIADE

- aquatique. F. ψ
— à feuell. étroites.

SAURURUS

- incliné. Am. s. ψ

POTAMOGETON

- flottant. F. ψ
perfolié. F. ψ
bifurqué. F. ψ
luisant. F. ψ
crépu. F. ψ
comprimé. F. ψ
pectiné. F. ψ
à feuell. de gramen. F. ψ
grêle. F. ψ

RUPPIA

- maritime. F. ψ

ZANICHELLE

- des marais. F. ⊙

CALLITRIC

- printanier. F. ⊙
— d'automne. ⊙

LEMNA

- à larges feuell. F. ⊙
à petites feuell. F. ψ
— gibbeuse.
à trois sillons. F. ψ

CLASSIS II.

MONOCOTYLEDONES.

(stamina hypogyna.)

ORDO I.

AROIDEÆ.

I. Spadix spatha involutus.

ZOSTERA

- marina L.

CLASSE II.

MONOCOTYLÉDONS.

(étamines sous le pistil.)

ORDRE I.

LES AROÏDES.

I. Spadix entouré d'un spathe.

ZOSTERA

- maritime. F. ψ

ARUM.

1. *Acaulia, foliis compositis.*

dracunculus L.

dracontium L.

triphyllum L.

2. *Acaulia, foliis simplicibus.*

maculatum L.

italicum *mk.*

arisarum L.

colocasia L.

pictum. L. f.

tenuifolium L.

muscivorum L. f.

divaricatum L.

trilobatum L.

CALADIUM *vent.*1. *Acaulia.*

sagittæfolium.

violaceum.

bicolor.

helleborifolium.

2. *Caulescentia.*

arborescens.

variegatum.

CALLA

æthiopica L.

palustris L.

DRACONTIUM

pertusum L.

POTHOS

crassinervia Jacq.

scolopendrioides.

II. *Spadix spatha destitutus.*

ACORUS

calamus L.

gramineus H. K.

ARUM.

1. Point de tiges, feuilles composées.

serpenteire. F. ψ (méd.)*dracontium.* Am. m., s. ch. ψ*à trois feuell.* Am. s. ψ

2. Point de tige, feuilles simples.

maculé. F. ψ (méd.)*d'Italie.* ψ*capuchon.* F. m., or. ψ*colocase.* inde, s. ch. ψ (alim.)*veiné.* minorque, or. ψ*à feuell. étroites.* F. m., or. ψ*gobbe-mouche.* minorque., or. ψ*divergent.* inde, s. ch. ψ*trilobé.* inde, s. ch. ψ

CALADIUM.

1. Point de tige.

hasté. Am. m., s. ch. ψ*violet.* Am. m., s. ch. ψ*bicolor.* Buénos-Ayres., s. ch. ψ*à feuell. d'helléb.* Am. m., s. ch. ψ

2. Une tige.

en arbre. Am. m., s. ch. ψ*moncheté.* Am. m., s. ch. ψ

CALLA

d'Ethiopie. Afr., or. ψ (orn.)*des marais.* F. ψ

DRACONTIUM

perforé. Am. m., s. ch. ψ

POTHOS

à grosse nervure. Am. m., s. ch. ψ*à feuell. de scolopendre.* Am. m.,

s. ch. ψ

II. Spadix sans spathe.

ACORUS

aromatique. F. ψ (méd.)*à feuell. étroites.* chine, s. ch. ψ

ORDO II.

TYPHÆ.

TYPHA

- latifolia L.
angustifolia L.
minima Roth.

SPARGANIUM

- erectum L.
simplex Curt.
natans L.

ORDO III.

CYPEROIDEÆ.

I. Flores monoici.

CAREX.

1. Spica unica simplici.

- dioica L.
pulcaris L.

2. Spicis androgynis.

- arenaria L.
tenella Thunb.
ovalis Good.
vulpina L.
muricata L.
stellulata Good.
divulsa Good.
curta Good.
elongata L.
brizoides L.
paniculata L.
teretiuscula Good.
remota L.

3. Spicis sexu distinctis femineis sessilibus.

- digitata L.
flava L.
œderi Roth.
montana L.
tomentosa L.
præcox Jacq.
filiformis L.
distans L.

ORDRE II.

LES MASSÈTES.

MASSÈTE

- à larges fenill. F. ψ
à fenill. étroites. F. ψ
petite. F. ψ

RUBAN-D'EAU

- à tige droite. F. ψ
à tige simple. F. ψ
flottant. F. ψ

ORDRE III.

LES SOUCHETS.

I. Fleurs monoïques.

CAREX.

1. Un seul épi simple.

- dioïque. F. ψ
pulcaire. F. ψ

2. Epis androgynes.

- des sables. F. ψ
délicat. F. ψ
ovale. F. ψ
compacte. F. ψ
hérissé. F. ψ
étoilé. F. ψ
séparé. F. ψ
tronqué. F. ψ
allongé. F. ψ
brizoïde. F. ψ
paniculé. F. ψ
cylindrique. F. ψ
écarté. F. ψ

3. Epis femelles sessiles et séparés des mâles.

- aigité. F. ψ
jaune. F. ψ
d'œder. F. ψ
de montagne. F. ψ
coïonneux. F. ψ
précoce. F. ψ
filiforme. F. ψ
distant. F. ψ

4. *Spicis sexu distinctis , femineis pedunculatis.*

argentea vill.
panicea L.
sylvatica Huds.
pallescens L.
plantaginea Lmk.
pseudocyperus L.
depauperata Good.

5. *Spicis sexu distinctis masculis pluribus.*

cespitosa L.
glauca scop.
stricta Good.
riparia Good.
paludosa Good.
acuta Good.
vesicaria L.
ampullacea Good.
hirta L.
hordeistichos vill.

II. *Flores hermaphroditi.*

SCHOENUS.

1. *Culmo tereti.*

mariscus L.
mucronatus L.
nigricans L.
fuscus L.

2. *Culmo triquetro.*

compressus L.
albus L.

ERIOPHORUM

polystachion L.
angustifolium Roth.
vaginatum L.

SCIRPUS.

1. *Spica unica,*

articulatus L.
palustris L.
cespitosus L.
acicularis L.
fluitans L.
ovatus Roth.
campestris Wild.

4. *Epis femelles séparés des mâles et portés sur des pédoncules.*

argenté. F. ψ
faux panis. F. ψ
des bois. F. ψ
pâle. F. ψ
à feuil. de plantain. Am. s. ψ
faux souchet. F. ψ
à fruits rares. F. ψ

5. *Plusieurs épis mâles séparés des femelles.*

gazonnant. F. ψ
glauque. F. ψ
serre. F. ψ
des rivages. F. ψ
des marais. F. ψ
aigu. F. ψ
vésiculeux. F. ψ
renflé. F. ψ
velu. F. ψ
épi d'orge. F. ψ

II. *Fleurs hermaphrodites.*

SCHÆNUS.

1. *Chaume cylindrique.*

des étangs. F. ψ
acéré. F. ψ
noir. F. ψ
brun. F. ⊙

2. *Chaume triangulaire.*

comprimé. F. ψ
blanc. F. ψ

LINAIGRETTE.

à épis. F. ψ
à feuil. étroites. F. ψ
engainé. F. ψ

SCIRPE.

1. *Un seul épi.*

articulé. inde, s. ch. ψ
des marais. F. ψ
gazonnant. F. ψ
aiguille. F. ψ
flottant. F. ψ
ovale. F. ψ
des champs. F. ψ

2. *Culmo tereti*, *polystachio*.

setaceus L.
supinus L.
lacustris L.
holoschoenus L.
romanus L.
australis Lmk.

3. *Culmo triquetro*, *polystachio*.

mucronatus L.
maritimus L.
sylvaticus L.
annuus All.

2. Chaume cylindrique , à plusieurs épis :

sétiforme. F. ψ
conché. F. ψ
des étangs. F. ψ
à globules. F. m., or. ψ
romain. F. m., or. ψ
austral. F. m., or. ψ

3. Chaume triangulaire , à plusieurs épis.

piquant. F. m., or. ψ
maritime. F. ψ
des bois. F. ψ
annuel. F. ⊙

CYPERUS.

1. *Culmo tereti*.

articulatus L.

2. *Culmo triquetro*.

viscosus Swartz.
longus L.
tenuiflorus Jacq.
esculentus L.
eragrostis Lmk.
flavescens L.
fuscus L.
pannonicus Jacq.
papyrus L.
flabelliformis Rottb.

SOUCHET.

1. Chaume cylindrique.

articulé. inde, s. ch. ψ

2. Chaume triangulaire.

visqueux. Am. m., s. ch. ψ
odorant. F. ψ (écon. méd.)
à petites fleurs. inde, s. ch. ψ
comestible. orient., or. ψ
amourette. Am. m., s. ch. ψ
jaunâtre. F. ψ
brun. F. ψ
de Hongrie. ψ
papyrus. Égypte, s. ch. ψ
éventail. inde, s. ch. ψ

KILLINGIA

triceps L.

KILLINGIA.

à trois têtes. Am. m., s. ch. ⊙

ORDO IV.

GRAMINEÆ.

I. *Styli* 2, *stamina* 1-2.

ANTHOXANTHUM
odoratum L.

CRYPsis

aculeata H. K.
schoenoides H. K.

II. *Styli* 2, *stamina* 3, *gluma* uniflora.

ALOPECURUS

utriculatus.
bulbosus L.

ORDRE IV.

LES GRAMINÉES.

I. 2 styles, 1 ou 2 étamines.

FLOUVE

odorante. F. ⊙

CRYPsis

piquant. F. m. ψ
faux schoenus. F. m. ψ

II. 2 styles, 3 étamines, calice à une fleur.

ALOPÉCURE

à utricles. F. ⊙
bulbeux. F. ψ

pratensis L.
 geniculatus L.
 gerardi Vill.

PHLEUM

pratense L.
 nodosum L.
 alpinum L.
 arenarium L.

LEERSIA

oryzoides Willd.

PHALARIS

aspera Retz.
 phleoides L.
 minor Retz.
 canariensis L.
 paradoxa L.
 cruciformis L.
 arundinacea L.
 — picta.

PASPALUM

membranaceum Lmk.
 stoloniferum Bosc.
 sanguinale.
 dactylon.

PANICUM

1. Flores spicati.

verticillatum L.
 viride L.
 glaucum L.
 maritimum Lmk.
 italicum L.
 crus-galli L.
 colonum L.

2. Flores paniculati.

plicatum Lmk.
 proliferum Lmk.
 virgatum L.
 coloratum L.
 capillare L.
 latifolium L.
 arborescens L.

MILIUM

paradoxum L.
 effusum L.
 ligidigerum L.

des prés. F. ♀
 geniculé. F. ♀
 de Gérard. F. ♀

FLÉAU

des prés. F. ♀
 bulbenx. F. ♀
 des Alpes. F. ♀
 des sables. F. ☉

LEERSIA

des marais. F. ♀

ALPISTE

rude. F. ☉
 fléau. F. ♀
 ninenre. orient. ☉
 des Canaries. Afr. ☉
 rongée. orient. ☉
 chenillette. sibérie. ☉
 roseau. F. ♀
 — panachée. ♀

PASPALUM

membraneux. Pérou, s. ch. ♀
 rampant. Pérou. ☉
 pourpre. F. ☉
 chiendent. F. ♀

PANIS

1. Fleurs en épis.

verticillé. F. ☉
 vert. F. ☉
 glauque. F. ☉
 maritime. ☉
 d'Italie. inde. ☉ (alim.)
 piè de pontle. F. ☉
 tacheté. inde. ☉

2. Fleurs en panicule.

plissé. Am. m., s. ch. ♀
 prolifère. Am. s. ♀
 effilé. Am. s. ♀
 coloré. Égypte. ☉
 capillaire. Am. s. ☉
 à larges semill. Am. m., s. ch. ♀
 calmet. inde, s. ch. ♀

MIL

noir. F. ♀
 étalé. F. ♀
 tuberculeux. F. ☉

AGROSTIS.

1. *Aristatæ.*

spica venti L.
interrupta L.
miliacea L.
canina L.

2. *Muticæ.*

dispar Mich.
cornucopiæ Lmk.
trichodium laxiflorum. Mich. }
stolonifera L.
alba L.
vulgaris Smith. }
capillaris Leers. }
dulcis.
pumila L.
pungens L.
mexicana L.
tenacissima Jacq.
minima L.

POLYPOGON Desf.
monspeliense.

STIPA

pennata L.
ukranensis Lmk.
aristella L.
junceæ L.
tenacissima L.
tortilis Desf.

SACCHARUM

officinarum L.
 — *violaceum.*
cylindricum L.
ravennæ L.

LAGURUS

ovatus L.

III. *Stili* 2, *stamina* 3, *gluma* uni aut
multiflora, *flores* polygami.

HOLCUS

spicatus L.
sorghum L.
saccharatus L.
halepensis L.
lanatus L.
mollis L.

AGROSTIS

1. Fleurs garnies d'arêtes.

des moissons. F. ☉
interrompu. F. ☉
faux millet. F. ♀
des chiens. F. ♀

2. Fleurs sans arêtes.

disparate. Am. s. ♀
corne d'abondance. Am. s. ♂
traçant. F. ♀
blanc. F. ♀
commun. F. ♀
doux. orient. ☉
nain. F. ♀
piquant. F. m. ♀
du Mexique. Am. m. ♀
à feuil. dures. inde, s. ch. ♀
filiforme. F. ☉

POLYPOGON

de Montpellier. F. m. ☉

STIPA

penniforme. F. m. ♀
d'Ukraine. ♀
à petites barbes. F. m. ♀
jonciforme. F. ♀
spart. esp., or. ♀ (arts.)
tordu. barbaric. ☉

SUCRE

officinal. inde, s. ch. ♀ (écon.)
 — *violet.*
cylindrique. F. m., or. ♀
de Ravenne. Italie, or. ♀

LAGURUS

ovale. F. m. ☉

III. 2 styles, 3 étamines, calice à une ou
 plusieurs fleurs, fleurs polygames.

HOLCUS

à épis. inde. ☉
sorgo. inde. ☉
sucré. inde ☉
d'Alep. syrie. ♀
laineux. F. ♀
velouté. F. ♀

ANDROPOGON

contortum L.
 provinciale Lmk.
 ischœnum L.
 annulatum Vahl.
 bicorné L.
 hirtum L.
 distachion L.
 barbatum L.
 gryllus L.
 schœnanthus L.

ANTHISTIRIA

ciliata L. f.

CHLORIS Swartz.

petræa Swartz.
 ciliata Swartz.
 scoparia.
 cynos. scoparius Lmk. }
 curtipendula Mich.

TRIPSACUM

hermaphroditum L.
 dactylœides L.

TRAGUS Haller.

racemosus.

CENCHRUS

echinatus L.
 ciliaris L.

ECHINARIA Desf.

capitata.

ÆGYLOPS

ovata L.
 triuncialis L.
 squarrosa L.

ROTTBOLLIA

ineurva L.

IV. *Styli 2, stamina 3, gluma bi aut triflora, flores hermaphroditi.*

AIRA

cespitosa L.
 flexuosa L.
 caryophyllea L.
 præcox L.
 minuta L.
 canescens L.
 pubescens Vahl.
 aquatica L.

ANDROPOGON

contourné, inde. ♀
 de Provence. F. m. ♀
 digité. F. ♀
 annulaire. égypte.
 bicorné. Am. m., s. ch. ♀
 hérissé. F. m. ♀
 à deux épis. F. m. ♀
 barbu, inde. ☉
 paniculé. F. m. ♀
 jonc-odorant, inde, s. ch. ♀ (m.)

ANTHISTIRE

ciliée, inde. ♂

CHLORIS

des rochers. Am. m., s. ch. ♀
 ciliée. Am. m., s. ch. ♀
 à balais, inde ☉
 à fleurs pendantes. Am. s. ♀

TRIPSACUM

hermaphrodite. Am. m. ☉
 monoïque. Am. s. ♀

TRAGUS

à grappes. F. ☉

CENCHRUS

hérissé. Am. m. ☉
 cilié. Af. ☉

ECHINARIA

à fleurs en tête. F. m. ☉

ÆGYLOPS

ovale. F. ☉
 à longs épis. F. ☉
 rude. Barb.. ☉

ROTTBOLLIA

arqué. F. ☉

IV. 2 styles, 3 étamines, calice à deux ou trois fleurs, fleurs hermaphrodites.

AIRA

tonffu. F. ♀
 tortueux. F. ♀
 étalé. F. ☉
 printanier. F. ☉
 filiforme. F. ☉
 blanchâtre. F. ♀
 pubescent. F. m. ☉
 aquatique. F. ☉

MELICA

ciliata L.
lanuginosa.
pyramidalis Lm
uniflora Retz.
nutans L.
altissima L.
cœrulea L.

V. *Styli 2, stamina 3, glumæ multifloræ, flores glomerati.*

DACTYLIS

cynosuroïdes L.
glomerata L.

VI. *Styli 2, stamina 3, glumæ multifloræ supra rachim densè spicata.*

SESLERIA

cœrulea.

CYNOSURUS

cristatus L.
echinatus L.
durus L.
aureus L.

ELEUSINÉ Gært.

ægyptiaca.
indica
coracana.

LOLIUM

tenue L.
temulentum L.
multiflorum Lmk.
perenne L.

ELYMUS

arcnarius L.
giganteus Vahl.
virginicus L.
sibiricus L.
ramosus.
histris L.
hordeiformis.

HORDEUM

vulgare L.
 — *celeste*.
hexastichon L.
zeocriton L.

MELICA

cilié. F. ψ
lanugineux. F. m. ψ
pyramidal. F. m. ψ
uniflore. F. ψ
à fleurs penchées. F. ψ
élevé. sibérie. ψ
bleuâtre. F. ψ

V. 2 styles, 3 étamines, calice à plusieurs fleurs, fleurs agglomérées.

DACTYLIS

cynosure. Am. s. ψ
aggloméré. F. ψ

VI. 2 styles, 3 étamines, calice à plusieurs fleurs disposées le long de l'axe en épis serrés.

SESLERIA

bleuâtre. F. ψ

CYNOSURUS

des prés. F. ψ
hérissé. F. m. ⊙
roide. F. ⊙
jaune. F. m. ⊙

ELEUSINÉ

d'Egypte. ⊙
des Indes. ⊙
coracan. Barbarie. ⊙ (écon.)

LOLIUM

grêle. F. ψ
ivroye. F. ⊙
à fleurs nombreuses. F. ψ
raigrass. F. ψ

ELYME

des sables. F. ψ
gigantesque. ψ
de Virginie. Am. s. ψ
de Sibérie. ψ
rameux. ψ
divergent. orient. ψ
épi d'orge. ψ

ORGE

commune. Russie. ⊙ (alim.)
 — *nue*.
hexagone. ⊙ (alim.)
éventail. ⊙ (alim.)

distichon *L.*
 — nudum.
 maritimum *L.*
 secalinum *L.*
 murinum *L.*
 jubatum *L.*

TRITICUM

æstivum *L.*
 hybernum *L.*
 turgidum *L.*
 compositum *L.*
 durum *L. Desf.*
 spelta *L.*
 monococcum *L.*
 polonicum *L.*
 cristatum.
 junceum *L.*
 repens *L.*
 — aristatum.
 caninum *L.*
 glaucum.
 prostratum *L.*
 planum.
 tenellum. *L.*
 filiforme.
 unilaterale *L.*

SECALE

cereale *L.*
 creticum *L.*

VII. *Styli 2, stamina 3, glumæ multifloræ vagæ.*

BROMUS

mollis *L.*
 secalinus *L.*
 grossus.
 squarrosus *L.*
 dumetorum *Link.*
 arvensis *L.*
 pratensis *Link.*
 sterilis *L.*
 maximus *Desf.*
 tectorum *L.*
 giganteus *L.*
 rubens *L.*
 inermis *L.*
 pinnatus *L.*
 sylvaticus *Link.*

à deux rangs. russe. ☉ (alim.)

— nue.

maritime. *F.* ☉

des prés. *F.* ☉

des murailles. *F.* ☉

chevelue. syrie. ☉

FROMENT

d'été. ☉ (alim.)
 d'hiver. ☉ (alim.)
 renflé. ☉ (alim.)
 rameux. ☉ (alim.)
 corné. ☉ (alim.)
 épautre. ☉ (alim.)
 monosperme. ☉ (alim.)
 de Pologne. ☉ (alim.)
 à crêtes. ♀
 jonciforme. *F.* ♀
 chiendent. *F.* ♀ (méd.)
 — barbu.
 des chiens. *F.* ♀
 glauque. ♀
 couché. sibérie. ☉
 aplati. égypte. ☉
 grêle. *F.* ☉
 filiforme. *F.* ☉
 unilatéral. *F.* ☉

SEIGLE

cultivé. ☉ (alim.)
 de Crète. ☉

VII. 2 styles, 3 étamines, calice à plusieurs fleurs, épillets étalés.

BROME

velu. *F.* ☉
 des seigles. *F.* ☉
 à gros épillets. *F.* ☉
 rude. *F.* ☉
 des buissons. *F.* ♀
 des champs. *F.* ☉
 des prés. *F.* ♀
 stérile. *F.* ☉
 à grands épis. *F.* ☉
 des toits. *F.* ☉
 gigantesque. *F.* ♀
 pourpre. *F. m.* ☉
 sans arêtes. *F.*, Alpes. ♀
 penné. *F.* ♀
 des bois. *F.* ♀

distachyos L.
stipoides L.

à deux épis. F. m. ☉
stipoïde. F. m. ☉

FESTUCA

1. *Panicula secunda*.

bromoides L.
ovina L.
capillata Lmk.
heterophylla Jacq.
rubra Leers.
duriuscula L.
amethystina L.
glauca Lmk.
dumetorum Willd.
elatio L.
myurus L.
spadicca Smith.

2. *Panicula aequali*.

diandra Mich.
fascicularis Lmk.
virgata Lmk.
decumbens L.
calycina L.
fluitans L.
divaricata Desf.
phleoides Vill.

POA

aquatica L.
alpina L.
bulbosa L.
trivialis L.
angustifolia L.
pratensis L.
trinervata Schrad. }
sylvatica Pollick. }
pilosa L.
annua L.
compressa L.
nemoralis L.
rigida L.
maritima L.
cristata L.
divaricata Conan.
peruviana Jacq.
gracilis.
abyssinica L.

FÉTUQUE

1. *Panicule unilatérale*.

bromoïde. F. ☿
des moutons. F. ☿
capillaire. F. ☿
à feuil. variables. F. ☿
rouge. F. ☿
à feuil. dures. F. ☿
améthyste. F. ☿
glauque. F. ☿
des buissons. F. ☿
élevée F. ☿
myurus. F. ☿
jaune. F. ☿

2. *Panicule égale*.

à deux étamines. Am. s. ☿
fasciculée. Am. s. ☿
effilée. Am. m. ☉
tombante. F. ☉ (écon.)
à grand calice. F. m. ☿
flottante. F. ☿
étalée. Barbarie. ☉
fléau. F. ☿

POA

aquatique. F. ☿
des Alpes. F. ☿
bulbeux. F. ☿
commun. F. ☿
à feuil. étroites. F. ☿
des prés. F. ☿
à trois nervures. F. ☿
velu. F. ☿
annuel. F. ☉
comprimé. F. ☿
des bois. F. ☿
roide. F. ☉
maritime. F. ☿
à crêtes. F. ☿
étulé. F. m. ☉
du Pérou. Am. m. ☉
grêle. ☉
d'Abyssinie. Afr. ☉

tenella L.
ciliaris L.

BRIZA

minor L.
media L.
maxima L.
eragrostis L.

UNIOLA

latifolia Mich.

AVENA

elatior L.
— nodosa.
striata Link.
sativa L.
— nuda.
orientalis Schreb.
brevis Roth.
fatua L.
sterilis L.
pubescens L.
versicolor L.
pratensis L.
bromioides L.
distichophylla Vill.
flavescens L.
panicea Link.
fragilis L.

ARUNDO

donax L.
— variegata.
phragmites L.
epigeios L.
calamagrostis L.
arenaria L.

VIII. Styli 2, stamina 6 aut plura.

ORYZA

sativa L.

ZIZANIA

aquatica L.

IX. Stylus 1, stigma 1.

NARDUS

stricta L.

LYGEUM

spartum L.

délicat. inde. ☉

cilié. Am. m. ☉

BRIZA

triangulaire. F. m. ☉
moyen. F. ☿
à grandes fleurs. F. m. ☉
eragrostis. F. ☉

UNIOLA.

à larges feuil. Am. s. ☿

AVOINE

fromental. F. ☿ (écon.)
— noueuse.
strie. F. Alpes. ☿
cultivée. ☉ (écon.)
— nue.
d'orient. ☉
courte. Allem. ☉
avron. F. ☉
stérile. F. ☉
pubescente. F. ☿
bigarrée. F. ☿
des prés. F. ☿
bromiôide. F. ☿
distique. F. Alpes. ☿
jaunâtre. F. ☿
panis. F. m. ☉
fragile. F. ☉

ROSEAU

à quenouilles. F. m. ☿
— panaché.
à balais. F. ☿
épigeios F. ☿
plumeux. F. ☿
des sables. F. ☿

VIII. 2 styles, 6 étamines ou plus.

RIZ

cultivé. inde. ☉ (alim.)

ZIZANIA

aquatique. Am. s. ☉ (alim.)

IX. 1 style, 1 stigmat.

NARD

serré. F. ☿

LYGEUM

sparte. F. m. ☿ (arts.)

ZEA

maïs L.

X. *Stylus 1, stigma divisum.*

COIX

lacryma L.

arundinacea Lmk.

CORNUCOPIÆ

cucullatum L.

MAIS

cultivé. pérou. ☉ (alim.)

X 1 style, stigmaté divisé.

COIX

larme de Job. inde. ☉

vivace. am. m., s. ch. ♀

CORNUCOPIÆ

en capuchon. orient. ☉

CLASSIS III.

MONOCOTYLEDONES.

(stamina perygina.)

ORDO I.

PALMÆ.

I. *Fronde pinnata.*

PHOENIX

dactylifera L.

ARECA

oleracea L.

COCOS

nucifera L.

ELAÏS

guineensis L.

CARYOTA

urens L.

II. *Folia palmata.*

CORYPHA

hystrix.

CHAMÆROPS

humilis L.

SABAL

Adansonii guers. }
chamærops acaulis rich. }

LATANIA

chinensis Jacq.

CLASSE III.

MONOCOTYLÉDONS.

(étamines attachées au calice.)

ORDRE I.

LES PALMIERS.

I. Feuilles pennées.

DATTIER

cultivé. af., s. ch. ♀ (écon.)

AREC

chou-palmiste. am. m., s. ch. ♀
(écon.)

COCOTIER

cultivé. inde, s. ch. ♀ (écon.)

ELAÏS

de Guinée. am. m., s. ch. ♀

CARYOTA

piquant. inde, s. ch. ♀

II. Feuilles palmées.

CORYPHA

hérissé. am. s., or. ♀

CHAMÆROPS

commun. af. s., or. ♀

SABAL

d'Adanson. am. s., or. ♀

LATANIER

de Chine. s. ch. ♀

RHAPIS

flabelliformis Jacq.
arundinacea H. K.

CUCIFERA (*Hyphæne* Gaert.)
thebaïca Delile.

ORDO II.

ASPARAGI.

I. Flores hermaphroditi.

DRACÆNA

draco L.

terminalis L.
marginata Lmk.

reflexa Lmk. }
cernua Jacq. }
umbraculifera Jacq.

DIANELLA

nemorosa L.
coerulea.

FLAGELLARIA

indica L.

ASPARAGUS

tenuifolius Lmk.
officinalis L.
 — *maritima.*
decumbens Jacq. }
crispus Lmk. }
mauritanus Lmk.
retrofractus L.
asiaticus L.
albus L.
acutifolius L.
aphyllus L.
horridus L. f.
capensis L.
sarmentosus L.

MEDEOLA

asparagoides L.

TRILLIUM

sessile L.

RHAPIS

évantail. inde, s. ch. h
de Caroline. Am. s., or. h

CUCI.

de la Thèbaïde. Af., s. ch. h

ORDRE II.

LES ASPERGES.

I. Fleurs hermaphrodites.

DRACÆNA

sang-dragon. canar., s. ch. h
 (méd.)

pourpre. chine, s. ch. h
à bords rouges. madagascar,
s. ch. h

abaissé. isle de F., s. ch. h
en parasol. inde, s. ch. h

DIANELLE

des bois. inde, s. ch. ψ
bleue. ψ

FLAGELLARIA

des Indes. inde, s. ch. h

ASPERGE

à feüill. menues. F. ψ
officinale. F. ψ (alim..)
 — *maritime.*

crépue. cap, s. ch. ψ
de l' Ile de France. s. ch. h
coudée. Afr., s. ch. h
d' Asie. inde, s. ch. h
blanche. orient, or. h
à feüill. aiguës. F. m. h
sans feüill. orient, or. h
hérissée. orient, or. h
du Cap. s. ch. h
sarmenteuse. ceylan., s. ch. h

MEDEOLA

sarmenteux. cap., s. ch. ψ

TRILLIUM

sessile. Am. s. ψ

PARIS

quadrifolia L.

CONVALLARIA

maialis L.

japonica Thunb.

POLYGONATUM (Convallaria L.)

uniflorum.

multiflorum.

verticillatum.

SMILACINA (Convallaria L.)

racemosa.

stellata.

bifolia.

II. Flores dioici, germen superum.

RUSCUS

aculeatus L.

hypophyllum L.

hypoglossum L.

androgynus L.

racemosus L.

SMILAX

1. Caule aculeato, fruticoso.

aspera L.

— auriculata.

mauritanica Desf.

excelsa L.

horrida.

laurifolia L.

caduca L.

pubera Mich.

2. Caule herbaceo.

herbacea L.

lanceolata L.

DIOSCOREA

villosa L.

III. Flores dioici, germen semi-inferum.

UBIUM (Dioscorea L.)

alatum.

aculeatum.

altissimum.

TAMNUS

communis L.

PARISETTE

à quatre feuell. F. ♀

MUGUET

de mai. F. ♀ (orn.)

du Japon. s. ch. ♀

SCEAU-DE-SALOMON

à une fleur. F. ♀

à plusieurs fleurs. F. ♀

verticillé. F., Alpes. ♀

SMILACINE

à grappes. A. S. ♀

étoilée. Am. S. ♀

à deux feuell. F. ♀

II. Fleurs dioïques, ovaire supère.

FRAGON

épineux. F. ♂ (méd.)

sans foliole. Italie. ♂

à foliole. Italie. ♂

androgyn. canaries, or. ♂

à grappes. Italie. ♂

SMILAX

Tiges épineuses, ligneuses.

rude. F. m., or. ♂ (méd.)

— auriculé.

de Mauritanie. Afr. s., or. ♂

élevé. orient, or. ♂

hérissé. Am. S. ♂

à feuell. de laurier. Am. S. ♂

caduc. Am. S. ♂

velu. Am. S. ♂

2. Tiges herbacées.

herbacé. Am. S. ♀

lancéolé. Am. S. ♀

IGNAME

velu. Am. S. ♀

III. Fleurs dioïques, ovaire presque infère.

UBIUM

ailé. Am. m., s. ch. ♀ (alim.)

épineux. Ind. s. ch. ♀

élevé. Am. m., s. ch. ♀

TAMNE

commun. F. ♀ (méd.)

ORDO III.

J U N C I.

- I. *Germen unicum, capsula trilocularis, calix glumaceus.*

APHYLLANTHES

monspeliensis L.

JUNCUS

1. *Culmo nudo.*

acutus L.
maritimus Lmk.
conglomeratus L.
effusus L.
glaucus Wild.
inflexus L.
squarrosus L.

2. *Culmo folioso.*

articulatus L.
sylvaticus Wild.
bulbosus L.
tenageia L. f.
bufonius L.
niveus L.
campestris L.
pilosus L.
compactus.
maximus Wild.

- II. *Germen unicum, capsula trilocularis, calix semi-petaloides.*

COMMELINA

1. *Petala inæqualia.*

communis L.
africana L.
erecta L.

2. *Petala æqualia aut subæqualia.*

virginica L.
tuberosa L.
cristata L.
zanonia L.

TRADESCANTIA

virginica L.

ORDRE III.

LES JONCS.

- I. Un seul ovaire, capsule à trois loges; calice glumacé.

APHYLLANTE

de Montpellier. F. m. ψ

JONC

1. Chaume nud.

aigu. F. ψ
maritime. F. ψ
aggloméré. F. ψ
épars. F. ψ
glauque F. ψ
courbé. F. ψ
rude. F. ψ

2. Chaume feuill.

articulé F. ψ
des bois. F. ψ
bulbeux. F. ψ
à fleurs sessiles. F. ⊙
dichotome F. ⊙
blanc. F. ψ
des champs. F. ψ
velu. F. ψ
compacte. F. ψ
à larges feuil. F. ψ

- II. Un seul ovaire, capsule à trois loges, les trois divisions internes du calice en forme de pétales.

COMMELINE

1. Pétales inégaux.

commune. Am. m. ⊙
d'Afrique. s. ch. ψ
droite. Am. s. ψ

2. Pétales égaux ou presque égaux.

de Virginie. Am. s. ψ
tubéreuse. Am. m., s. ch. ψ
à crêtes. ceylan. ⊙
à fruit mou. Am. m., s. ch. ψ

ÉPHÉMÈRE

de Virginie. Am. s. ψ

erecta Jacq.
rosea Mich.
discolor Smith.

droite. Am. m. ☉
rose. Am. s. ♀
de deux couleurs. Am. m.,
s. ch. ♀

III. *Germina plura, capsula totidem uniloculares, flores in scapo umbellati aut verticillati.*

III. Plusieurs ovaires, autant de capsules à une loge, fleurs en ombelle ou verticillées sur une hampe.

BUTOMUS

umbellatus L.

BUTOME

ombellifère. F. ♀

ALISMA

plantago L.
ranunculoides L.
natans L.
damasonium L.

ALISMA

plantain d'eau. F. ♀
renoncule. F. ♀
flottant. F. ♀
étoilé. F. ♀

SAGITTARIA

sagittifolia L.

FLÉCHIERE

aquatique. F. ♀

IV. *Germina plura, saepius 3, capsula totidem uniloculares interdum basi coalita, flores paniculati aut spicati.*

IV. Plusieurs ovaires, ordinairement trois, autant de capsules à une loge quelquefois réunies par la base, fleurs en panicule ou en épis.

SCHEUCHZERIA

palustris L.

SCHEUCHZERIA

des marais. F., Alpes. ♀

TRIGLOCHIN

palustre L.
maritimum L.

TRICLOCHIN

des marais. F. ♂
maritime. F. ♀

NARTHECIUM

caliculatum L.
helonias borealis Wild. }

NARTEC

caliculé. F., Alpes. ♀

HELONIAS

bullata L.
angustifolia Mich.

HÉLONIAS

rose. Am. s. ♀
à feuil. étroites. Am. s. ♀

VERATRUM

album L.
nigrum L.
luteum L.

VERATRUM

blanc. F. ♀ (ven.)
noir. sibéric. ♀ (ven.)
jaune. Am. s. ♀

COLCHICUM

autumnale L.
variegatum L.
montanum L.

COLCHIQUE

d'automne. F. ♀ (ven.)
panaché. orient. ♀ (orn.)
de montagne. F., Alpes. ♀

MERENDERA ramond.

bulbocodioides.

MERENDERA

bulbocodium. F. m., or. ♀

ORDO IV.

L I L I A.

TULIPA

sylvestris L.
suaveolens Roth.
gesneriana L.

ERYTHRONIUM

dens canis L.

METHONICA (*Gloriosa* L.)

superba

UVULARIA

amplexifolia L.
perfoliata L.

FRITILLARIA

imperialis L.

persica L.
meleagris L.
latifolia Dec.

LILIUM

candidum L.
bulbiferum L.
croceum.
pomponium L.
pyrenaicum Gouan.
martagon L.
chalcedonicum L.
superbum L.

YUCCA

gloriosa L.
aloëfolia L.
 — *pendula*.
draconis L.
filamentosa L.

SANSEVIERA

Zeylanica Willd.
guineensis Willd.

ALETRIS

capensis L.
fragrans L.

ORDRE IV.

LES LIS.

TULIPE

sauvage. F. ʒ
odorante. AS. ʒ (orn.)
des jardins. orient. ʒ (orn.)

ERYTHRONIUM

dent de chien. F., Alp. ʒ (orn.)

METHONICA

superbe de Malabar. inde ;
 s. ch. ʒ (orn.)

UVULAIRE

des Alpes. F. ʒ
perfoliée. Am. s. ʒ

FRITILLAIRE

couronne impériale. Asie. ʒ
 (orn.)
de Perse. Asie. ʒ
damier. F. ʒ (orn.)
à larges feuil. ʒ

LIS

blanc. AS. ʒ (orn., méd.)
bulbifère. F., Alpes. ʒ (orn.)
orangé. ʒ (orn.)
pomponien. F. m. ʒ (orn.)
des Pyrénées. F. ʒ (orn.)
martagon. F., Alpes. ʒ (orn.)
hémérocale. AS. ʒ (orn.)
superbe. Am. s. ʒ (orn.)

YUCCA

à feuil. entières. Am. s. ʒ (orn.)
à feuil. d'aloës. Am. s., or. ʒ
 (orn.)
 — *à feuil. pendantes*
à larges feuil. Am. m., s. ch. ʒ
filamenteux. Am. s., or. ʒ

SANSEVIÈRA

de Ceylan. s. ch. ʒ
de Guinée. s. ch. ʒ

ALETRIS

du Cap. s. ch. ʒ (orn.)
odorant. cap., s. ch. ʒ

farinosa L.
 uvaria L.
 glauca H. K.
 sarmentosa Andr.

farineux. Am. s. ψ
 à grappes. cap., or. ψ (orn.)
 glauque. cap., or. ψ (orn.)
 sarmenteux. cap., or. ψ

PITCAIRNIA

bromeliæfolia L'Her.

angustifolia H. K.
 latifolia H. K.

PITCAIRNIA

à feuell. d'ananas. Am. m.,
 s. ch. ψ
 à feuell. étroites. Am. m., s. ch. ψ
 à larges feuell. inde, s. ch. ψ

ALOE

purpurea Zmk.

vulgaris C. B.
 abyssinica Zmk.
 rubescens Dec.
 succotrina L.
 fruticosa Zmk.
 ferox H. K.
 mitræformis Zmk.
 — angustior.
 rhodocantha Dec.
 perfoliata L.
 brevifolia Dec.
 humilis L.
 umbellata Dec
 maculata. }
 picta Dec. }
 — major.
 variegata L.
 disticha L.
 — triangularis.
 — latifolia.
 carinata Dec.
 obliqua H. K.
 plicatilis L.
 spiralis L.
 viscosa L.
 retusa L.
 rigida.
 margaritifera L.
 — minor.
 arachnoïde L.
 atrovirens Dec.

ALOËS

à bords rouges. île Bourbon.
 s. ch. ψ
 commun. Afr., s. ch. ψ (méd.)
 d'Abyssinie. s. ch. ψ
 rougeâtre. inde, s. ch. ψ
 soccotrin. cap., s. ch. ψ (méd.)
 corne de bélier. cap., s. ch. ψ
 hérissé. cap., s. ch. ψ
 mitré. cap., s. ch. ψ
 — à feuell. étroites.
 à épines rouges. cap., s. ch. ψ
 perfolié. cap., s. ch. ψ
 à feuell. courtes. cap., s. ch. ψ
 nain. cap., s. ch. ψ
 ombellifère. cap., s. ch. ψ
 moucheté. cap., s. ch. ψ
 — à larges feuell.
 perroquet. cap., s. ch. ψ
 bec de canne. cap., s. ch. ψ
 — triangulaire. cap., s. ch. ψ
 — à larges feuell. cap., s. ch. ψ
 tuberculeux. cap., s. ch. ψ
 oblique. cap., s. ch. ψ
 éventail. cap., s. ch. ψ
 en spirale. cap., s. ch. ψ
 visqueux. Afr., s. ch. ψ
 écrasé. cap., s. ch. ψ
 piquant. cap., s. ch. ψ
 perlé. cap., s. ch. ψ
 — petit.
 patte d'araignée. cap., s. ch. ψ
 vert livide. cap., s. ch. ψ

ANTHERICUM

frutescens L.
 alooïdes L.

ANTHÉRIC

arbrisseau, cap., s. ch. ψ
 à feuell. d'aloës. cap., s. ch. ψ

asphodeloides L.

annuum L.

PHALANGIUM (*Anthericum* L.)

revolutum.

ramosum.

liliago.

liliastrum.

bicolor Desf.

elatum H. K.

milleflorum Dec.

albucoides H. K.

ASPHODELUS

luteus L.

ramosus L.

spicatus.

fistulosus L.

EUCOMIS

regia.

punctata l'Her.

HYACINTHUS

non scriptus L.

patulus.

amethystinus Lmk. }

amethystinus L. }

hispanicus Lmk. }

romanus L.

serotinus L.

orientalis L.

viridis L.

MUSCARI

suaveolens.

comosus.

monstrosus.

racemosus.

PHORMIUM

tenax Forst.

LACHENALIA

pendula H. K.

lanceæfolia Jacq.

pallida Thunb.

tricolor Jacq.

à feuell. d'asphodèle. cap, s.

ch. ψ

annuel. cap. ○

PHALANGIUM

recourbé. cap, or. ψ

rameux. f. ψ

à grappes. f. ψ (orn.)

lis Saint-Bruno. f., alp. ψ

(orn.)

bicolor. f. ψ

élevé. cap., s. ch. ψ

à fleurs nombreuses. n. holl. ψ

faux albuc. cap, s. ch. ψ

ASPHODÈLE

jaune. f. m. ψ

rameux. f. m. ψ

à grappe. f. m. ψ

fistuleux. f. m. ○

EUCOMIS

couronné. cap, s. ch. ψ

tacheté. cap, s. ch. ψ

JACINTHE

des bois. f. ψ

étalée. eur. ψ

améthyste. pyrén. ψ

romaine. barb., or. ψ

rouillée. esp. ψ

d'orient. asie. ψ (orn.)

verte. esp. ψ

MUSCARI

odorant. orient. ψ (orn.)

chevelu. f. ψ

monstrueux. f. ψ (orn.)

à grappes. f. ψ

PHORMIUM

lin de la N. Zélande. or. ψ

(écon.)

LACHENALIA

à fleurs pendantes. cap, or. ψ

lancéolé. cap, or. ψ

à fleurs pâles. cap, or. ψ

tricolor. cap, or. ψ

ALBUCA

- major L.
 alba *Link.*
 minor L.

SCILLA

- maritima L.
 peruviana L.
 italica L.
 amœna L.
 liliohyacinthus L.
 hyacinthoides L.
 bifolia L.
 undulata *Desf.*
 autumnalis L.

ERIOSPERMUM

- lanccæfolium *Jacq.*

ORNITHOGALUM

- luteum L.
 pyrenæicum L.
 pyramidale L.
 narbonense L.
 umbellatum L.
 longibracteatum *Jacq.*
 arabicum L.

ALLIUM1. *Folia teretia.*

- cepa L.
 schoenoprasum L.
 ascalonicum L.
 flavum L.
 vineale L.
 sphærocephalum L.
 pallens L.
 paniculatum L.
 lusitanicum L.
 capillare *Cav.*
 carinatum L.

2. *Folia plana.*

- angulosum L.
 roseum L.
 striatum *Jacq.* }
 gracile *H. K.* }
 subhirsutum L.
 nutans L.
 sativum L.
 scorodoprasum L.
 arenarium L.

ALBUCA

- jaune. cap., or. Ψ
 blanc. cap, or. Ψ
 petit. cap, or. Ψ

SCILLE

- maritime. F. m., or. Ψ (méd.)
 du Pérou. F. m. Ψ (orn.)
 d'Italie. Ψ
 agréable. orient. Ψ
 lis-jacinte. F., Alpes. Ψ
 jacinte. canar. Ψ
 à deux feuell. F. Ψ
 ondée. barb., or. Ψ
 d'automne. F. Ψ

ERIOSPERME

- en lance. cap, or. Ψ

ORNITHOGALE

- jaune. F. Ψ
 des Pyrénées. F. Ψ
 pyramidal. F. m. Ψ
 de Narbonne. F. m. Ψ
 ombellifère. F. Ψ
 à longues bractées. cap, or. Ψ
 d'Arabie. Alger, or. Ψ (orn.)

AILL

1. Feuilles cylindriques.

- oignon. ♂ (écon. méd.)
 civette. sibér. Ψ (écon.)
 échalotte. palest. Ψ (écon.)
 jaune. F. Ψ
 des vignes. F. Ψ
 à tête ronde. F. Ψ
 pâle. F. Ψ .
 paniculé. suisse. Ψ
 de Portugal. Ψ
 capillaire. sicile. Ψ
 en carène. suisse. Ψ

2. Feuilles planes.

- anguleux. F., Alpes. Ψ
 rose. F. m. Ψ
 strié. cap, or. Ψ
 velu. orient. Ψ
 penché. sibér. Ψ
 cultivé. sicile. Ψ (écon. méd.)
 rocambolle. F. Ψ (écon.)
 des sables. F. Ψ

obliquum L.
 ampeloprasum L.
 porrum L.
 monspessulanum *Couan.*
 victorialis L.
 ursinum L.
 scorzonæfolium.
 moly L.
 fragrans *vent.*

POLYANTHES

tuberosa L.

HEMEROCALLIS

fulva L.
 flava L.
 cœrulea *And.*
 japonica *Thunb.*

AGAPANTHUS

umbellatus *L'her.*
 — minor.

ORDO V.

NARCISSE.

AGAVE

americana L.

— variegata.

mexicana L.

— angustifolia.

vivipara L.

foetida L.

ALSTROEMERIA

pelegrina L.

ligtu L.

HEMANTHUS

coccineus L.

ciliaris L.

puniceus L.

pubescens L. *f.*

CRINUM

asiaticum L.

americanum L.

erubescens L. *f.*

bracteatum *Wild.*

oblique. sibér. Ψ

ampeloprasum. or. Ψ

poireau. suisse. ♂ (écon.)

de Montpellier. F. m. Ψ

à feuil. de plantain. F. Alp. Ψ

pétiolé. F. Ψ

à feuil. de scorzonère. Ψ

moly. F. m. Ψ

odorant. Afr., or. Ψ

TUBÉREUSE

cultivée. inde, s. ch. Ψ (orn.)

HÉMÉROCALE

rouge. chine. Ψ (orn.)

jaune. suisse. Ψ (orn.)

bleue. chine, s. ch. Ψ (orn.)

du Japon. s. ch. Ψ (orn.)

AGAPANTHUS

ombellifère. cap, or. Ψ (orn.)

— petit.

ORDRE V.

LES NARCISSES.

AGAVÉ

d'Amérique. Am. m., or. Ψ
 (écon.)

— panaché.

du Mexique. s. ch. Ψ

— à feuil. étroites.

vivipare. Am. m., s. ch. Ψ

aloëspitt. Am. m. s. ch. Ψ (écon.)

PÉLEGRINE

tachetée. Pérou, or. Ψ (orn.)

veinée. Pérou, s. ch. Ψ (orn.)

HÉMANTE

écarlate. cap, or. Ψ (orn.)

ciliée. cap, or. Ψ (orn.)

ponceau. cap, or. Ψ (orn.)

pubescente. cap, or. Ψ (orn.)

CRINUM

d'Asie. inde, s. ch. Ψ (orn.)

d'Amérique. Am. m., s. ch. Ψ
 (orn.)

rougeâtre. Am. m., s. ch. Ψ (orn.)

à longues bractées. Am. m.,
 s. ch. Ψ (orn.)

AMARYLLIS

lutea L.
atamasco L.
formosissima L.

broussonetii Dec.

belladonna L'Her.
equestris Jacq.
vittata L'Her.
falcata L'Her.
sarniensis L.

undulata L.
aurea L'Her.

PANCRACTIUM

caribæum L.

amboinense L.
declinatum Jacq.
illyricum L.
maritimum L.

NARCISSUS

poeticus L.
pseudonarcissus L.
bicolor L.
tazetta L.
 — *alba*.
jonquilla L.
bulbocodium L.

LEUCOIUM

vernum L.
æstivum L.
autumnale L.

GALANTHUS

nivalis L.

HYPOXIS

erecta L.
villosa L. f.

BROMELIA

ananas L.
karatas L.
chrysantha Jacq.

TILLANDSIA

serrata L.

AMARYLLIS

jaune. f. m. ♀ (orn.)
atamasco. am. s. ♀ (orn.)
de Saint-Jacques. am. m.,
 or. ♀ (orn.)
de Broussonet. afr., s. ch. ♀
 (orn.)
belladoue. am. m., or. ♀ (orn.)
rose. am. m., s. ch. ♀ (orn.)
veinée. cap, or. ♀ (orn.)
falciforme. cap, or. ♀ (orn.)
grenésienne. pérœu, grenesey,
 or. ♀ (orn.)
ondulée. cap, or. ♀ (orn.)
jaune. chine, s. ch. ♀ (orn.)

PANCRACTIUM

des Antilles. am. m., s. ch. ♀
 (orn.)
d'Amboine. inde, s. ch. ♀ (orn.)
incliné. am. m., s. ch. ♀ (orn.)
d'Illyrie. f. m. ♀ (orn.)
maritime. f. ♀ (orn.)

NARCISSUS

des poètes. f. ♀ (orn.)
porion. f. ♀ (orn.)
bicolor. f. ♀ (orn.)
à bouquets. f. m. ♀ (orn.)
 — *blanc*.
jonquille. orient. ♀ (orn.)
trompette. f. ♀ (orn.)

LEUCOIUM

printanier. f. ♀ (orn.)
d'été. f. ♀ (orn.)
d'automne. afr. s., or. ♀

GALANTINE

perce-neige. f. ♀ (orn.)

HYPOXIS

à tige droite. am. s., or. ♀
velu. cap, or. ♀

ANANAS

cultivé. am. m., s. ch. ♀ (alim.)
karatas. am. m., s. ch. ♀
jaune. am. m., s. ch. ♀

TILLANDSIA

à feuill. en scie. am. m., s. ch. ♀

ORDO VI.

IRIDES.

SISYRINCHIUM

- bermudiana L.
 — major.
 convolutum.
 striatum *smith.*

TIGRIDIA

- pavonia.

FERRARIA

- undulata L.

IRIS

1. *Barbata.*

- susiana L.
 florentina L.
 germanica L.
 — cœrulea.
 — violacea.
 pallida *Link.*
 plicata *Link.*
 swertii *Link.*
 squalens L.
 variegata L.
 aphylla L.
 pumila L.
 lutescens *Link.*

2. *Imberbes.*

- pseudo-acorus L.
 foetidissima L.
 sibirica L.
 ochroleuca L.
 spuria L.
 fimbriata *rent.*
 graminca L.
 xyphium L.
 tuberosa L.
 persica L.
 sisyrinchium.
 tricuspid *Thunb.*

MORÆA

- irioides L.
 nortiana *Andr.*

ORDRE VI.

LES IRIDÉES.

BERMUDIENNE

- à petites fleurs. am. s. Ψ
 — à grandes fleurs.
 roulée. cap, or. Ψ
 à réseau. mexique, or. Ψ

TIGRIDIA

- à fleurs pourpres. cap, or. Ψ
 (orn.)

FERRARIA

- ondulé. cap, or. Ψ

IRIS

1. Fleurs barbues.

- de Suze. orient, or. Ψ (orn.)
 de Florence. ital. Ψ (méd.)
 flambé. f. Ψ (orn. méd.)
 — bleu. (orn.)
 — violet. (orn.)
 pâle. orient. Ψ (orn.)
 plissé. Ψ (orn.)
 de Swert. Ψ (orn.)
 sale. f. m. Ψ
 panaché. hongric Ψ
 sans semill. Ψ
 nain. f. Ψ (orn.)
 jaunâtre. f. Ψ

2. Fleurs non barbues.

- des marais. f. Ψ (méd.)
 fétide. f. Ψ
 de Sibérie. Ψ
 jaune. orient. Ψ
 bâtard. f. Ψ
 frangé. chine, or. Ψ
 graminé. autriche. Ψ
 xyphium. f. m. Ψ (orn.)
 hermodate. orient, or. Ψ (m.)
 de Perse. orient. Ψ (orn.)
 à semill. de safran. barbar. Ψ
 à trois pointes. cap, or. Ψ

MORÆA.

- faux iris. orient, or. Ψ
 à gaine. cap, or. Ψ

chinensis.
sordescens Jacq.

de Chine. or. ψ (orn.)
sale. cap, or. ψ

IXIA

bulbocodium L.
crocata L.
hyalina.
miniata Jacq.

— *maculata.*
polystachya.

anemonæflora Jacq.

fuscocitrina.
leucantha Jacq.
bulbifera L.
dubia Vent.
filiformis Vent.
longiflora Jacq.

erecta Jacq.
maculata Jacq.
viridis Jacq.
cruciata Jacq.
liliago.

GALAXIA

ixiæflora Dec.

GLADIOLUS

communis L.
plicatus L.
tristis L.
angustus L.

carneus Wild.

merianus.
lineatus Curt.
cuspidatus Jacq.
tubiflorus Jacq.
securiger Curt.
gramineus Andr.

ANTHOLIZA

æthiopica L.
cunonia L.

IXIA

bulbocodium. f. m. ψ (orn.)
safrané. cap, or. ψ (orn.)
membraneux. cap, or. ψ
couleur de minium. cap, or. ψ
(orn.)

— *tacheté.* cap, or. ψ
à plusieurs epis. cap, or. ψ
(orn.)

à fleurs d'anémone. cap, or. ψ
(orn.)

brun citron. cap, or. ψ (orn.)

blanc. cap, or. ψ (orn.)

bulbifère. cap, or. ψ (orn.)

douteux. cap, or. ψ (orn.)

filiforme. cap, or. ψ (orn.)

à longues fleurs. cap, or. ψ
(orn.)

droit. cap, or. ψ (orn.)

maculé. cap, or. ψ (orn.)

vert. cap, or. ψ (orn.)

crucifère. cap, or. ψ (orn.)

fleur de lis. cap, or. ψ (orn.)

GALAXIA

à fleurs d'ixia. cap, or. ψ
(orn.)

GLAYEUL

commun. f. m. ψ (orn.)

plissé. cap, or. ψ (orn.)

triste. cap, or. ψ (orn.)

à feuell. étroites. cap, or. ψ
(orn.)

couleur de chair. cap, or. ψ
(orn.)

de Mérian. cap, or. ψ (orn.)

veiné. cap, or. ψ (orn.)

en pointe. cap, or. ψ (orn.)

tubulé. cap, or. ψ (orn.)

en doloire. cap, or. ψ (orn.)

à feuell. de gramen. cap, or. ψ
(orn.)

ANTHOLISE

d'Éthiopie. cap, or. ψ (orn.)

cunonia. cap, or. ψ (orn.)

CROCUS

vernus *L.*
 sativus *L.*
 multifidus. *Ramond.*

WACHENDORFIA

paniculata *L.*
 thyrsillora. *L.*

PONTERDERIA

cordata *L.*

SAFRAN

printanier. *F.* ψ (orn.)
 cultivé. orient. ψ (écon. méd.)
 découpe. *F.*, pyrén. ψ (orn.)

WACHENDORFE

paniculee. cap, or. ψ
 à fleurs en thyrs. cap, or. ψ

PONTÉDÉRIA

à feuil. en cœur. am. s. ψ (orn.)

CLASSIS IV.**MONOCOTYLEDONES.**

(*stamina epigyna.*)

ORDO I.**MUSÆ.****MUSA**

sapientum *L.*
 paradisiaca *L.*
 coccinea *Andr.*

HELICONIA

bihai.
 psittacorum *L. f.*

RAVENALA

madagascariensis.

STRELITZIA

reginæ *H. K.*

ORDO II.**CANNÆ.****CANNA**

indica *L.*
 — punctata.
 — coccinea.
 glauca *L.*
 gigantea.

GLOEBA

nulans *L.*

CLASSE IV.**MONOCOTYLÉDONS.**

(étamines sur le pistil.)

ORDRE I.**LES BANANIER S.****BANANIER**

à petit fruit. inde, s. ch. ψ (alim.)
 à grand fruit. inde, s. ch. ψ (al.)
 écarlate. chine, s. ch. ψ (orn.)

HÉLICONIA

bihai. inde, s. ch. ψ
 des perroquets. surin., s. ch. ψ

RAVENAL

de Madagascar. s. ch. ψ

STRELITZIA

de la reine. cap, s. ch. ψ (orn.)

ORDRE II.**LES BALISIERS.****BALISIER**

des Indes. or. ψ (orn.)
 — ponctuée.
 — écarlatte. am. m., s. ch. ψ
 glauque. am. s., or. ψ
 gigantesque. s. ch. ψ

GLOEBA

inclinée. inde, s. ch. ψ (orn.)

AMOMUMzingiber *L.*zerumbet *L.*sylvestre *swartz.*
cardamomum *L.***AMOME**gingembre. inde, s. ch. Ψ .
(écon. méd.)zerumbet. inde, s. ch. Ψ .
(écon. méd.)sauvage. *am. m.*, s. ch. Ψ .
cardamome. inde, s. ch. Ψ .
(écon. méd.)**HEDICHIUM**coronarium *L.***HÉDICHIMUM**en couronne. inde, s. ch. Ψ **COSTUS**arabicus *L.***COSTUS**d'Arabie. *am. m.*, s. ch. Ψ .
(méd.)**ALPINIA**racemosa *L.***ALPINIA**à grappes. *am. m.*, s. ch. Ψ **MARANTA**

arundinacea.

MARANTAà feuill. de balisier. *am. m.*,
s. ch. Ψ **THALIA**

dealbata.

THALIAblanc. s. ch. Ψ **CURCUMA**longa *L.***CURCUMA**safran des Indes. s. ch. Ψ .
(écon., arts, méd.)**KÆMPFERIA**galanga *L.*
longa *Jacq.***KÆMPFERIA**galanga. inde, s. ch. Ψ .
allongé. inde, s. ch. Ψ **ORDO III.****ORCHIDÆÆ.****ORCHIS**1. *Bulbis indivisis.*bifolia *L.*
pyramidalis *L.*
coriophora *L.*
morio *L.*
mascula *L.*
laxiflora *Lmk.*
ustulata *L.*
militaris *L.*
variegata *Jacq.*
simia *Lmk.*2. *Bulbis palmatis.*latifolia *L.***ORDRE III.****LES ORCHIDÉES.****ORCHIS**1. *Bulbes non divisées.*à deux feuill. *F.* Ψ
pyramidal. *F.* Ψ
fétide. *F.* Ψ
morio. *F.* Ψ
mâle. *F.* Ψ
à fleurs lâches. *F.* Ψ
charbonne. *F.* Ψ
militaire. *F.* Ψ
tacheté. *F.* Ψ
singe. *F.* Ψ 2. *Bulbes palmées.*à larges feuill. *F.* Ψ

maculata L.
conopsea L.
abortiva L.

SATYRIUM

hircinum L.
viride L.
nigrum L.

OPHRYS

ovata L.
antropophora L.
nidus avis L.
paludosa L.
insectifera L.
 — *musciflora*.
 — *arachnites*.
 — *rubiginosa*.
spiralis L.
æstivalis.

SERAPIAS

latifolia L.
longifolia L.
grandiflora L.
rubra L.

LIMODORUM

tankervilliae H. K.
purpureum Link.
altum L.

CYPRIPEDIUM

calceolus L.
flavescens Dec.

EPIDENDRUM

cochleatum L.
ciliare L.
bifidum Swartz.

maculé. F. ψ
à long éperon. F. ψ
avorté. F. ψ

SATYRIUM

fetide. F. ψ
vert. F. ψ
noir. F., Alpes. ψ

OPHRYS

double fenill. F. ψ
homme. F. ψ
nid d'oiseau. F. ψ
des marais. F. ψ
insecte. F. ψ
 — *mouche.*
 — *araignée.*
 — *rouillé.*
en spirale. F. ψ
d'été. F. ψ

HELLEBORINE

à larges fenill. F. ψ
à fenill. longues. F. ψ
à grandes fleurs. F. ψ
rouge. F. ψ

LIMODORE

de Chine. s. ch. ψ (orn.)
pourpre. Am. m., s. ch. ψ
élevé. Am. m., s. ch. ψ

CYPRIPEDIUM

des Alpes. F. ψ
jaune. Am. s. ψ

EPIDENDRUM

limacon. Am. m., s. ch. ψ
cilié. Am. m., s. ch. ψ
bifide. Am. m., s. ch. ψ

ORDO IV.**HYDROCHARIDES.**

VALLISNERIA
spiralis L.

STRATIOTES
alooïdes.

HYDROCHARIS
morsus ranæ L.

ORDRE IV.**LES MORÈNES.**

VALLISNERIA
en spirale. F. ψ

STRATIOTES
à fenill. d'aloès. F. ψ

MORÈNE
aquatique. F. ψ

NYMPHÆA

alba L.

lutea L.

cœrulea sav.

NYMPHÆA

blanc. F. ψ

jaune. F. ψ

bleu. égypte, s. ch. ψ

CLASSIS V.

CLASSE V.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

APETALÆ.

SANS COROLLE.

(stamina epigyna.)

(étamines sur le pistil.)

ARISTOLOCHIA

altissima Desf.

sempervirens L.

pistolochia L.

bilobata L.

caudata L.

trilobata L.

peltata L.

bœtica Lmk.

sypho l'Her.

rotunda L.

clematitis L.

serpentaria L.

ARISTOLOCHE

élevée. Alger, or. ♂

toujours verte. orient. or. ♂

crénelée. F. m., or. ψ (méd.)

bilobée. Am. m., s. ch. ψ

filifère. Am. m., s. ch. ♂

trilobée. Am. m., s. ch. ♂

bouclier. Am. m., s. ch. ψ

de Portugal. ψ

syphon. Am. s. ♂ (orn.)

ronde. F. m. ψ (méd.)

clématite. F. ψ (méd.)

serpenteire. Am. s. ψ (méd.)

ASARUM

europæum L.

canadense L.

virginicum L.

ASARUM

d'Europe. F. ψ (méd.)

de Canada. Am. s. ψ

de Virginie. Am. s. ψ

CLASSIS VI.

CLASSE VI.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

APETALÆ.

SANS COROLLE.

(stamina perigyna.)

(étamines attachées au calice.)

ORDO I.

ORDRE I.

ELÆAGNI.

LES CHALEFS.

I. Stamina 5, aut pauciora.

I. Cinq étamines, ou moins.

THESIIUM

linophyllum L.

THESIIUM

à feuell. de lin. F. ψ

OSYRIS

blanc. F. ♀

HYPPOPHAE

rhamnoïdes L.*canadensis* L.

ELÆAGNUS

angustifolia L.

NYSSA

aquatica L.*denticulata* H. K.*angulisans* Mich.*villosa* Mich.*integrifolia* H. K.*candicans* Mich.

CONOCARPUS

erecta L.II. *Stamina sæpius* 10.

BUCIDA

bucceras L.

TERMINALIA

catappa L.*angustifolia* Jacq.

ORDO II.

T H Y M E L E Æ.

DIRCA

palustris L.

DAPHNE

1. *Floribus lateralibus.**mezereum* L.— *album.**thymelæa.**tartou-raïra* L.*alpina* L.*pontica* L.*laureola* L.2. *Floribus terminalibus.**odora* Thunb.*oleæfolia* Link.*collina* Jacq.*encorum* L.*gnidium* L.

OSYRIS

alba L.

ARGOUSIER

rhamnoïde. F. ♀*de Canada.* ♀

CHALEF

à feuell. étroites, ou olivier de
Bohême. orient. ♀ (orn.)

TUPÉLO

aquatique. Am. s. ♀*velu.* Am. s. ♀*blanchâtre.* Am. s. ♀

CONOCARPE

droit. Am. m., s. ch. ♀

II. Ordinairement 10 étamines.

BUCIDA

cornu. Am. m., s. ch. ♀

BADAMIER

catappa. inde, s. ch. ♀*à feuell. étroites.* inde, s. ch. ♀

ORDRE II.

LES THYMELÉES.

DIRCA

bois-cuir. Am. s. ♀

DAPHNÉ

1. *Fleurs latérales.**bois gentil.* F. ♀ (orn. vén.)— *à fleur blanche.* ●*thymelée.* F. ♀ (orn.)*tartou-raïre.* F. m., or. ♀*des Alpes.* F. ♀*de Pont.* As., or. ♀ (orn.)*lauréole.* F. ♀ (vén.)2. *Fleurs terminales.**odorant.* or. ♀*à feuell. d'olivier.* orient, or. ♀*d'Italie.* or. ♀*cucorum.* F. ♀ (orn. vén.)*garou.* F. m., or. ♀ (méd. vén.)

PASSERINA

- hirsuta* L.
dioica *Gouan.*
calycina *Lapeyr.*
filiformis L.
capitata L.
grandiflora L. f.
laxa L. f.

STELLERA

- passerina* L.

STRUTHIOLA

- virgata* L.
erecta L.
imbricata *Audr.*

DAIS

- cotinifolia* L.

GNIDIA

- oppositifolia* *Thunb.*
simplex L. f.
pinifolia L. f.

ORDO III.

PROTEÆ.

PROTEA

- argentea* L.
pallens L.
conifera L.
obliqua *Thunb.*
levisanus *Thunb.*
hirta L.
glauca.
saligna *Thunb.*
sericea L. f.

BANKSIA

- serrata* L. f.
spinulosa *Smith.*

HAKEA

- gibbosa* *Cav.*
dactyloides *Cav.*

EMBOTRIUM

- salicifolium* *Vent.*
sericeum *Smith.*

PASSERINE

- cotonneuse.* F. m., or. ♀
dioïque. F. m. ♀
calyculée. F. m. ♀
filiforme. cap, or. ♀
à fleurs en tête. cap, or. ♀
à grandes fleurs. cap, or. ♀
lâche. cap, or. ♀

STELLERA

- passerine.* F. ☉

STRUTHIOLA

- effilé.* cap, or. ♀
à tige droite. cap, or. ♀
imbriquée. cap, or. ♀

DAIS

- à feuell. de fustet.* cap, or. ♀

GNIDIA

- à feuell. opposées.* cap, or. ♀
à tiges simples. cap, or. ♀
à feuell. de pin. cap, or. ♀

ORDRE III.

LES PROTÉES.

PROTEA

- arbre d'argent.* cap, or. ♀
pâle. cap, or. ♀
conifère. cap, or. ♀
oblique. cap, or. ♀
lévisanus. cap, or. ♀
velu. cap, or. ♀
glauque. cap, or. ♀
à feuell. de saule. cap, or. ♀
soyeux. cap, or. ♀

BANKSIA

- à feuell. en scie.* N. holl., or. ♀
épineux. N. holl., or. ♀

HAKÉA

- gibbeux.* N. holl., or. ♀
dactyloïde. N. holl., or. ♀

EMBOTRIUM

- à feuell. de saule.* N. holl., or. ♀
soyeux. N. holl., or. ♀

ORDO IV.

LAURI.

LAURUS

1. *Folia perennantia.*

cinnamomum L.

camphora L.

persea L.

nobilis L.

indica L.

borbonia L.

foetens H. K.

2. *Foliis deciduis.*

geniculata Mich.

benzoïn L.

sassafras L.

MYRISTICA

aromatica L.

HERNANDIA

sonora L.

ORDO V.

POLYgoneÆ.

COCOLOBÀ

excoriata L.

uvifera L.

macrophylla.

pubescens L.

diversifolia Jacq.

BRUNNICHIA Gært.

cirrhosa.

ATRAPHRAXIS

undulata L.

spinosa L.

ORDRE IV.

LES LAURIERS.

LAURIER

1. Feuilles persistantes.

cannellier. AS., or. 5 (écon, méd.)

camphrier. japon, s. ch. 5 (écon. méd.)

avocat. AM. M., s. ch. 5 (alim.)

d'Apollon. orient. 5 (écon, méd.)

des Indes. canaries, or. 5

rouge. AM. S., or. 5

fetide. canaries, or. 5

2. Feuilles tombantes.

geniculé. AM. S., or. 5

faux benjoin. AM. S. 5

sassafras. AM. S. 5 (méd.)

MUSCADIÈRE

aromatique. moluques, s. ch. 5 (écon. méd.)

HERNANDIA

sonore. AM. M., s. ch. 5

ORDRE V.

LES POLYAGONÉES.

RAISINIER

écorcé. AM. M., s. ch. 5

à grappes. AM. M., s. ch. 5

à grandes feuil. AM. M., s. ch. 5

pubescent. AM. M., s. ch. 5

à feuil. changeantes. AM. M., s. ch. 5

BRUNNICHIA

à vrilles. AM. S. 5

ATRAPHRAXIS

ondulé. cap, or. 5

épineux. orient. 5

POLYGONUM.

POLYgone

1. *Foliis indivisis , floribus octandris , trigynis.*

aviculare L.
maritimum L.
polygamum vent.
frutescens L.
divaricatum L.
alpinum All.
angustifolium.

2. *Persicariæ , pistilo bifido , stamina minus 8.*

orientale L.
persicaria L.
— maculata.
minus H. K.
hydropiper L.
amphibium L.
virginianum L.

3. *Bistorta , spica unica.*

viviparum L.
bistorta L.
— major.

4. *Foliis subcordatis.*

tataricum L.
fagopyrum L.
emarginatum wild.
convolvulus L.
dumetorum L.
scandens L.
acetosæfolium vent.

1. Feuilles entières , 8 étamines , 3 styles.

renoué , centinode. F. ♀ (méd.)
maritime. F. ♀
polygame. Am. s., or. ♂
arbrisseau. sibérie. ♂
étalé. sibérie. ♀
des Alpes. F. ♀
à feuil. étroites. sibérie. ♀

2. Les persicaires , 2 styles , moins de 8 étamines.

d'orient. ☉ (orn.)
persicaire. F. ☉
— maculée.
nain. F. ☉
poivre d'eau. F. ☉
amphibie. F. ♀
de Virginie. Am. s. ♀

3. Les histortes , un seul épi.

vivipare. F., Alpes. ♀
bistorte. F. ♀ (méd.)
— à larges feuil.

4. Feuilles en cœur ou hastées.

de Tartarie. ☉ (alim.)
surrazin. Asie. ☉ (alim.)
échancré. chine. ☉
liseron. F. ☉
des buissons. F. ☉
grim pant. Am. s. ♀
à feuil. d'oseille. Brésil. ♀

RUMEX.

RUMEX.

1. *Hermaphroditæ , valvulis glandulâ destitutis.*

lunaria L.
vesicarius L.
roseus L.
tingitanus L.
scutatus L.
— glaucus.
digynus L.
bucephalophorus L.

2. *Floribus declinis.*

arifolius L. f.
alpinus L.

1. Fleurs hermaphrodites , calice sans glandes.

arbrisseau. canaries, or. ♀
vésiculeux. Afr. s. ☉
rose. Égypte. ☉
de Tanger. Alger. ♀
en bouclier. F. ♀ (alim. méd.)
— glauque.
à deux styles. F., Alpes. ♀
tête de bœuf. F. m. ☉

2. Fleurs polygames.

à feuil. d'arum. Afr., s. ch. ♂
des Alpes. F. ♀ (méd.)

tuberosus *L.*
 montanus. }
 arifolius *All.* }
 cordatus.
 acetosa *L.*
 acetosella *L.*
 spinosus *L.*

tubéreux. *italie.*, or. ♀
 de montagne. *F.* ♀
 en cœur. cap, or. ♀
 oseille. *F.* ♀ (*alim. méd.*)
 auriculé. *F.* ♀
 epineux. *orient.* ☉

3. *Floribus hermaphroditis , valvulis granulo notatis.*

maritimus *L.*
 crispatus *Mich.* }
 persicarioides *Poiret.* }
 ægyptiacus *L.*
 dentatus *L.*
 pulcher *L.*
 nemolapathum *L.*
 sanguineus *L.*
 purpureus *Poiret.*
 obtusifolius *L.*
 crispus *L.*
 hydrolapathum *H. K.*
 patientia *L.*
 undulatus.

3. Fleurs hermaphrodites , valves glanduleuses.

maritime. *F.* ☉
 crispé. *Am. s.* ☉
 d'Égypte. ☉
 denté. Égypte. ☉
 violon. *F.* ♂
 des bois. *F.* ♀
 sanguin. *Am. s.* ♀
 purpurin. ♀
 à feüill. obtuses. *F.* ♀
 crépu. *F.* ♀
 des marais. *F.* ♀
 patience. *F.* ♀ (*méd.*)
 ondé. *sibérie.* ♀

RHEUM

rhaponticum *L.*
 compactum *L.*
 undulatum *L.*
 ribes *L.*
 palmatum *L.*

RHUBARBE

rhapontic. *Asie* ♀ (*méd.*)
 compacte. *chine.* ♀ (*méd.*)
 ondée. *chine.* ♀ (*méd.*)
 ribes. *Asie.* ♀ (*écon. méd.*)
 palmée. *chine.* ♀ (*méd.*)

CALLIGONUM

comosum *Desf.*

CALLIGONUM

hérissé. *Afr.*, or. ♀

PALLASIA

caspica *L.*

PALLASIA

de la mer caspienne. or. ♂

ORDO VI.

ATRIPLICES.

I. *Fructus baccatus.*

PHYTOLACCA

octandra *L.*
 decandra *L.*
 dodecandra *L'Her.*
 icosandra *L.*
 dioica *L.*

ORDRE VI.

LES ARROCHES.

I. Une baie.

PHYTOLACCA

à 8 étamines. *Am. m.*, *s. ch.* ♂
 à 10 étamines. *Am. s.* ♀
 à 12 étamines. *Abyss.*, *s. ch.* ♂
 à 20 étamines. *Inde.*, *s. ch.* ♂
 dioïque. *Am. m.*, *s. ch.* ♂

RIVINA

humilis L.
octandra L.
levis L.

BOSEA

yerva-mora L.

II. *Fructus capsularis.*

PETIVERIA

alliacea L.

POLYCNEMUM

arvense L.

CAMPHOROSMA

monspeliaca L.

PTERANTHUS

echinatus Desf.

GALENIA

africana L.

III. *Semen tectum calice, stamina 5.*

BASELLA

rubra L.
alba L.
cordifolia Zmk.
vesicaria Zmk.

SALSOLA

1. *Fruticosa.*

brevifolia Desf.
fruticosa L.
prostrata L.
canescens.
oppositifolia Desf.

2. *Herbacea.*

hirsuta L.
muricata L.
laniflora Pallas.
altissima L.
soda L.
radiata Desf. }
platiphylla Michx. }
salsa L.
kali L.
tragus L.
rosacea L.

RIVINA

velu. Am. m., s. ch. ♀
à 8 étamines. Am. m., s. ch. ♀
lisse. inde, s. ch. ♂

BOSEA

yerva-mora. canaries, or. ♀

II. Une capsule.

PETIVERIA

alliace. Am. m., s. ch. ♀

POLYCNEMUM

des champs. F. ☉

CAMPHRÉE

de Montpellier. F., or. ♀ (méd.)

PTÉRANTHUS

hérissé. Afr. s. ☉

GALÈNIA

d'Afrique. cap, or. ♀

III. Graines recouvertes par le calice,
5 étamines.

BASELLE

rouge. inde. ♂ (écon.)
blanche. chine. ♂ (écon.)
à feuell. en cœur. inde. ♂ (écon.)
vésiculeuse. Pérou.

SOUDE.

1. Tiges ligneuses.

à feuell. courtes. Barb., or. ♀
arbrisseau. F. ♀
couchée. Sibérie. ♀
satinée. or. ♀
à feuell. opposées. Barb., or. ♀

2. Tiges herbacées.

velue. F. m. ☉
hérissée. Égypte, or. ♀
laineuse. Sibérie. ♀
élevée. Italie. ☉
commune. F. m. ☉ (arts.)
rayonnée. Am. s. ☉
salée. Sibérie. ☉
kali. F. ☉ (arts.)
épineuse. F. ☉ (arts.)
rosacée. Asie. ☉

SPINACIA

oleracea *L.*
— levis.

BETA

vulgaris *L.*
— rubra.
cycla *L.*

maritima *L.*

CHENOPodium.

1. *Foliis angulatis.*

bonus henricus *L.*
urbicum *L.*
serotinum *L.*
atriplicis *L.*
murale *L.*
hybridum *L.*
ficifolium. *smith.*
album *L.*
rubrum *L.*
ambrosioides *L.*
anthelminticum *L.*

botrys *L.*
multifidum *L.*
glaucum *L.*

2. *Foliis integris.*

vulvaria *L.*
polyspermum *L.*
scoparia *L.*
villosum *mk.*
aristatum *L.*
maritimum *L.*

ATRIPLEX

halimus *L.*
portulacoides *L.*
rosea *L.*
sibirica *L.*
hortensis *L.*
— rubra.
— ruberrima.
bengalensis.
virgata.
laciniata *L.*
multifida.

ÉPINARS

cultivé. *AS. S.* ☉ (alim.)
— lisse. (alim.)

BETTE

commune. *Eur. aust.* ♂ (alim.)
— rouge.
racine de disette. *portug.* ♂
(alim.)
maritime. *F.* ☉

ANSERINE.

1. Feuilles anguleuses.

bon Henri. *F.* ♀ (méd.)
triangulaire. *F.* ☉
tardive. *F.* ☉
à feuell. d'arroche. *chine.* ☉
des murailles. *F.* ☉
hybride. *F.* ☉
à feuell. de figuier. *F.* ☉
blanche. *F.* ☉
rouge. *F.* ☉
odorante. *Am. m.* ☉ (méd.)
anthelmintique. *Am. m., or.* ♀
(méd.)
botrys. *F.* ☉ (méd.)
découpée. *Am. m., or.* ♀
glauque. *F.* ☉

2. Feuilles entières.

fétide. *F.* ☉
polysperme. *F.* ☉
belvédère. *chine.* ☉
velue. *sibérie.* ☉
barbue. *sibérie.* ☉
maritime. *F.* ☉

ARROCHE

halime. *F.* ♀
à feuell. de pourpier. *F.* ♀
rose. *F.* ☉
de Sibérie. ☉
des jardins. *Asie.* ☉ (écon.)
— rouge.
— pompre.
du Bengale. ☉
effilée. *sibérie.* ☉
laciniée. *F.* ☉
découpée. ☉

hastata L.
patula L.
littoralis L.

hastée. F. ☉
touffue. F. ☉
maritime. F. ☉

IV. *Semen tectum calice, stamina pauciora quam 5.*

IV. Graine renfermée dans le calice ; moins de cinq étamines.

AXYRIS

amaranthioides L.
hybrida L.

AXYRIS

fausse amarante. sibérie. ☉
hybride. sibérie. ☉

BLITUM

capitatum L.
virgatum L.
chenopodioides L.

BLETTE

à fleurs en tête. F. ☉
effilée. F. ☉
anserine. tartarie. ☉

SALICORNIA

herbacea L.
fruticosa L.

SALICORNE

herbacée. F. ☉ (écon.)
arbrisseau. F. m., or. ☉

V. *Semen denudatum.*

V. Graines non-recouvertes.

CORISPERMUM

spicatum.
hyssopifolium L.

CORISPERME

à épis. sibérie. ☉
à feuell. d'hyssope. tartar. ☉

CLASSIS VII.

CLASSE VII.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

A P E T A L A E.

SANS COROLLE.

(*stamina hypogyna.*)

. (étamines attachées sous le pistil.)

ORDO I.

ORDRE I.

AMARANTHI.

LES AMARANTES.

I. *Folia alterna nuda.*

I. Feuilles alternes nues.

AMARANTHUS

AMARANTE

I. *Triandri.*

I. Trois étamines.

albus L.
græcisans L.
persicarioides.
circinnatus.
tricolor L.
lividus L.
melancholicus L.
gracilis.
chenopodium caudatum. Jacq. }

blanche. Am. s. ☉
à feuell. étroites. Am. s. ☉
persicaire. ☉
à feuell. rondes. ☉
tricolor. inde. ☉ (orn.)
livide. Am. s. ☉
mélancolique. inde. ☉
grêle. ☉

blitum L.
 sylvestris.
 polygonoides L.

2. Pentandri.

chlorostachys *Willd.*
 paniculatus L.
 hybridus L. }
 retroflexus Lmk. }
 caudatus L.
 spinosus L.

CELOSIA

argentea L.
 margaritacea L.
 trigyna L.
 cristata L.
 coccinea L.

II. Folia opposita nuda.

IRESINE

celosioïdes L.

ACHYRANTHES

argentea Lmk.
 fruticosa Lmk.
 crispa.
 virgata.
 lappacea. L.
 styracifolia Lmk.
 muricata. L.
 porrigens. Jacq.

GOMPHRENA

globosa L.
 interrupta L.

ILLECEBRUM

lanatum L.
 javanicum L.

III. Folia opposita, stipulacea.

PARONICHIA (*illecebrum* L.)

verticillata.
 echinata Desf.
 vulgaris.
 capitata.
 ficoïdea
 sessilis.
 achyrantha.
 frutescens L'Her.

blette. F. ⊙
 sauvage. F. ⊙
 membranense. Am. m. ⊙

2. Cinq étamines.

pâle. ⊙
 paniculée. Am. m. ⊙ (orn.)
 hybride. F. ⊙
 à longs épis. Pérou. ⊙ (orn.)
 épineuse. Inde. ⊙

CÉLOSIA

argenté. Inde. ⊙
 perlé. Inde. ⊙
 à trois styles. Afr. ⊙
 à crêtes. Asie. ⊙ (orn.)
 pourpre. Inde. ⊙ (orn.)

II. Feuilles opposées nues.

IRESINÉ

sanx celosia. Am. m., s. ch. ♀

CADELARI

argenté. Barbarie. ⊙
 arbrisseau. Inde. ♀
 crépu. Inde. ♀
 à longs épis. Inde. ♀
 hérissé. Inde. ♀
 à semill. de styrax. Inde ⊙
 épineux. Égypte. ⊙
 étalé. Pérou. ♀ (orn.)

AMARANTINE

globuleuse. Inde. ⊙ (orn.)
 interrompue. Am. m. ♀

ILLECÈBRE

laineuse. Inde. ⊙
 de Java. Inde. ♂

III. Feuilles opposées, accompagnées de stipules.

PARONIC

verticillé. F. ⊙
 hérissé. Barbarie. ♀
 commun. F. m. ♀
 à fleurs en tête. ♂
 ficoïde. Am. m., s. ch. ♀
 sessile. Inde, s. ch. ♀
 achyrantha. Orient. ⊙
 arbrisseau. Pérou, s. ch. ♀

HERNIARIA

suffruticosa.
 illecebrum suffruticosum L. }
 fruticosa L.
 glabra L.
 hirsuta L.
 incana.

HERNIOLE

sous-arbrisseau. barb., or. ♪
 ligneuse. F., or. ♪
 liège. F. ☉
 velue. F. ☉
 blanche. esp. ♣

ORDO II.

PLANTAGINES.

ORDRE II.

LES PLANTAINS.

PLANTAGO

PLANTAIN

1. Caule folioso.

1. Tige feuillée.

psyllium.
 arenaria Wild. }
 indica. L.
 cynops L.
 squarrosa L.
 stricta Schousb.

psyllium. F. ☉
 des Indes. égypte. ☉
 cynops. F. ♣
 rude. égypte. ☉
 serré. maroc. ☉

2. Scapo nudo.

2. Tige nue.

maxima Jacq.
 asiatica Lmk.
 cordata Lmk.
 major L.
 media L.
 crassa Wild.
 lanceolata L.
 lagopus L.
 amplexicaulis Cav.
 serraria L.
 vaginata Vent.
 virginica L.
 albicans L.
 interrupta Poiret.
 alpina L.
 sphaerocephala Poiret. }
 alpina Jacq. }
 microcephala Poiret. }
 villosa Roth. }
 cretica L.
 maritima L.
 subulata L.
 læstingii L.
 coronopus L.

capuchon. sibérie. ♣
 d'Asie. ♣
 en cœur. Am. s. ♣
 commun. F. ♣ (méd.)
 moyen. F. ♣ (méd.)
 charnu. ♣
 lancéolé. F. ♣
 lagopus. F. ☉
 amplexicaule. esp. ♣
 en scie. barbarie. ♣
 à gaines. canaries, or. ♪
 de Virginie. Am. s. ☉
 blanchâtre. F. m. ♣
 interrompu. Am. s. ♣
 des Alpes. F. ♣
 à tête ronde. Alpes. ♣
 à petites têtes. orient. ☉
 de Crète. orient. ♂
 maritime. F. ♣
 en alène. F. m. ♣
 de Læsting. esp. ☉
 corne de cerf. F. ☉

LITTORELLA

LITTORELLE

lacustris L.

des marais. F. ♣

ORDO III.

NYCTAGINES.

MIRABILIS

jalapa L.
— lutea.
longiflora L.

viscosa Cav.
aggregata Cav.

ABRONIA

umbellata Link.

BOERHAAVIA

erecta L.
diffusa L.
hirsuta L.
obtusifolia Link.
scandens L.
tuberosa Link.

PISONIA

aculeata L.
fragrans.
nitida.

ORDO IV.

PLUMBAGINES.

PLUMBAGO

europæa L.
scandens L.
rosea L.

STATICE.

1. *Caule ramoso.*

monopetala L.
— angustifolia.
suffruticosa L.
limonium L.
latifolia Smith.
cordata L.
minuta L.
mucronata L. f.
tatarica L.
oleæfolia Scop.

ORDRE III.

LES NYCTAGES.

MIRABILIS

belle de nuit. Am. m. ♀ (orn.)
— jaune.
à longues fleurs. Mexique,
or. ♀ (orn.)
visqueuse. Pérou, s. ch. ♀
agglomérée. N. esp., s. ch. ♀

ABRONIA

ombellifère. Californie. ☉

BOERHAAVIA

droit. Am. m., s. ch. ♀
étalé. Am. m., s. ch. ♀
velu. Am. m., s. ch. ♀
à feuil. obtuses. Am. m., s. ch. ♀
grimpant. Am. m., s. ch. ♂
tubéreux. Pérou, s. ch. ♂

PISONIA

épineux. Am. m., s. ch. ♂
odorant. Am. m., s. ch. ♂
luisant. Am. m., s. ch. ♂

ORDRE IV.

LES DENTELAIRES.

DENTELAIRE

d'Europe. F. m. ♀ (méd.)
grimpante. Am. m., s. ch. ♂
rose. Inde, s. ch. ♂ (orn.)

STATICÉ.

1. *Tige rameuse.*

monopétale. F. m., or. ♂
— à feuil. étroites.
sous-arbrisseau. Sibérie. ♂
limonium. F. ♀ (orn.)
à larges feuil. sibér. ♀ (orn.)
à feuil. en cœur. F. m., or. ♀
petite. F. m., or. ♀
crépue. Barbar., or. ♀ (orn.)
de Tartarie. ♀
à feuil. d'olivier. Ital., or. ♀

sinuata L.
spicata *Wild.*

2. *Caule simplici , floribus capitatis.*

armeria L.
— minor.
fasciculata *vent.*

sinuée. Alger, or. ♂
à épis. perse, or. ♀

2. Tige simple , fleurs en tête.

gazon d'olymp. F. ♀ (orn.)
— *petit gazon d'olymp.*
fasciculée. sardaigne, or. ♀

CLASSIS VIII.

DICOTYLEDONES

MONOPETALAE.

(*corolla hypogyna.*)

ORDO I.

LYSIMACHIÆ.

I. *Flores cauli insidentes.*

CENTUNCULUS

minimus L.

ANAGALLIS

arvensis L.
— cœrulea.
monelli L.
collina *schousb.*
latifolia L.
tenella L.

LYSIMACHIA

vulgaris L.
ephemerum L.
orientalis *Link.*
thyrsiflora L.
punctata L.
ciliata L.
nemorum L.
nummularia L.
linum stellatum L.

HOTTONIA

palustris L.

CORIS

monsperiensis L.

CLASSE VIII.

DICOTYLÉDONS

MONOPÉTALES.

(*corolle attachée sous le pistil.*)

ORDRE I.

LES LYSIMACHIES.

1. Fleurs sur la tige.

CENTENILLE

naine. F. ☉

MOUÛON

des champs. F. ☉
— *blen.*
de Monelli. esp. ♂
de Maroc. or. ♀
à larges fenill. esp. ☉
rampant. F. ♀

LYSIMACHIE

commune. F. ♀ (méd.)
éphémère. esp. ♀ (orn.)
d'orient. ♀
en thyrs. F. ♀
punctuée. F. ♀
ciliée. Am. S. ♀
des bois. F. ♀
nummulaire. F. ♀
lin étoilé. F. ☉

HOTTONIA

des marais, F. ♀

CORIS

de Montpellier. F. M. ♀

LIMOSELLA

aquatica L.

TRIENTALIS

europæa L.

ARETIA

vitaliana L.

II. Flores scapo insidentes umbellati,
involucro polyphylo, rarius solitarii.

ANDROSACE

maxima L.

septentrionalis L.

elongata L.

lactea L.

carnea L.

villosa L.

PRIMULA

veris L.

elatior *wild.*

— acanlis.

✱ auricula L.

marginata *wild.*

farinosa L.

viscosa *All.*

integrifolia L.

villosa *Jacq.*auriculata *Lmk.*

CORTUSA

matthioli L.

SOLDANELLA

alpina L.

DODECATHÉON

meadia L.

CYCLAMEN

europæum L.

hederæfolium *H. K.*

[III. Genera *lysimachiis* affinia.

GLOBULARIA

alpinum L.

longifolia *H. K.* }salicina *Lmk.* }

vulgaris L.

linifolia *Lmk.*

LIMOSELLE

aquatique. F. ☉

TRIENTALIS

d'Europe. F., Alpes. ☿

ARÉTIA

des Alpes. F. ☿

II. Fleurs sur une hampe disposées en
ombelle, accompagnées d'un involucre,
ou plus rarement solitaires.

ANDROSACÉ

à grand calice. F. ☉

du nord. Russie. ☉

à longs pédoncules. F. ☉

blanche. F., Alpes. ☿

couleur de chair. F., Alpes. ☿

velue. F., Alpes. ☿

PRIMEVÈRE

commune. F. ☿ (orn.)

élevée. F. ☿ (orn.)

— sans tige.

oreille d'ours. F., Alp. ☿ (orn.)

bordée. Suisse. ☿

farineuse. F., Alpes. ☿

risqueuse. F., Alpes. ☿

à feuil. entières. F., Alpes. ☿

velue. F., Alpes. ☿

auriculée. orient, or. ☿

CORTUSA

de Matthioli. F., Alpes. ☿

SOLDANELLE

des Alpes. F. ☿

DODÉCATHÉON

meadia. Am. s., or. ☿ (orn.)

CYCLAMEN

d'Europe. F. m. ☿ (orn.)

à feuil. de terre. Italie, or. ☿

(orn.)

III. Genres qui ont de l'affinité avec les
lysimachies.

GLOBULAIRE

alpinum. F. m., or. ☿ (vén.)

à feuil. longues. madère, or. ☿

commune. F. ☿

glauque. Espagne. ☿

nudicaulis L.

cordifolia L.

SAMOLUS

valerandi L.

UTRICULARIA

vulgaris L.

minor L.

PINGUICULA

vulgaris L.

MENYANTHES

trifoliata L.

nymphoides L.

ovata. L.

à tiges nues. F., Alpes. ψ à feüill. en cœur. F., Alpes. ψ

SAMOLUS

monron d'eau. F. \odot

UTRICULAIRE

commune. F. ψ grêle. F. ψ

GRASSETTE

commune. F. ψ

MÉNANTHE

trèfle d'eau. F. ψ (méd.)à feüill. de nymphée. F. ψ à feüill. ovales. cap, or. ψ

ORDO II.

PEDICULARES.

I. Stamina 2, aut plura, non didynama.

POLYGALA.

1. Cristatæ.

vulgaris L.

amara L.

monspeliaca L.

austriaca crantz.

myrthifolia L.

oppositifolia L.

2. Imberbes.

chamæbuxus L.

heisteria L.

VERONICA.

1. Spicatæ.

virginiana L.

spuria L.

maritima L.

longifolia L.

incana L.

spicata L.

hybrida L.

pinnata H. K.

incisa H. K.

2. Corymboso-racemosæ.

officinalis L.

bellidiodes L.

fruticulosa L.

ORDRE II.

LES PÉDICULAIRES.

1. 2 étamines, ou plus, non-didynames.

POLYGALA.

1. Fleurs barbues.

commun. F. ψ amer. F. ψ de Montpellier. F. \odot d'Autriche. F. \odot à feüill. de myrthe. cap, or. ψ à feüill. opposées. cap, or. ψ

2. Fleurs non-barbues.

à feüill. de buis. F. ψ d'Heister. cap, or. ψ

VÉRONIQUE.

1. Fleurs en épis.

de Virginie. Am. s. ψ à feüill. ternées. sibérie. ψ maritime. Eur. ψ à longues feüill. suisse. ψ blanche. russie. ψ à épis. F. ψ hybride. suède. ψ pennee. sibérie. ψ incisée. sibérie. ψ

2. Grappes de fleurs en corymbe.

officinale. F. ψ (méd.)à feüill. de paquerette. F. ψ fruticuleuse. F., Alpes. ψ

alpina L.
 decussata *Wild.*
 serpyllifolia L.
 beccabunga L.
 anagallis L.
 scutellata L.
 tenerium L.
 prostrata L.
 chamædrys L.
 latifolia L.
 urticæfolia H. K.
 montana L.
 multifida L.
 austriaca *Wild.*
 orientalis H. K.

3. *Pedunculis unifloris.*

persica.
 agrestis L.
 arvensis L.
 hederæfolia L.
 triphyllos L.
 verna L.
 romana L.
 præcox *All.*
 acinifolia *Wild.*
 digitata *Vahl.*
 chamæpithyoides *Link.* }

SIBTHORPIA

europæa L.
 africana.

DISANDRA

prostrata L.

II. *Stamina 4 didynama.*

ERINUS

alpinus L.

MANULEA

oppositiflora *Vent.*
 alterniflora.

EUPHRASIA

officinalis L.
 odontites L.
 lutea L.
 viscosa L.

PEDICULARIS

palustris L.
 sylvatica L.

des Alpes. F. ♀
en croix. Détroit de Magell. ♂
à fenill. de serpolet. F. ♀
beccabunga. F. ♀ (méd.)
anagallis. F. ♂ (méd.)
à fenill. lineaires. F. ♀
germandrée. F. ♀
conchée. F. ♀
chamædrys. F. ♀
à larges fenill. F. ♀
à fenill. d'ortie. F. ♀
de montagne. F. ♀
déconpée. Sibérie. ♀
d'Antriche. ♀
d'Orient. ♀

3. *Pedoncules à une fleur.*

de Perse. ♂
agreste. F. ♂
des champs. F. ♂
à fenill. de lierre. F. ♂
à trois lobes. F. ♂
printanière. F. ♂
romaine. F. ♂
précoce. F. ♂
à fenill. d'acinos. F. ♂
digitée. F. m. ♂

SIBTHORPIA

d'Europe. F. ♀
d'Afrique. or. ♀

DISANDRA

conchée. orient, or. ♀

II. 4 étamines didynames.

ÉRINUS

des Alpes. F. ♀

MANULEA

à fenill. opposées. cap, or. ♂
à fleurs alternes. n. noll. ♂

EUPHRAISE

officinale. F. ♂ (méd.)
ronge. F. ♂
jaune. F. ♂
visqueuse. F. ♂

PÉDICULAIRE

des marais. F. ♂
des bois. F. ♂

RHINANTHUS

crista galli L.
— hirsuta.

MELAMPYRUM

arvense L.
cristatum L.
pratense L.
sylvaticum L.

OROBANCHE

major *smith.*
caryophyllacea *smith.*
minor *smith.*
ramosa L.

LATHRÆA

clandestina L.

COCRÈTE

crête de coq. F. ☉
— velue. F. ☉

MELAMPYRUM

des champs. F. ☉
à crête. F. ☉
des prés. F. ☉
des bois. F. ☉

OROBANCHE

élevée. F. ♀
odorante. F. ♀
petite. F. ♀
rameuse. F. ♀

CLANDESTINE

commune. F. ♀

ORDO III.

ACANTHI.

I. Stamina 4 didynama.

ACANTHUS

mollis L.

spinosus L.
spinosissimus.

RUELLIA

blechnum L.
strepens L.
varians *vent.*
eranthenum pulchellum *andr.* }
ovata *cav.*
laetea *cav.*
patula *jacq.*
tuberosa L.

II. Stamina 2.

JUSTICIA.

I. Fruticosa.

adhatoda L.
hyssopifolia L.
ecbolium L.
gandarussa L.
quadrifida *vahl.* }
coecinea *cav.* }
furcata *jacq.* }
peruviana *cav.* }

ORDRE III.

LES ACANTHES.

I. 4 étamines didynames.

ACANTHE

branche-ursine. ital. ♀ (orn.,
méd.)
épineuse. ital. ♀
très-épineuse. ♀

RUELLIA

blechnum. Am. m., cr. ♀
élastique. Am. s., or. ♀
blen. inde, s. ch. ♂
ovale. mexique, s. ch. ♂
blanc. mexique, s. ch. ♀
étalé. inde. ♂
tubereux. Am. m., s. ch. ♀

II. 2 étamines.

CARMANTINE.

I. Tiges ligneuses.

adhatoda. ceylan, or. ♂ (orn.)
à feuill. d'hysope. canar., or. ♂
ecbolium. inde, s. ch. ♂
gandarussa. inde, s. ch. ♂
rouge. N. esp., s. ch. ♂
fourchue. vérou. ♀

2. *Herbaceæ.*

ciliaris *L. f.*
 lithospermifolia *Jacq.* }
 ladanoïdes *Link.* }
 bicaliculata *Walp.* }
 ligulata *Cav.* }

ELYTRARIA *Mich.*
 virgata *Mich.*

ORDO IV.

J A S M I N E Æ.

I. *Fructus capsularis.*

SYRINGA

vulgaris *L.*
 persica *L.*
 — laciniata.

FRAXINUS

excelsior *L.*
 — argentea.
 — verrucosa.
 — jaspidea.
 — horizontalis.
 — pendula.
 rotundifolia *Link.*
 lentiscifolia. }
 parvifolia *Link.* }
 monophylla.
 ornus *L.*
 pubescens *Link.*
 americana *L.*
 caroliniana *Link.*
 juglandifolia *Link.*
 sambucifolia *Link.*
 platycarpa *Mich.*

FONTANESIA

phillyreoides *Will.*

II. *Fructus baccatus.*

CHIONANTHUS

virginica *L.*
 incrassata *Swartz.*

OLEA

europæa *L.*
 — buxifolia.
 capensis *L.*
 americana *L.*

2. *Tiges herbacées.*

ciliée. ceylan. ☉
 à feuell. de grémil. pérrou,
 s. ch. ☉
 caliculée. inde, s. ch. ☉

ELYTRARIA

effilé. am. s., or. ☿

ORDRE IV.

LES J A S M I N S.

I. Une capsule.

LILAS

commun. asie. ☉ (orn.)
 de Perse. asie. ☉ (orn.)
 — lacinié. (orn.)

FRÊNE

élevé. f. ☉
 — argenté.
 — graveleux.
 — jaspé.
 — horizontal.
 — pendant.
 à feuell. rondes. Italie. ☉
 à feuell. de lentisque. orient. ☉
 à une feuell. am. s. ☉
 à fleurs. Italie. ☉ (orn., méd.)
 pubescent. am. s. ☉
 d'Amérique. am. s. ☉
 de Caroline. am. s. ☉
 à feuell. de noyer. am. s. ☉
 à feuell. de sureau. am. s. ☉
 à fruit large. am. s. ☉

FONTANESIA

à feuell. de filaria. as. ☉ (orn.)

II. Fruit charnu.

CHIONANTE

de Virginie. am. s. ☉ (orn.)
 renflé. am. m., s. ch., or. ☉

OLIVIER

cultivé. f. m., or. ☉ (écon., méd.)
 — à feuell. de buis.
 du Cap, s. ch. ☉
 d'Amérique. am. s., or. ☉

fragrans *rhumb.*
emarginata *Link.*

PHILLYREA

angustifolia *L.*
media *L.*
latifolia. *L.*
— levis.

MONGORIUM

sambac.

JASMINUM

glaucum *H. K.*
fruticans *L.*
humile *L.*
odoratissimum *L.*
azoricum *L.*
volubile *Jacq.*
mauritianum.
officinale *L.*
grandiflorum *L.*

LAGUSTRUM

vulgare *L.*

ORDO V.

VITICES.

I. Flores oppositè corymbosi.

CLERODENDRUM

infortunatum *L.*

VOLKAMERIA

aculeata *L.*
inermis *L.*
angustifolia.
japonica *Jacq.*

ÆGIPHILA

martinicensis *L.*
macrophylla.

VITEX

agnus castus *L.*
— albidus.
incisa *Link.*
— alba.
trifolia *Link.*

FILARIA

odorant. chine, or. ♀ (écon.)
échancré. inde, s. ch. ♀

à feuell. étroites. *F.* ♀ (orn.)
moyen. *F. m.* ♀ (orn.)
à larges feuell. *F. m.* ♀ (orn.)
— lisse.

MONGORI

jasmin d'Arabie. inde, s. ch. ♀
(orn.)

JASMIN

glaucue. cap, s. ch. ♀ (orn.)
cytise. *F. m.* ♀ (orn.)
d'Italie. or. ♀ (orn.)
jonquille. or. ♀ (orn.)
des Açores. or. ♀ (orn.)
sarmenteux. inde, s. ch. ♀ (orn.)
de l'Isle de France. s. ch. ♀
officinal. inde. ♀ (orn.)
à grandes fleurs. inde, or. ♀
(orn.)

TROËNE

commun. *F.* ♀ (orn.)

ORDRE V.

LES GATTILIER.

I. Fleurs en corymbes et opposées.

CLÉRODENDRUM

visqueux. inde, s. ch. ♀

VOLKAMERIA

épineux. *Am. m.*, s. ch. ♀
sans épines. inde, s. ch. ♀
à feuilles étroites. s. ch. ♀
du Japon. s. ch. ♀ (orn.)

ÆGIPHILA

de la Martinique. s. ch. ♀
à grandes feuell. *Am. m.*, s. ch. ♀

VITEX

agnus castus. *F. m.* ♀ (méd.)
— à fleurs blanches.
incisé. chine. ♀ (orn.)
— à fleurs blanches.
à feuilles ternées. inde, s. ch. ♀

CALLICARPA
americana L.

CORNUTIA
pyramidata L.

TECTONA
grandis L. f.

II. Flores racemosi in racemis alterni.

CITHAREXYLUM
cinereum L.
quadrangulare L.

caudatum Z.

pentandrum Vent.

DURANTA
plumieri L.
ellisii Z.
microphylla.

LANTANA
trifoliata L.
annua H. K.
involucrata L.
recta H. K.
salvifolia Jacq.
cinerea Lmk.
nivea Vent.
suaveolens.
camara L.
aculeata L.
— flava.

SPIELMANNIA
africana Willd.

VERBENA
globifera l'Her.
triphylla l'Her.
mexicana L.
mutabilis Jacq.
jamaicensis L.
indica L.
nodiflora L.
multifida Fl. Per.
aubleitia L.
urticifolia L.
caroliniana L.

CALLICARPA
d'Amérique. Am. s., or. ♀

CORNUTIA
pyramidal. Am. m., s. ch. ♀

THEK
élevé. inde, s. ch. ♀

II. Fleurs alternes et en grappes.

BOIS-GUITTARE
cendré. Am. m., s. ch. ♀
quadrangulaire. Am. m., s.
ch. ♀
à longues grappes. Am. m.,
s. ch. ♀
à 5 étamines. Am. m., s. ch. ♀

DURANTA
de plumier. Am. m., s. ch. ♀
lancéolé. Am. m., s. ch. ♀
à petites feuil. Am. m., s. ch. ♀

LANTANA
à feuil. ternées. Am. m., s. ch. ♀
annuel. Am. s. ☉
à involucre. Am. m., s. ch. ♀
à tiges droites. Am. m., s. ch. ♀
à feuil. de sauge. cap, s. ch. ♀
cendré. Am. m., s. ch. ♀
à fleurs blanches. inde, s. ch. ♀
odorant. s. ch. ♀
camara. Am. m., s. ch. ♀ (orn.)
épineux. Am. m., s. ch. ♀ (orn.)
— jaune.

SPIELMANNIA
d'Afrique. cap, s. ch. ♀

VERVEINE
à globules. Am. m., s. ch. ♀
citronelle. chili, or. ♀ (orn.)
du Mexique. or. ♀
changeante. Am. m., s. ch. ♀
de la Jamaïque. Am. m. ☉
des Indes. ceylan ☉
nodiflore. orient, or. ♀
laciniée. pérou. ☉
à bouquets. Am. s. ♂
à feuil. d'ortie. Am. s. ♀
de Caroline. Am. s. ♀

stricta vent.
paniculata zmk.
diffusa.
hastata z.
bonariensis z.
bracteosa mich.
officinalis z.
supina z.

Genera viticibus affinia.

SELAGO

corymbosa z.

HEBENSTREITIA

dentata z.

ORDO VI.

L A B I A T Æ.

I. Stamina 2 fertilia.

LYCOPUS

europæus z.
exaltatus z.

AMETHYSTEA

cœrulea z.

ZIZIPHORA

capitata z.
tenuior z.
cunila.
pulegioides.
mariana.

MONARDA

fistulosa z.
didyma z.
punctata z.

WESTERINGIA

rosmarinacea andr. }
cunila fruticosa wild. }

ROSMARINUS

officinalis z.

SALVIA.

1. Fruticosa.

pomifera z.
officinalis z.

fasciculée. Am. s. ♀
paniculée. Am. s. ♀
étalée. ♀
hastée. Am. s. ♀
de Buénos-Ayres. ♂
à longues bractées. Am. s. ☉
officinale. F. ♀ (méd.)
couchée. F. m. ☉

Genres qui ont de l'affinité avec les
gattiliers.

SÉLAGO

corymbifère. cap, or. ♀

HÉBENSTREIT

denté. cap. ♂

ORDRE VI.

LES LABIÉES.

I. 2 étamines fertiles.

LYCOPUS

d'Europe. F. ♀
pinnatifide. Italie. ♀

AMÉTHYSTÉA

bleu. Sibérie. ☉

ZIZIPHORA

à fleurs en tête. orient. ☉
lancéolé. F. m. ☉
cunila. Sibérie. ☉
à feuill. de pouliot. Am. s. ☉
de Virginie. Am. s. ♀

MONARDA

fistuleux. Am. s. ♀ (orn.)
écarlate. Am. s. ♀ (orn.)
punctué. Am. s. ♂

WESTERINGIA

à feuill. de romarin. N. holl.,
or. ♀

ROMARIN

officinal. F. m. ♀ (orn., méd.)

SAUGE.

1. Tiges ligneuses.

à pommes. crête, or. ♀ (écon.)
officinale. F. m. ♀ (méd.)

— tricolor.
 — variegata.
 tenuior.
 grandiflora *Wild.*
 crassifolia.
 cretica *L.*
 sypilea *Zmk.*
 africana *L.*
 paniculata *L.*
 chamædryoides *Cav.*
 aurea *L.*
 canariensis *L.*
 mexicana *L.*
 formosa *L'Her.*
 acetabulosa *L.*
 polystachia *Cav.*
 foetida *Desf.* }
 tingitana *Wild.* }
 coccinea *L. f.*

2. *Caule herbaceo.*

pinnata *L.*
 angustifolia *Mich.*
 reptans *Jacq.* }
 angustifolia *Cav.* }
 scabiosæfolia. }
 habliziana *Wild.* }
 glutinosa *L.*
 amara *Jacq.* }
 circinata *Cav.* }
 pratensis *L.*
 sclarea *L.*
 patula *Desf.*
 præcox. }
 spinosa *Jacq.* }
 æthyopis *L.*
 austriaca *Jacq.*
 argentea *L.*
 indica *L.*
 bicolor *Desf.*
 ceratophylla *L.*
 ceratophylloïdes *L.*
 lanigera.
 runcinata *L. f.*
 erosa.
 sylvestris *L.*
 nemorosa *L.*
 virgata *Jacq.*

— *de trois couleurs.* (orn.)
 — *panachée.* (orn.)
de Catalogne. *F. m.* ♀ (méd.)
à grandes fleurs. ♀
à feuell. épaisses. ♀
de Crète. orient, or. ♀
du mont Sypile. or. ♀
d' Afrique. cap, or. ♀
paniculée. cap, or. ♀
chamædrys. mexique, or. ♀
dorée. cap, or. ♀
des Canaries. or. ♀
du Mexique. or. ♀
écarlate. pérrou, s. ch. ♀ (orn.)
à grand calice. orient, or. ♀
à plusieurs épis. mexique, or. ♀
fétide: tunis, or. ♀
rouge. am. s., s. ch. ♀

2. *Tige herbacée.*

pennée. orient, or. ♂
à feuell. étroites. am. s. ♀
rampante. n. esp., s. ch. ♀
à feuell. de scabiense. tauride. ♀
gluante. f., alpes. ♀
amère. mexique. ♀
des prés. f. ♀ (méd.)
sclurée. f. ♂ (méd.)
étalée. barbar., or. ♀
précoce. orient. ☉
cotonneuse. orient. ♂
d' Autriche. ♀
argentée. orient. ♂
des Indes. ♀
bicolor. Alger. ♀ (orn.)
corne de cerf. syrie, or. ♂
laciniée. sicile, or. ♂
laineuse. perse, or. ♂
pinnatifide. cap. ♂
rongée. ☉
sauvage. Allemagne. ♀
des bois. Autriche. ♀
effilée. orient. ♀

nubica H. K.
 nilotica L.
 disermas L.
 viscosa Jacq.
 verticillata L.
 napifolia L.
 ægyptiaca L.
 horminum L.
 — rubens.
 viridis L.
 nepetifolia.
 verbenaca L.
 lyrata L.
 micrantha.
 serotina Jacq.
 dominica L.
 hispanica L.
 tiliæfolia Vahl.
 nutans L.
 pendula.
 nutans Wald. }

COLLINSONIA

canadensis L.

II. Stamina 4, corollæ labium superius
 nullum aut brevissimum.

AJUGA

orientalis L.
 genevensis L.
 pyramidalis L.
 reptans L.

TEUCRIUM

canariense Lmk.
 fruticans L.
 rosmarinifolium Lmk.
 betonicum l'Her.
 abutylloïdes l'Her.
 campanulatum L.
 orientale L.
 chamæpitys L.
 pseudochamæpitys L.
 iva L.
 laxmanni L.
 botrys L.

de Nubie. ☉

du Nil. ☉

disermas. syrie. ♀

visqueuse. Italie. ♀

verticillée. F. m. ♀

à feuell. de navet. F. ♀

d'Egypte. orient. ☉

ormin. F. m. ☉

— rouge.

verte. Italie. ☉

à feuell. de cataire. ☉

verveine. F. m. ♂

en lyre. Am. s. ♂

à petites fleurs. ♂

tardive. orient. ♂

des Antilles. s. ch. ♀

d'Espagne. ☉

à feuell. de tilleul. Pérou. ☉

penchée. Russie. ♀

pendante. Russie. ♀

COLLINSONIA

de Canada. ♀

II. 4 étamines, lèvre supérieure de la
 corolle nulle ou très-courte.

BUGLE

d'orient. or. ♀

de Genève. F. ♀

pyramidale. F. ♀

rampante. F. ♀

GERMANDRÉE

des Canaries. or. ♀

arbrisseau. F. m., or. ♀

à feuell. de romarin. orient,

or. ♀

à feuell. de bétouine. canaries,

or. ♀

à feuell. d'abutylon. canaries,

or. ♀

campanulée. orient. ♀

d'orient. ♀

chamæpitys. F. ☉ (méd.)

faux chamæpitys. barbarie,

or. ♀

ivette. F. m., or. ♀ (méd.)

de Laxmann. sibérie. ♂

botrys. F. ☉ (méd.)

flavum L.
lucidum L.
chamædrys L.
— major.
myrthifolium.

marum L.
multiflorum L.

canadense L.
massiliense L.
asiaticum L.
scorodonia L.
scordium L.
montanum L.
pyrenaicum L.
aureum *schreb.* }
flavicans *Lmk.* }
polium L.
capitatum L.
spinosum L.

III. Stamina 4 fertilia, corolla bilabiata.

SATUREIA

globulifera.
græca L.
juliana L.
capitata L.
thymbra L.
montana L.
hortensis L.

HYSSOPUS

officinalis L.
— myrthifolius.
lophanthus L.
nepetoïdes L.
ocymifolius *Lmk.*

NEPETA

cataria L.
pannonica L.
nepetella L.
amethystina.
longiflora *vent.*
nuda L.
— alba.
violacea L.
crispa *wild.*

jaune. esp. ♀
luisante. F. m. ♀
chamædrys. F. ♀ (méd.)
— élevée.
à feuell. de myrthe. orient,
or. ♀
marum. esp., or. ♀ (méd.)
à fleurs nombreuses. Espagne,
or. ♀
de Canada. ♀
de Marseille. F. m., or. ♀
d'Asie. or. ♀
des bois. F. ♀ (méd.)
scordium. F. ♀ (méd.)
de montagne. F. m., or. ♀
des Pyrénées. F. ♀
jaunâtre. F. m., or. ♀
polium. F. m., or. ♀
à fleurs en tête. orient, or. ♀
épineuse. esp. ♂

III. 4 étamines fertiles, corolle à deux lèvres.

SARIETTE

à globules. Am. s. ♀
de Grèce. orient, or. ♀
à feuell. linéaires. orient, or. ♀
à fleurs en tête. orient, or. ♀
thymbra. orient, or. ♀
de montagne. F. ♀
des jardins. F. ☉ (écon., méd.)

HYSOPE

officinale. F. ♀ (méd.)
— à feuell. de myrthe.
renversée. chinc. ♀
à feuell. de cataire. Am. s. ♂
à grandes bractées. sibérie. ☉

CATAIRE

herbe aux chats. F. ♀ (méd.)
paniculée. Autriche. ♀
à feuell. étroites. F. ♀
améthyste. ♀
à longues fleurs. orient, or. ♀
nue. suisse. ♀
blanche.
violette. Espagne. ♀
crépue. orient. ♀

italica L.
 reticulata Desf.
 tuberosa L.
 bipinnata Cav.
 multifida L. f. non L. spec. }

d'Italie. ♀
 réticulée. barbarie. ♀
 tubéreuse. espagne. ♀
 bipennée. sibiérie. ☉

PERILLA

ocymoides L.

PÉRILLA

à feuil. de basilic. inde. ☉

LAVANDULA

spica L.
 — latifolia.
 stœchas L.
 dentata L.
 multifida L.
 pinnata L.
 elegans.
 abrotanoïdes *W. illd.* }

LAVANDE

spic. f. m. ♀ (orn., méd.)
 — à larges feuil.
 stœchas. f. m., or. ♀ (méd.)
 dentée. esp., or. ♀
 décompée. barbarie, or. ☉
 pennée. madère, or. ♀
 élégante. canaries, or. ♀ (orn.)

SIDERITIS.

1. Ebracteata.

cretica L.
 canariensis L.
 montana L.
 romana L.
 nigricans *Link.* }
 elegans *W. illd.* }

2. Bracteata.

syriaca
 perfoliata L.

3. Bracteata bracteis dentatis.

hirsuta L.
 foetida.
 scordioides L.
 hyssopifolia L.
 incana L.
 glauca Cav.

SIDÉRITIS.

1. Fleurs sans bractées.

de Crète. or. ♀
 des Canaries. or. ♀
 de montagne. f. ☉
 de Rome. f. m. ☉
 noirâtre. ☉

2. Fleurs accompagnées de bractées.

de Syrie. orient. ♀
 perfolié. orient. ♀

3. Bractées dentées.

velu. f. ♀
 fétide. espagne. ♀
 à feuil. de scordium. f. ♀
 à feuil. d'hysope. f. ♀
 blanc. espagne, or. ♀
 glauque. espagne. ♀

BISTROPOGON

canariense l'Her.
 punctatum l'Her.

BISTROPOGON

des Canaries. or. ♀
 ponctué. canaries, or. ♀

MENTHA.

1. Spicata.

sylvestris L.
 viridis L.
 rotundifolia L.
 crispa L.
 piperita L.

MENTHE.

1. Fleurs en épis.

sauvage. f. ♀ (méd.)
 verte. f. ♀ (méd.)
 ronde. f. ♀ (méd.)
 crépue. f. ♀ (méd.)
 poivrée. anglet. ♀ (écon., méd.)

2. *Capitata.*

aquatica L.
citrata *wild.*

3. *Verticillata.*

sativa L.
gentilis L.
arvensis L.
pulegium L.
cervina L.

HYPTIS

capitata *Jacq.*

GLECOMA

hederacea L.

LAMIUM

orvala L.
hirsutum *Emk.*
garganicum L.
purpureum L.
amplexicaule L.
album L.
molle *H. K.*

GALEOPSIS

tetralit. L.
ladanum L.
grandiflora *wild.*
galeobdolon L.

BETONICA

officinalis L.
hirsuta L.
orientalis L.
alopeuros L.

STACHYS

sylvatica L.
palustris L.
lanata *Jacq.*
germanica L.
intermedia *H. K.*
palæstina L.
alpina L.
circinata *L'Her.*
nepetifolia.
hirta L.
decumbens.

2. Fleurs en tête.

aquatique. F. Ψ
citronelle. EUR. Ψ

3. Fleurs verticillées.

cultivée. EUR. Ψ (écon., méd.)
purpurine. EUR. Ψ
des champs. F. Ψ (méd.)
pouliot. F. Ψ (méd.)
fétide. F. m. Ψ

HYPTIS

à fleurs en tête. AM. m., s. ch. Ψ

GLECOMA

lierre-terrestre. F. Ψ (méd.)

LAMIUM

orvale. italic. Ψ
velu. F. Ψ
à feuil. de cataire. italie. Ψ
pourpre. F. \odot
amplexicaule. F. \odot
blanc. F. Ψ (méd.)
à feuil. entières. Ψ

GALÉOPSIS

tétrahit. F. \odot
ladanum. F. \odot
à grandes fleurs. F. \odot
jaune. F. Ψ

BÊTOINE

officinale. F. Ψ (méd.)
velue. F. Ψ
d'orient. Ψ
jaune. F., Alpes. Ψ

STACHYS

des bois. F. Ψ
des marais. F. Ψ
laineux. sibérie. Ψ
cotonneux. F. Ψ
intermédiaire. AM. s. Ψ
de Palestine. OR. Ψ
des Alpes. F. Ψ
à feuil. rondes. BARB., OR. Ψ
à feuil. de cataire. Ψ
velu. F. Ψ
tombant. Ψ

arvensis L.
recta L.
annua L.
maritima L.

BALLOTA

lanata L.
nigra L.

MARRUBIUM.

1. *Calicibus quinque dentatis.*

alyssum L.
peregrinum L.
candidissimum L.
supinum L.

2. *Calicibus decem dentatis.*

vulgare L.
crispum L.
pseudodictamnus L.
hispanicum Link.

LEONURUS

marrubiastrum L.
sibiricus L.
cardiaca L.
crispus L.
tataricus L.

PHLOMIS

fruticosa L.
 — *angustifolia*.
 — *latifolia*.
italica Smith.
purpurea Smith.
lychnitis L.
laciniata L.
herba-venti L.
tuberosa L.
leonurus L.
nepetifolia L.
zcylica L.
caribæa Jacq. }
martiniensis Wild. }

MOLUCELLA

levis L.
spinosa L.

des champs. F. ☉
crapaudine. F. ♀
annuel. F. ☉
maritime. F. ♂

BALLOTE

laineuse. sibérie. ♀
noire. F. ♀

MARRUBE.

1. Calice à cinq dents.

alysson. esp., or. ♂
étranger. orient. ♀
très-blanc. orient. ♀
couché. F. m. ♀

2. Calice à dix dents.

commun. F. ♀ (méd.)
crêpe. ital., or. ♀
faux-dictame. orient, or. ♀
d'Espagne. ♀

CARDIAQUE

à petites fleurs. Allem. ☉
de Sibérie. ♂
officinale. F. ♀ (méd.)
crêpe. sibérie. ♀
de Tartarie. ☉

PHLOMIS

arbrisseau. orient. ♀ (orn.)
 — *à feuell. étroites*.
 — *à larges feuell*.
d'Italie. or. ♀
pourpre. esp., or. ♀
à feuell. de sauge. F. m., or. ♀
lacinié. syrie. ♀
violet. F. m. ♀
tubéreux. sibérie. ♀ (orn.)
leonurus. cap, or. ♀ (orn.)
à feuell. de cataire. inde. ☉
de Ceylan. inde. ☉
des Antilles. ☉

MOLUCELLE

lisse. syrie. ☉
épineuse. syrie. ☉

IV. *Stamina 4 fertilia, corolla bilabiata, calix bilabiatus.* IV. 4 étamines fertiles, corolle et calice à deux lèvres.

CLINOPODIUM

vulgare L.
incanum L.

ORIGANUM

dictamnus L.

vulgare L.
humile.
pallidum.
sipyleum L.
smyrneum L.
ægyptiacum L.
majoranoïdes *W. ild.*

THYMUS

serpyllum L.
— villosum.
— citratum.
piperella L.
vulgaris L.
— latifolius.
filifolius H. K.
zygis L.
hispanicus.
mastichina L.
alpinus L.
patavinus Jacq.
acinos L.
virginicus L.

THYMBRA

spicata L.

MELISSA

officinalis L.
— hirsuta.
arborescens.
grandiflora L.

nepeta L.
calamintha L.
cretica L.

DRACOCEPHALUM

virginianum L.

canariense L.
peregrinum L.

CLINOPODE

commun. F. ♀
blanc. Am. S. ♀

ORIGAN

dictame. crête, or. ♀ (orn., méd.)
commun. F. ♀ (méd.)
nain. ♀
pâle. orient. ♀
du mont Sipyle. orient, or. ♀
de Smyrne. orient, or. ♀
à coquilles. orient, or. ♀ (orn.)
marjolaine des jard. orient. ♀

THYM

serpolet. F. ♀
— velu.
— citronelle.
piperelle. esp., or. ♀
commun. esp. ♀ (orn., méd.)
— à larges feuil.
filiforme. mahon, or. ♀
zygis. esp., or. ♀
d'Espagne. or. ♀
mastichine. esp., or. ♀
des Alpes. F. ♀
de Padoue. ♂
acinos. F. ☉
de Virginie. ♀

THYMBRA

à épis. orient, or. ♀

MÉLISSE

officinale. F. ♀ (écon., méd.)
— velue.
arborescente. esp. ♀
à grandes fleurs. F., Alpes. ♀ (orn.)
nepeta. F. ♀
calament. F. ♀ (méd.)
de Crête. F. m. ♀

DRACOCÉPHALUM

de Virginie, ou cataleptique.
Am. S. ♀ (orn.)
des Canaries. or. ♀
découpé. sibérie. ♀

austriacum L.
 ruyschiana L.
 sibiricum L.
 moldavica L.
 canescens L.
 peltatum L.
 nutans L.
 thymiflorum L.

d'Autriche. ♀
 à feuell. linéaires. sibérie. ♀
 de Sibérie. ♀
 moldavique. sibérie. ○
 blanc. orient. ○
 en bouclier. orient. ○
 à fleurs penchées. sibérie. ○
 à fleurs de thym. sibérie. ○

MELLITIS

melissophyllum L.

MELLITIS

à feuell. de mélisse. F. ♀

HORMINUM

pyrenaicum L.

ORMIN

des Pyrénées. F. ♀

PLECTRANTHUS

fruticosus l'Her.
 punctatus l'Her.

PLECTRANTHUS

arbrisseau. cap, or. ♀
 tacheté. Afr. ♂

OCYUM

gratissimum L.
 zeylanicum Medic.
 grandiflorum l'Her.

BASILIC

suave. inde, s. ch. ♀
 de Ceylan. s. ch. ♀
 à grandes fleurs. Arabie,
 s. ch. ♀
 à petites fleurs. inde. ○
 cultivé. inde. ○ (orn.)
 — lacinié.
 — bulleux.
 nain. ceylan ○ (orn.).

tenuiflorum L.
 basilicum L.
 — fimbriatum.
 — bullatum.
 minimum L.

SCUTELLARIA

orientalis L.
 fruticosa.
 lupulina L.
 alpina L.
 lateriflora L.
 galericulata L.
 minor L.
 integrifolia L.
 peregrina L.
 altissima L.
 albida L.

SCUTÉLLAIRE

d'orient. or. ♀
 arbrisseau. perse. ♀
 jaune pâle. sibérie. ♀
 des Alpes. F. ♀
 à grappes. Am. s. ♀
 toque. F. ♀
 petite. F. ♀
 à feuell. entières. Am. s. ♀
 étrangère. Italie. ♀
 élevée. orient. ♀
 blanche. orient. ♀

PRUNELLA

vulgaris L.
 grandiflora L.
 laciniata L.
 hyssopifolia L.
 ovata.

BRUNELLE

commune. F. ♀
 à grandes fleurs. F. ♀
 laciniée. F. ♀
 à feuell. d'hysope. F. m. ♀
 à feuell. ovales. Am. s. ♀

CLEONIA

lusitanica L.

CLÉONIA

de Portugal. ○

PRASIUM

majus L.
minus L.

PRASIUM

arbrisseau. F. m., or. ♀
herbacé. italie, or. ♀

ORDO VII.

SCROPHULARIÆ.

I. Stamina 4 didynama.

BUDLEIA

globosa Lmk.
salvifolia H. K.

SCOPARIA

dulcis L.

CAPRARIA

biflora L.

HALLERIA

lucida L.

SCROPHULARIA

nodosa L.
aquatica L.
betonicifolia L.

auriculata L.

altaica Murr.

scorodonia L.

sambucifolia L.

mellifera Vahl.

trifoliata L.

levigata Vahl.

appendiculata Jacq. }

orientalis L.

vernalis L.

peregrina L.

glabrata Jacq.

lucida L.

canina L.

frutescens L.

DODARTIA

orientalis L.

LINARIA (*Antirrhinum* L.).

1. *Foliis angulatis.*

cymbalaria.

pilosa.

ORDRE VII.

LES SCROPHULAIRES.

I. 4 étamines didynames.

BUDLÉIA

à globules. chili. ♀ (orn.)
à feuell. de sauge. cap, or. ♀

SCOPARIA

doux. am. m., s. ch. ♀

CAPRARIA

à deux fleurs. am. m., s. ch. ♀

HALLERIA

luisant. cap, or. ♀

SCROPHULAIRE

des bois. F. ♀ (méd.)
aquatique. F. ♂ (méd.)
à feuell. de bétouine. portugal,
or. ♀

auriculée. Alger. ♀

de Sibérie. ♀

scorodonia. italie, or. ♀

à feuell. de sureau. orient. ♀

mellifère. barbarie. ♀

à trois feuell. barbarie. ♀

d'orient. ♀

printanière. F. ♂

etragère. italie. ☉

glabre. canaries. ♂

luisante. orient, or. ♀

laciniée. F. ♀

arbrisseau. tunis. ♀

DODARTIA

d'orient. ♀

LINAIRE.

1. Feuilles anguleuses.

cymbalaire. F. ♀ (méd.)

velue. alpes. ♀

elatine.
spuria.
cirrhosa.
ægyptiaca.

2. *Foliis inferioribus oppositis.*

triphylla.
triornithophora.

reticulata Desf. }
pinifolia Poiret. }
purpurea.
bipartita Vent.
versicolor.
repens.
marginata Desf.
supina.
arvensis.
simplex Wild.
pelisseriana.
multicaulis.
juncea Link. }
spartea Cav. }
alpina.
elegans.
organifolia.
minor.
pubescens.

3. *Foliis alternis.*

hirta.
genistifolia.
vulgaris.
chalepensis.
canadensis.

ANTIRRHINUM

majus L.
orontium L.
molle L.
semipervirens Lapeyr.
asarina L.

ANARRHINUM (*Antirrhinum* L.)
bellidifolium.

NEMESIA Vent.

foetens Vent.
chamædrifolia Vent. }
antirrhinum macrocarpum H. K. }

élatiné. F. ☉
velvete. F. ☉
à vrilles. Égypte. ☉
d'Égypte. ☉

2. Feuilles inférieures opposées.

à feuill. ternées. Tunis. ☉
à grandes fleurs. Portugal. ☉
(orn.)

à réseau. Barbarie. ♀

pourpre. F. ♀ (orn.)
à fleurs d'orchis. Maroc. ☉
bignarrée. F. ☉
rampante. F. ♀
membraneuse. Barbarie, or. ♀
couchée. F. ☉
des champs. F. ☉
à tiges simples. F. ☉
de pelisser. F. ☉
paniculée. Orient. ☉
jonciforme. Esp. ☉

des Alpes. F. ♂
élégante. Esp. ☉
à feuill. d'origan. F. m. ☉
petite. F. ☉
pubescente. ☉

3. Feuilles toutes alternes.

velue. Esp. ☉
à feuill. de genêt. Suisse. ♀
commune. F. ♀
à long éperon. F. ☉
de Cuscut. ☉

MUFLIER

des jnrds. F. ♂ (orn.)
tête de mort. F. ☉
à feuill. molles. Esp., or. ♀
toujours vert. F. m., or. ♀
asarine. F. ♀

ANARRHINUM

à feuill. de paquerette. F. ♂

NEMESIA.

fétide. cap, or. ♀
à feuill. de chamædrys. cap,
or. ♀

DIGITALIS

canariensis L.
 purpurea L.
 ambigua L.
 lutca L.
 ferruginea L.
 parviflora Jacq. }
 ferruginea Lmk. }
 orientalis Lmk. }
 lanata Wild. }
 obscura L.

II. Stamina 2.

CALCEOLARIA

pinnata L.

III. Genera *scrophulariis* affinia.
Oppositifolia.

COLUMNEA

humilis Lmk.

GRATIOLA

officinalis L.

MIMULUS

ringens L.
 glutinosus Wild. }
 aurantiacus Curt. }

LINDERNIA

pyxidaria L.

IV. Folia alterna.

BROWALLIA

elata L.

demissa L.

ORDO VIII.**SOLANÆÆ.**

I. Fructus capsularis.

CELSIA

orientalis L.
 arcturus L.
 cretica L.
 heterophylla.

HÆMITOMUS

fruticosus L'Her.

DIGITALE

des Canaries. or. ♀ (orn.)
 pourpre. F. ♂ (orn., méd.)
 ambiguë. F., Alpes. ♀
 jaune. F. ♀
 rouillée. Italie. ♀ (orn.)
 à petites fleurs. ♂

d'orient. ♀

à feuil. étroites. Esp., or. ♀

II. 2 étamines.

CALCÉOLAIRE

pennée. Pérou. ☉

III. Genres qui ont de l'affinité avec les
 scrophulaires. Feuilles opposées.

COLUMNEA

écarlate. Am. m. ♀

GRATIOLE

officinale. F. ♀ (méd.)

MIMULUS

à deux lèvres. Am. s. ♀

glutineux. or. ♀

LINDERNIA

pyxidaire. F. ☉

IV. Feuilles alternes.

BROWALLE

droite. Pérou. ☉

tombante. Am. m. ☉

ORDRE VIII.**LES SOLANÉES.**

I. Une capsule.

CELSIA

d'orient. ☉
 arcturus. orient, or. ♂
 de Crète. or. ♂
 à feuil. variables. or. ♂

HÆMITOMUS

arbrisseau. Pérou, s. ch. ♀
 (orn.)

VERBASCUM

thapsus *L.*
 thapsoïdes *L.*
 phlomoïdes *L.*
 lychnitis *L.*
 — album.
 mucronatum *Lmk.*
 nigrum *L.*
 sinuatum *L.*
 undulatum *Lmk.*
 phœniceum *L.*
 blattaria *L.*
 — alba.
 blattarioides *Lmk.*
 spinosum *L.*
 myconi *L.*

HYOSCIAMUS

niger *L.*
 reticulatus *L.*
 albus *L.*
 datora *Forsk.*
 betonicæfolius *Lmk.* }
 aureus *L.*
 pusillus *L.*
 physalodes *L.*
 scopolia *L.*

NICOTIANA

tabacum *L.*
 fruticosa *L.*
 glutinosa *L.*
 rustica *L.*
 paniculata *L.*
 crispa.
 undulata *Vent.*

DATURA

stramonium *L.*
 ferox *L.*
 tatula *L.*
 fastuosa *L.*
 metel *L.*
 humilis.
 ceratocaula *Jacq.*
 levis *L.*
 arborea *L.*

MOLÈNE

commune. *F.* ♂ (méd.)
 thapsoïde. *Eur.* ♂
 phlomoïde. *F.* ♂
 cunéiforme. *F.* ♀
 — blanche.
 pointue. orient. ♂
 noire. *F.* ♀
 sinuée. *F. m.* ♂
 ondée. orient, or. ♀
 bleue. caruiole. ♂
 blattaire. *F.* ☉
 — blanche.
 fausse blattaire. *F.* ☉
 épineuse. orient, or. ♀
 sans tige. *F.*, pyrénées. ♀

JUSQUIAME

noire. *F.* ♂ (vén.)
 réticulée. orient. ♂
 blanche. *F. m.* ☉
 datora. égypte, or. ♂
 jaune. orient, or. ♀
 grêle. orient. ☉
 faux coqueret. sibérie. ♀
 de Scopoli. Italie. ♀

NICOTIANE

tabac. *Am. m.* ☉ (écon., méd.)
 arbrisseau. chine, or. ♀
 gluante. pérou. ☉
 rustique. *Am. m.* ☉ (écon. méd.)
 paniculée. pérou. ☉ (écon.)
 crépue. pérou. ☉
 ondée. *N. holl.*, or. ♂

DATURA

épineux. *F.* ☉ (vén.)
 à grosses épines. chin. ☉ (vén.)
 tatula. *As.* ☉
 violet. égypte. ☉ (orn.)
 metel. *Asie.* ☉
 nain. ☉
 cornu. cuba. ☉
 à fruit lisse. abyssin. ☉ (vén.)
 en arbre. chili, or. ♀ (orn.)

II. *Fructus baccatus.*

SOLANDRA

grandiflora swartz. }
datura sarmentosa Lmk. }

ATROPA

mandragora L.
belladonna L.
solanacea L.
aristata H. K.
arborescens L. }
cestrum campanulatum Lmk. }
frutescens L.
procumbens Cav.

NICANDRA

physalodes.

PHYSALIS.

1. *Perennes.*

somnifera L.
arborescens L.
barbadensis Jacq.
incana.
curassavica L.
pensylvanica L.
alkekengi L.

2. *Annua.*

prostrata L'Her.
angulata L.
pubescens L.
philadelphica Lmk.

SOLANUM.

1. *Inermia.*

lycopersicum L.
pseudolycopersicum Jacq.
peruvianum L.
dulcamara L.
triquetrum Cav.
crassifolium Lmk.
quercifolium L.
radicans L.
corymbosum Jacq.
nigrum L.
 — *villosum.*
 — *guineense.*
 — *virginicum.*
nodiflorum Jacq.
tuberosum L.

II. Une baie.

SOLANDRA

à grandes fleurs. Am. m.,
s. ch. h

ATROPA

mandragore. F. m. ψ (vén.)
belladone. F. ψ (vén.)
à feuill. de solanum. cap, or. h
barbu. canaries, or. h
en arbre. Am. m., s. ch. h
arbrisseau. esp., or. ψ
couché. mexique. ⊙

NICANDRA

du Pérou. ⊙

COQUERET.

1. *Vivaces.*

somnifère. esp., or. h
en arbre. Am. m., s. ch. h
des Barbades. Am. m., s. ch. ψ
blanc. s. ch. ψ
de Curaçao. Am. m., or. h
de Pensylvanie. ψ
alkekengi. F. ψ (méd.)

2. *Annuels.*

couché. pérou. ⊙
anguleux. inde. ⊙
pubescent. inde. ⊙
à gros fruit. Am. s. ⊙

SOLANUM.

1. *Point d'aiguillons.*

tomate. Am. m. ⊙ (alim.)
fausse tomate. Am. m. ⊙
du Pérou. s. ch. h
douce-amère. F. h (méd.)
triangulaire. N. esp., s. ch. h
à feuill. épaisses. cap, or. h
à feuill. de chêne. pérou, or. ψ
rampant. pérou, or. ψ
corymbifère. pérou, or. ψ
noir. F. ⊙ (méd.)
 — *velu.*
 — *de Guinée.*
 — *de Virginie.*
nodiflore. île de F., s. ch. h
pomme de terre. pér. ψ (alim.)

reclinatum *Her.* }
 pinnatifidum *Lmk.* }
 macrocarpon *L.*
 æthiopicum *L.*
 diphyllum *L.*
 pseudocapsicum.

aggregatum *Jacq.*
 laurifolium *L. f.*

verbascifolium *L.*

auriculatum *Lmk.*
 bonariense *L.*
 grandiflorum.
 betaceum *Cav.*

2. *Aculeata.*

melongena *L.*
 — ovifera.
 fuscum *Lmk.*
 æthiopicum *L.*
 mammosum *L.*
 capsicoides. }
 ciliatum *Lmk.* }
 aculeatissimum *Jacq.*
 sodomæum *L.*
 virginianum *Jacq.*
 sarmentosum *Lmk.* }
 lanceafolium *Jacq.* }
 giganteum *Jacq.*
 marginatum *L.*
 tomentosum *L.*
 coccineum *Jacq.*
 polygamum *Vahl.*
 cleagnifolium *Cav.*

leprosum *Ortega.*
 bahamense *L.*
 igneum *L.*
 pyracantha *Lmk.*
 polyacanthos *Lmk.*
 caroliniense *Jacq.*
 milleri *Jacq.*
 stramonifolium *Jacq.*

cuneifolium *Jacq.*
 lycioides *L.*

recliné. Pérou, s. ch. ♂

à gros fruit. Pérou, s. ch. ♀
d'Ethiopie. ☉

à deux feuil. Am. m., s. ch. ♀
faux piment. Madère, or. ♀
 (orn.)

aggrège. Guinée, s. ch. ♀
à feuil. de laurier. Inde,
 s. ch. ♀
à feuil. de molène. Am. m.,
 s. ch. ♀

auriculé. Île de F., s. ch. ♀
à bouquets. or. ♀ (orn.)
à grandes fleurs. ♀
à feuil. de bette. Pérou, s. ch. ♀

2. Tiges garnies d'aiguillons.

melongène. Am. m. ☉ (alim)
 — *ovifère.*

brun. Am. m. ☉
d'Ethiopie. ☉
pomme de tetou. Am. m. ☉

faux piment. ☉

très-épineux. Am. m. ♀
hérissé. cap., or. ♀
de Virginie. ☉

sarmenteux. Am. m., s. ch. ♀

gigantesque. cap., s. ch. ♀
blanc. Abyssinie, s. ch. ♀
cotonneux. Éthiopie, s. ch. ♀
écarlate. As., s. ch. ♀
polygame. Am. m., s. ch. ♀
à feuil. de chaf. Am. m.,
 s. ch. ♀

lèpreux. Chili, s. ch. ♀
de Bahama. Am. m., s. ch. ♀
couleur de feu. Am. m., s. ch. ♀
de Madagascar. s. ch. ♀
polyacanthos. Am. m., s. ch. ♀
de Caroline. ♀
de Miller. cap., s. ch. ♀
à feuil. de stramoine. Inde,
 s. ch. ♀

cuneiforme. Am. m., s. ch. ♀
faux lycium. Pérou, or. ♀ (orn.)

CAPSICUM

grossum L.
— deflexum.
annuum L.
conicum.
frutescens L.
violaceum.
cerasiforme L.
baccatum L.

LYCIUM

afrum L.
europæum L.
carnosum.
barbarum L.
chinense *Link.*
boerhaaviæfolium L. *f.*

CESTRUM

nocturnum L.
diurnum L.
laurifolium *l'Her.*

macrophyllum.

auriculatum *l'Her.*
vespertinum L.
alaternoides.
parqui *l'Her.*

III. *Genera solaneis affinia.*

BONTIA

daphnoides L.

BRUNSFELSIA

americana L.

CRESCENTIA

cujete L.

ORDO IX.

BORRAGINEÆ.

I. *Fructus baccatus, caulis frutescens aut arborescens.*

CORDIA

sebestena L.

PIMENT

irrégulier. inde, s. ch. ♂ (écon.)
— abaissé.
annuel. am. m. ☉ (écon.)
conique. s. ch. ♂
arbrisseau. inde, s. ch. ♀ (ée.)
violet. chine, s. ch. ♂
cerise. s. ch. ♀
baccifère. inde, s. ch. ♀ (écon.)

LYCIUM

d'afrique. esp., or. ♀
d'Europe. f. m., or. ♀
charnu. or. ♀
lancéolé. chine. ♀ (orn.)
de Chine. ♀
glauque. pérou, or. ♀

CESTRUM

de nuit. am. m., s. ch. ♀
de jour. chili, s. ch. ♀
à feuell. de laurier. am. m.,
s. ch. ♀
à grandes feuell. am. m.,
s. ch. ♀
auriculé. pérou, s. ch. ♀
à fruit noir. am. m., s. ch. ♀
à feuell. d'alaterne. am. m. ♀
parqui. chili. ♀

III. Genres qui ont de l'affinité avec les solanées.

BONTIA

à feuell. de daphné. am. m.,
s. ch. ♀

BRUNSFELSIA

d'Amérique. am. m., s. ch. ♀

CALEBASSIER

des Antilles. s. ch. ♀ (écon.)

ORDRE IX.

LES BORRAGINÉES.

I. Graines dans une baie, tiges ligneuses.

CORDIA

sebestier. égypte, s. ch. ♀
(méd., alim.)

mixa L.
dentata *vahl.*
gerascanthus L.

macrophylla L.

nitida *vahl.*

parviflora *ortega.*
scabra.
sebestena *Andr.* }

EHRETIA

tinifolia L.

beurreria L.

VARRONIA

martinicensis L.

mirabilioides *jacq.*

corymbosa L.

TOURNEFORTIA

volubilis L.

humilis L.

scabra *lmk.*

arborescens *lmk.*

laurifolia *vent.*

mutabilis *vent.*

MESSERCHMIDIA

arguzia L.

fruticosa L.

angustifolia *lmk.*

II. *Fructus uni aut bicapsularis.*

ELLISIA

nyctelca.

HYDROPHYLLUM

virginicum L.

canadense L.

DICHONDRA

carolinensis *mich.*

CERINTHE

major L.

aspera *roth.*

minor L.

à feuell. lisses. ég., s. ch. 5

denté. am. m., s. ch. 5

à feuell. de verveine. am. m.,
 s. ch. 5

à grandes feuell. am. m.,
 s. ch. 5

à feuell. luisantes. am. m.,
 s. ch. 5

à petites fleurs. n. esp., s. ch. 5

à feuell. rudes. am. m., s. ch. 5

EHRETIA

à feuell. de laurier-tin. am. m.,
 s. ch. 5

de Beurrer. am. m., s. ch. 5

VARRONIA

de la Martinique. am. m.,
 s. ch. 5

à grandes fleurs. am. m.,
 s. ch. 5

corymbifère. am. m., s. ch. 5

TOURNEFORTIA

sarmenteux. am. m., s. ch. 5

nain. am. m., s. ch. 5

rude. am. m., s. ch. 5

arbre. inde, s. ch. 5

à feuell. de laurier. am. m.,
 s. ch. 5

à fleurs changeantes. inde,
 s. ch. 5

MESSERCHMIDIA

arguse. sibérie. 7

arbrisseau. canaries, or. 5

à feuell. étroites. canar., or. 5

II. Une ou deux capsules.

ELLISIA

de Virginie. ☉

HYDROPHYLLUM

de Virginie. am. s. 7

de Canada. am. s. 7

DICHONDRA

de Caroline. am. s., or. 7

MELINET

à grandes fleurs. f. m. ☉

à feuell. rudes. f. ☉

à fleurs aiguës. f. m. ♂

- III. *Fructus gymnotetraspermus*, faux corollæ nuda.
- III. 4 graines nues au fond du calice , entrée de la corolle nue.

HELIOTROPIMUM

peruvianum L.
indicum L.
europæum L.
villosum *Willd.*
parviflorum L.
supinum L.
curassavicum L.

ECHINUM.

1. Herbacea.

vulgare L.
pyrenaicum L.
australe *Link.*
plantagineum. }
creticum *Link.* }
prostratum }
creticum *Forsk.* }

2. Fruticosa.

candicans *Jacq.*
strictum *H. K.*

LITHOSPERMUM

arvense L.
officinale L.
purpureocœruleum L.
orientale L.
decumbens *Vent.*
fruticosum L.
callosum *Vahl.*

PULMONARIA

officinalis L.
angustifolia L.
virginica L.
sibirica L.
maritima L.

ONOSMA

echioides L.
simplicissima L.

- IV. *Fructus gymnotetraspermus*, faux corollæ instructa squamis 5.

SYMPHYTUM

officinale L.
tuberosum L.

HÉLIOTROPE

du Pérou. s. ch. ♀ (orn.)
des Indes. ☉
d'Europe. F. ☉ (méd.)
soyeuse. orient. ☉
à petites fleurs. inde. ☉
couchée. F. ☉
de Curaçao. Am. m., or. ♂

VIPÉRINE.

1. Tiges herbacées.

commune. F. ♂ (méd.)
des Pyrénées. F. ♂
rouge. orient. ☉
à feuell. de plantain. Italie. ☉
couchée. Égypte. ♀

2. Tige ligneuse.

blanchâtre. canaries, or. ♀
serrée. canaries, or. ♀

GRÉMIL

des champs. F. ☉
officinal. F. ♀ (méd.)
bleu pourpre. F. ♀
d'orient. ♀
tombant. perse. ☉
arbrisseau. F. m., or. ♀
calleux. Égypte, or. ♀

PULMONAIRE

officinale. F. ♀ (méd.)
à feuell. étroites. F. ♀
de Virginie. Am. s. ♀
de Sibérie. ♀
maritime. F. ☉

ONOSMA

à feuell. de vipérine. F. ♂
à tige simple. Sibérie. ♂

- IV. 4 graines au fond du calice , tube de la corolle couronné de 5 écailles.

CONSOUDE

officinale. F. ♀ (méd.)
tubéreuse. F. ♀

LYCOPSIS

arvensis L.
— undulata.
orientalis L.

ECHIOÏDES (*Lycopsis* L.)

nigricans.
rubra.

MYOSOTIS

nana *Wild.*
scorpioides L.
palustris L.
lappula L.
apula L.

ANCHUSA

italica *Retz.*
angustifolia L.
barrelieri *All.*
tinctoria L.
sempervirens L.
verrucosa *Lmk.*

BORAGO

officinalis L.
orientalis L.
indica L.
africana L.

ASPERUGO

procumbens L.

CYNOGLOSSUM

officinale L.
apenninum L.
montanum *Lmk.*
cheirifolium L.
linifolium L.
omphalodes L.

NOLANA

prostrata L.

ORDO X.**CONVOLVULI.****CONVOLVULUS.**

1. *Caule volubili.*

arvensis L.
sepium L.

LYCOPSIS

des champs. F. ☉
— ondulé.
d'orient. ☉

ECHIOÏDES

noir. ital. ☉
rouge. ital. ☉

MYOSOTIS

nain. F. ☉
des champs. F. ☉
des marais. F. ☿
hérissé. F. ☉
jaune. ital. ☉

BUGLOSE

officinale. ☿ (méd.)
à feuell. étroites. orient. ☿
de barrelier. Alpes. ☿
orcanette. F.m., or. ☿ (arts.)
toujours verte. espagn. ☿
tuberculeuse. Égypte. ☉

BOURRACHE

officinale. F. ☉ (méd.)
d'orient. ☿
des Indes. ☉
d'Afrique. ☉

RAPETTE

couchée. F. ☉

CYNOGLOSSE

officinale. F. ♂ (méd.)
des Apennins. ♂
de montagne. F., Alpes. ☿
à feuell. de cheiri. orient. ♂
à feuell. de lin. esp. ☉
omphalodès. F. ☿ (orn.)

NOLANA

couchée. Pérou, or. ♂

ORDRE X.**LES LISERONS.****LISERON.**

1. Tige grimpante.

des champs. F. ☿
des haies. F. ☿ (méd.)

inflatus.
 panduratus L.
 farinosus L.
 batatas L.
 nervosus Lmk.
 canariensis L.
 jalapa L.
 ipomœa macrorrhiza Mich. }
 althacoides L.

pentaphyllus L.
 cairicus L.
 dissectus L.
 hermanniæ L'Her. }
 crenatus Jacq. }
 fruticulosus Lmk.
 sibiricus L.
 ebracteatus Lmk.
 siculus L.

2. Caule non volubili.

pentapetaloides L.
 evolvuloides Desf.
 lineatus L.
 cneorum L.
 oleæfolius Lmk.

cantabrica L.
 pilosellæfolius Lmk.
 doryenium L.
 tricolor L.
 pes-capræ L.
 soldanella L.

IPOMOEÆ

quamoclit L.
 coccinea L.
 luteola Jacq.
 leucantha Jacq.
 bona-nox L.
 tuberculosa.
 stipulacea Jacq. }
 convolvulus tuberculosus Lmk. }
 triloba L.
 hederacea.
 nil.
 quinqueloba.
 purpurea.

renflé. Am. s. ♀ (orn.)
 sinué. Am. s. ♀
 farineux. madère, or. ♂
 patate. Am. m., s. ch. ♀ (alim.)
 à nervures. inde, s. ch. ♀
 des Canaries. or. ♀
 jalap. Mexique, or. ♀ (méd.)
 à feuell. de guimauve. F. m.,
 or. ♀
 à 5 feuell. Am. m. ☉
 du Caire. ☉
 découpé. Am. m. ☉
 à feuell. d'hermannia. Pér. ♀
 fruticuleux. canaries, or. ♀
 de Sibérie. ☉
 sans bractées.
 de Sicile. ☉

2. Tige non grimpante.

à 5 divisions. Italie. ☉
 évolutus. barbarie. ☉
 rayé. F. m., or. ♀
 satiné. orient, or. ♀ (orn.)
 à feuell. d'olivier. orient, or. ♀
 (orn.)
 lineaire. F. ♀
 à feuell. de piloselle. orient. ♀
 dorycnium. orient. ♀
 tricolor. Esp. ☉ (orn.)
 pied de chèvre. inde. ♀
 soldanelle. F. ♀ (méd.)

IPOMÉÆ

quamoclit. inde. ☉ (orn.)
 ecarlate. Am. m. ☉
 jaune. Am. m. ☉
 à fleurs blanches. Am. m. ☉
 épineux. Am. m. ☉
 tuberculeux. île de F., s. ch. ♀
 à 5 lobes. Am. m. ☉
 à feuell. de lierre. Am. m. ☉
 nil. Am. m. ☉
 à 5 lobes. ♀
 pourpre. Am. m. ☉ (orn.)

EVOLVULUS

Alsinoides L.
linifolius L.

CRESSA

cretica L.

Genera convolvulis affinia.

CUSCUTA

europæa L.
— epithymum.

ORDO XI.**POLEMONIA.****PHLOX**

suaveolens H. K.
glaberrima L.
paniculata L.
divaricata Willd.
maculata L.
setacea L.
reptans Michx.

POLEMONIUM

cœruleum L.
reptans L.

COBÆA

scandens Cav.

ORDO XII.**BIGNONIÆ.****CHELONE**

glabra L.
pentstemon L.
barbata Cav.
campanulata Cav.

SESAMUM

orientale L.

BIGNONIA.

1. *Foliis simplicibus.*

catalpa L.
quercus Link.
sempervirens L.

EVOLVULUS

à feuell. d'alsiné. inde. ☉
à feuell. de lin. Antilles. ☉

CRESSA

de Crète. orient, or. ♀

Genres qui ont de l'affinité avec les
liserons.

CUSCUTE

d'Europe. F. ☉
— épithym. F. ☉

ORDRE XI.**LES POLÉMOINES.****PHLOX**

odorant. Am. s. ♀
glabre. Am. s. ♀
paniculé. Am. s. ♀ (orn.)
étalé. Am. s. ♀
tacheté. Am. s. ♀ (orn.)
à feuell. étroites. Am. s. ♀
rampant. Am. s. ♀

POLÉMOINE

bleue. Eur. ♀ (orn.)
rampante. Am. s. ♀ (orn.)

COBÆA

sarmenteux. chili, or. ♂

ORDRE XII.**LES BIGNONES.****CHELONE**

glabre. Am. s. ♀ (orn.)
à 5 étamines. Am. s., or. ♀
barbue. Mexique. ♀
campanulée. Mexique. ♀

SÈSAME

d'orient. ☉ (écon.)

BIGNONE.

1. Feuilles simples.

catalpa. Am. s. ♂ (orn.)
à feuell. de chène. Am. m.,
s. ch. ♂
toujours verte. Am. s. ♂

2. *Foliis conjugatis.*

unguis L.
capreolata L.
crucigera L.

3. *Foliis digitatis.*

pentaphylla L.
leucoxydon L.

4. *Foliis pinnatis.*

radicans L.
stans L.
pandorana Andr.

MARTYNIA

proboscidea H. K.
angulosa Lmk.
perennis L.

ORDO XIII.

GENTIANÆ.

I. *Capsula simplex, unilocularis.*

GENTIANA.

1. *Corollis quinquefidis, subcampaniformibus.*

lutea L.
asclepiadea L.
pneumonanthe L.
acaulis L.
amarella L.

2. *Corollis quadrifidis.*

campestris L.
cruciata L.

SWERTIA

perennis L.

CHLORA

perfoliata L.

II. *Capsula simplex bilocularis.*

CHIRONIA

decussata Vent.

frutescens L.
linoides L.
baccifera L.

2. Feuilles conjuguées.

à griffes. Am. m., s. ch. h
à vrilles. Am. m., s. ch. h
crucifère. Am. s., or. h

3. Feuilles digitées.

à 5 feuil. Am. m., s. ch. h
à bois blanc. Am. m., s. ch. h

4. Feuilles pennées.

grimpeante. Am. s. h (orn.)
droite. Am. m., s. ch. h (orn.)
pandorana. île norfolk, or. h

MARTYNIA

à fruit cornu. Am. m. ☉
anguleux. Mexique. ☉
vivace. Am. m., s. ch. ψ

ORDRE XIII.

LES GENTIANES.

I. Capsule simple, à une loge.

GENTIANE.

1. Corolles presque en cloche, à cinq divisions.

jaune. F., Alpes. ψ (méd.)
à feuil. d'asclépias. F., Alp. ψ
pneumonanthe. F. ψ
sans tige. F., Alpes. ψ (orn.)
amarella. F. ☉

2. Corolle à quatre divisions.

des champs. F. ☉
croisette. F. ψ

SWERTIA

vivace. F., Alpes. ψ

CHLORA

perfolié. F. ☉

II. Capsule simple biloculaire.

CHIRONIA

à feuil. en croix. cap, or. h
(orn.)
arbrisseau. cap, or. h (orn.)
à feuil. de lin. cap, or. h
baccifère. cap, or. h

centaurium.

— minus.

filiformis.

III. Capsula didyma bilocularis.

SPIGELIA

anthelmia L.

marylandica L.

ORDO XIV.

A P O C I N E Æ.

I. *Germen duplex , fructus bifollicularis ,
semina non papposa.*

VINCA

major L.

minor L.

rosea L.

TABERNÆMONTANA

amsonia L.

citrifolia L.

nervosa.

CAMERARIA

latifolia L.

PLUMERIA

rubra L.

alba L.

II. *Germen duplex , fructus bifollicularis ,
semina papposa.*

NERIUM

oleander L.

— album.

— odoratum.

ECHITES

corymbosa L.

suberecta L.

STAPELIA

hirsuta L.

grandiflora Mass.

asterias Mass.

caespitosa Mass.

papulosa Dec.

petite centauree. F. ☉ (méd.)

— naine.

filiforme. F. ☉

III. Capsule didyme , à deux loges.

SPIGÉLIA

anthelmia. Am. m. ☉

de Maryland. Am. s. ☿

ORDRE XIV.

LES APOCINÉES.

I. 2 ovaires , 2 capsules folliculeuses ,
graines sans aigrettes.

PERVENCHE

grande. F. ♀ (méd., orn.)

petite. F. ♀ (orn.)

rose. inde, s. ch. ♀ (orn.)

TABERNÆMONTANA

amsonia. Am. s. ☿

à feüill. de citronier. Am. m.,
s. ch. ♀à grosses nervures. Am. m.,
s. ch. ♀

CAMÉRARIA

à larges feüill. Am. m., s. ch. ♀

PLUMÉRIA

rouge. Am. m., s. ch. ♀

blanc. Am. m., s. ch. ♀

II. 2 ovaires , 2 capsules folliculeuses ,
graines aigrettées.

NÉRIUM

laurierrose. orient, or. ♀ (orn.)

— blanc. (orn.)

— odorant. (orn.)

ECHITÈS

corymbifère. Am. m., s. ch. ♀

droit. Am. m., s. ch. ♀

STAPÉLIA

velu. cap, s. ch. ♀

à grandes fleurs. cap, s. ch. ♀

astérias. cap, s. ch. ♀

touffu. cap, s. ch. ♀

mamelonné. cap, s. ch. ♀

variegata L.
reticulata Mass.

panaché. cap, s. ch. 5
à réseau. cap, s. ch. 5

PERIPLOCA

græca L.
angustifolia Bill.

PÉRIPLOCA

de Grèce. orient. 5
à feuell. étroites. tunis, or. 5

APOCYNUM

androsæmifolium L.
cannabinum L.
hypericifolium H. K.
venetum L.

APOCIN

gobe-mouche. am. s. 7
à fleurs vertes. am. s. 7
à feuell. d'hypericum. am. s. 7
denté. italie. 7

CYNANCHUM

prostratum Cav.
acutum L.
monspeliacum L.
melanthos Vahl.
caroliniense Jacq.
erectum L.
mauritianum.

CYNANCUM

couché. mexique, s. ch. 7
aigu. f. m. 7
de Montpellier. f. m. 7
à fleurs noires.
de Caroline. am. s., or. 7
droit. syrie, 5
de l'Isle de France. s. ch. 5

ASCLEPIAS

vincetoxicum L.
nigra L.
nivea L.
curassavica L.
incarnata L.
tuberosa L.
amœna L.
linaria Cav.
mexicana Cav.
fruticosa L.
syriaca L.
gigantea L.
arborescens L.

ASCLÉPIAS

dompte-venin. f. 7 (méd.)
noir. f. m. 7
blanc. am. s., or. 7
de Curacao. s. ch. 5
incarnat. am. s. 7
tubéreux. am. s., or. 7
rose. am. s. 7
à feuell. de linair. or. 7
du Mexique. or. 7
arbrisseau. tunis, or. 5
à la ouate. am. s. 7 (arts.)
à grandes fleurs. ég., s. ch. 5
arbre. cap, s. ch. 5

III. *Germen simplex, fructus baccatus, aut rarius capsularis.*

III. Un seul ovaire, une baie, ou plus rarement une capsule.

RAUWOLFIA

nitida L.

canescens L.

RAUWOLFIA

à feuell. luisantes. am. m.,
s. ch. 5
blanchâtre. am. m., s. ch. 5

CERBERA

thevetia L.

CERBÈRA

thévétia. am. m., s. ch. 5

CARISSA

bispinosa.

CARISSA

bisfurqué. cap, s. ch. 5

STRYCHNOS

nux vomica L.

STRYCHNOS

noix vomique. inde, s. ch. 5

THEOPHRASTA
americana L.

THÉOPHRASTA
d'Amérique. am. m., s. ch. ♪

ORDO XV.

SAPOTÆ.

SIDEROXYLON
melanophleum L. }
laurifolium Lmk. }
atrovirens Lmk.
lycioides L.
tenax Lmk.
spinosum L.

CHRYSOPHYLLUM
glabrum L.
cainito L.
argenteum Jacq.

ACHRAS
sapota L.

MYRSINE
africana L.
relusa H. K.

ORDRE XV.

LES SAPOTILLIERS.

BOIS-FER
à feuell. de laurier. inde, s. ch. ♪
vert sombre. am. m., s. ch. ♪
à feuell. de saule. am. s. ♪
satiné. am. s., or. ♪
argant. af. s., or. ♪ (écon.)

CAIMITIER
glabre. am. m., s. ch. ♪
drapé. am. m., s. ch. ♪
argenté. am. m., s. ch. ♪

SAPOTILLIER
cultiue. am. m., s. ch. ♪ (alim.)

MYRSINÉ
d'Afrique. cap, or. ♪
à feuell. obtuses. açores, or. ♪

CLASSIS IX.

CLASSE IX.

DICOTYLEDONES DICOTYLÉDONS

MONOPETALÆ.

MONOPÉTALES.

(Corolla perigyna.)

(Corolle attachée au calice.)

ORDO I.

ORDRE I.

GUAYACANÆ.

LES PLAQUEMINIERS.

DIOSPYROS
ebenus L.
virginiana L.
lotus L.

PLAQUEMINIER
ébénier. ile de f., s. ch. ♪ (écon.)
de Virginie. am. s. ♪
lotos. orient. ♪ (alim.)

ROYENA
lucida L.
hirsuta L.
lycioides.

ROYENA
luisant. cap, or. ♪
velu. cap, or. ♪
à feuell. de lycium. ♪

STYRAX

officinale L.
levigatum H. K.

HALESIA

tetraptera L.
diptera L.

HOPEA

tinctoria L.

ORDO II.**RHODODENDRA.***I. Corolla monopetala.***KALMIA**

latifolia L.
angustifolia L.
glauca H. K.

RHODODENDRON

ferrugineum L.
hirsutum L.
maximum L.
minus Mich.
ponticum L.

AZALEA

viscosa L.
glauca L.
nudiflora L.
pontica L.
procumbens L.

*II. Corolla subpolypetala.***RHODORA**

canadensis l'Her.

LEDUM

palustre L.
latifolium Lmk.
thymifolium Lmk.

BEFARIA

paniculata Mich.

MENZIEZIA

polyfolia Juss. }
andromeda daboccia L. }

ITEA

virginiana L.
racemiflora l'Her.

STYRAX

officinal. F. m. h (méd.)
glabre. Am. s. h

HALÉSIA

à 4 ailes. Am. s. h
à 2 ailes. Am. s. h

HOPEA

des teinturiers. Am. s. h (arts.)

ORDRE II.**LES ROSAGES.***I. Corolle monopétale.***KALMIA**

à larges feuell. Am. s. h (orn.)
à feuell. étroites. Am. s. h (orn.)
glauque. Am. s. h (orn.)

RHODODENDRON

ferrugineux. F., Alpes. h
herissé. F., Alpes. h
d'Amérique. Am. s. h (orn.)
ponctué. Am. s. h (orn.)
de Pont. As. h (orn.)

AZALÉA

visqueux. Am. s. h (orn.)
glauque. Am. s. h (orn.)
à fleurs nues. Am. s. h (orn.)
de Pont. As. h (orn.)
couché. F., Alpes. h

*II. Corolle presque polypétale.***RHODORA**

de Canada. Am. s. h (orn.)

LÉDUM

des marais. Alpes. h (écon.)
à larges feuell. Am. s. h
à feuell. de thym. Am. s. h

BÉFARIA

paniculé. Am. s. h

MENZILZIA

à feuell. de polium. F. m. h

ITÉA

de Virginie. Am. s. h (orn.)
à grappes. Am. s. h

ORDO III.

ERICÆ.

I. *Germen superum.*

ERICA.

1. *Antheræ aristatæ.*a. *Foliis oppositis.**glutinosa Thunb.**lutea L.*b. *Foliis ternis.**paniculata L.**halicacaba L.**monsoniana L. f.**discolor Andr.**cruenta H. K.**nigrita L.**regerminans L.**urceolaris Thunb.**marifolia H. K.**planifolia L.**hirta Thunb.**articularis L.**viridi-purpurea L.**pubescens L.*c. *Foliis quaternis.**persoluta L.**gracilis Wendl.**castra L.**arborea L.**plumosa Thunb.**blæria ciliaris L.**glabella Thunb.**blæria purpurea L.**blæria Thunb.**blæria ericoïdes L.**mucosa L.**tetralix L.**abietina L.**verticillata Andr.**pattersonia Andr.*d. *Foliis senis.**mammosa L.**empetrifolia L.**spicata Thunb.*

ORDRE III.

LES BRUYÈRES.

I. Ovaire supère.

BRUYÈRE.

1. Anthères munies d'arêtes.

a. Feuilles opposées.

*glutineuse. cap, or. h**jaune. cap, or. h*

b. Feuilles ternées.

*paniculée. cap, or. h**vésiculeuse. cap, or. h**à grandes fleurs. cap, or. h**de deux couleurs. cap, or. h**couleur de sang. cap, or. h**à tige brune. cap, or. h**prolifère. cap, or. h**urcéolée. cap, or. h**à feuil. de marum. cap, or. h**à feuil. plates. cap, or. h**hérissée. cap, or. h**articulée. cap, or. h**vert-pourpre. portug. h**pubescente. cap, or. h*

c. Feuilles quatre à quatre.

*polymorphe. cap, or. h**grêle. cap, or. h**des Caffres. cap, or. h**en arbre. F. m., or. h**plumuse. cap, or. h**glabre. cap, or. h**blæria. cap, or. h**muquense. cap, or. h**tetralix. F. h**à feuil. de sapin. cap, or. h**verticillée. cap, or. h**de patterson. cap, or. h*

d. Feuilles six à six.

*mamelonnée. cap, or. h**à feuil. d'empetrum. cap, or. h**à épis. cap, or. h*

2. *Cristatæ.*a. *Foliis oppositis.**vulgaris* L.b. *Foliis ternis.**corifolia* L.*calicina* L.*triflora* L.*scoparia* L.*bergiana* L.*formosa* Thunb.*rubens* Thunb.*incarnata* Thunb.*cinerea* L.*australis* L.c. *Foliis quaternis.**ramentacea* Thunb.*margaritacea* Thunb.*baccans* L.*pendula* Wendl.*retorta* L. f.3. *Muticæ.*a. *Foliis ternis.**serrata* Thunb.*umbellata* L.*imbricata* L.*axillaris* Thunb.*sexfaria* H. K.*taxifolia* H. K.*capitata* L.*bruniades* L.*ciliaris* L.*virgata* Thunb.*hispidula* L. f.*petiverii* L.*banksii* Andr.*sebania* H. K.*monadelphæ* Andr.*plukenetii* L.*versicolor* Andr.*perspicua* Wendl.*aitonia* Andr.b. *Foliis quaternis aut pluribus.**pulchella* Thunb.*vestita* Thunb.*pinæ* Thunb.2. *Anthères en crête.*a. *Feuilles opposées.**commune.* F. hb. *Feuilles ternées.**à feuell. de coris.* cap, or. h*à grand calice.* cap, or. h*à fleurs ternées.* cap, or. h*à balais.* F. h*de Bergius.* cap, or. h*cannelee.* cap, or. h*rouge.* cap, or. h*incarnate.* cap, or. h*ceudrée.* F. h*australe.* Esp., or. hc. *Feuilles quatre à quatre.**à longs rameaux.* cap, or. h*perlée.* cap, or. h*globuleuse.* cap, or. h*pendante.* cap, or. h*conique.* cap, or. h3. *Anthères sans appendices.*a. *Feuilles ternées.**à feuell. en scie.* cap, or. h*ombellifère.* cap, or. h*imbriquée.* cap, or. h*axillaire.* cap, or. h*hexagone.* cap, or. h*à feuell. d'if.* cap, or. h*à fleurs en tête.* cap, or. h*laineuse.* cap, or. h*ciliée.* F. h*effilée.* cap, or. h*soyeuse.* cap, or. h*de Petiver.* cap, or. h*de Banks.* cap, or. h*de Sèba.* cap, or. h*monadelphæ.* cap, or. h*de Plukenet.* cap, or. h*de diverses couleurs.* cap, or. h*diaphane.* cap, or. h*d'Aiton.* cap, or. hb. *Feuilles quatre à quatre ou plus.**élégante.* cap, or. h*recouverte.* cap, or. h*en massne.* cap, or. h

coccinea L.
 purpurea Andr.
 grandiflora H. K.
 curviflora L.
 tubiflora L.
 conspicua H. K.
 cerinthoides L.
 ventricosa Thunb.
 fastigiata L.
 comosa L.
 mediterranea L.

multiflora L.

vagans L.
 hirsuta Thunb.
 cubica L.
 herbacea L.

ANDROMEDA

mariana L.
 nitida Bartram. }
 lucida Lmk. }
 coriacea H. K. }
 axillaris Lmk.
 paniculata L.
 racemosa L.
 arborea L.
 caliculata L.
 ferruginea L.
 polifolia L.
 — angustifolia.
 — latifolia.

ARBUTUS

unedo L.
 andrachne L.
 uva-ursi L.
 alpina L.

CLETHRA

alnifolia L.
 tomentosa Lmk.
 arborea H. K.

PYROLA

rotundifolia L.
 minor L.
 secunda L.
 uniflora L.
 maculata L.

écarlate. cap, or. h
 pourpre. cap, or. h
 à grandes fleurs. cap, or. h
 à fleurs courbes. cap, or. h
 tubulée. cap, or. h
 remarquable. cap, or. h
 à fleurs de cerinthé. cap, or. h
 ventrue. cap, or. h
 fasciculée. cap, or. h
 à fleurs serrées. cap, or. h
 de la Méditerranée. f. m.,
 or. h
 à fleurs nombreuses. f. m.,
 or. h
 étalée. f. m., or. h
 velue. cap, or. h
 cubique. cap, or. h
 précoce. suisse. h

ANDROMÉDA

de Maryland. Am. s. h

luisant. Am. m. h

axillaire. Am. s. h
 paniculé. Am. s. h
 à grappes. Am. s. h
 en arbre. Am. s. h
 caliculé. Am. s. h
 ferrugineux. Am. s. h
 à feuell. de polium. Am. s. h
 — à feuell. étroites.
 — à larges feuell.

ARBOUSIER

des Pyrénées. f. m., or. h (orn.)
 andrachné. orient, or. h
 busserole. f., Alpes. h (méd.)
 des Alpes. f. h

CLÉTHRA

à feuell. d'aune. Am. s. h (orn.)
 velu. Am. s. h (orn.)
 en arbre. canar., or. h (orn.)

PYROLE

ronde. f. v
 petite. f. v
 unilatérale. f. v
 à une fleur. f., Alpes. v
 maculée. Am. s. h

EPIGÆA

repens L.

GAULTHERIA

procumbens L.

erecta Vent.

II. *Germen inferum aut semi inferum.*

VACCINIUM

myrtillus L.

pensylvanicum Lmk.

uliginosum L.

vitis idea L.

stamineum L.

corymbosum L.

amœnum H. K.

disomorphum Mich. }

macrocarpon H. K.

oxyccocos L.

EMPETRUM

nigrum L.

ORDO IV.

CAMPANULÆ.

I. *Antheræ distinctæ.*MICHAXIA (*Mindium* Juss.)

campanuloides L'Her.

levigata Vent.

CANARINA

campanulata L.

CAMPANULA.

1. *Folia levia, calicis sinibus non reflexis.*

ceusisia L.

uniflora L.

hederæfolia L.

rotundifolia L.

rapunculus L.

persicifolia L.

obliqua Jacq.

pyramidalis L.

stylosa Lmk.

lilifolia L.

grandiflora L. f.

rhomboïdea L.

verticillata L.

EPIGÆA

rampant. Am. s. ♀

GAULTHERIA

de Canada. Am. s. ♀ (écon.)

à tige droite. Pérou, or. ♀

II. Ovaire infère ou moitié infère.

MYRTIL

lucet. F. ♀ (alim.)

de Pensylvanie. Am. s. ♀

des marais. F. ♀

ponctué. F., Alpes. ♀ (méd.)

à longues étamines. Am. s. ♀

corymbifère. Am. s. ♀

à gros fruit. Am. s. ♀

canneberge. F. ♀ (alim.)

EMPETRUM

à fruit noir. F., Alpes. ♀

ORDRE IV.

LES CAMPANULES.

I. Anthères distinctes.

MICHAXIA

rude. Syrie, or. ♂

lisse. Perse. ♂

CANARINE

campaniforme. Madère, or. ♀

CAMPANULE.

1. Feuilles lisses, sinus des calices non réfléchis.

du mont Cenis. Alpes. ♀

à une fleur. F., Alpes. ♀

à feuil. de lierre. F. ♀

à feuil. rondes. F. ♀

raiponce. F. ♂ (alim.)

à feuil. de pêcher. F. ♀

oblique. ♂

pyramidale. F. ♂ (orn.)

à long style. Sibérie. ♀

à feuil. de lis. Sibérie. ♀

à grandes fleurs. Tartarie. ♀

rhomboïdale. F., Alpes. ♀

verticillée. Russie. ♀

2. *Foliis asperis , sinibus calicis non reflexis.*

latifolia L.
trachelium L.
rapunculoïdes L.
hononiensis L.
glomerata L.
thyrsoides L.
tomentosa Lmk.
peregrina L. }
lanuginosa Lmk. }
erinus L.

3. *Sinibus calicis reflexis.*

medium L.
barbata L.
spicata L.
longifolia Lapeyr.
sibirica Jacq.

4. *Capsula columnifera aut prismatica.*

speculum L.
hybrida L.
perfoliata L.
aurca L.

TRACHELIUM
cœruleum L.

GESNERIA
tomentosa L.

PHYTEUMA
spicata L.
orbicularis L.
hemispherica L.
pinnata L.

II. *Anthera connata.*

LOBELIA
longiflora L.
cardinalis L.
siphilitica L.
inflata L.
cliffortiana L.
urens L.
triquetra L.
laurentia L.
erinus L.
pubescens Jacq.

2. *Feuilles rudes , sinus du calice non-réfléchis.*

à larges feüll. F., Alpes. ♀
gantelée. F. ♀
fausse raiponce. F. ♀
de Bologne. ital. ♀
agglomérée. F. ♀
en thyrs. F., Alpes. ♂
cotonneuse. orient. ♀
hérissée. orient. ♂
érine. F. ☉

3. *Sinus des calices réfléchis.*

des jardins. F. m. ♂ (orn.)
barbue. F., Alpes. ♀
en épi. F., Alpes. ♂
à longues feüll. pyrénées. ♀
de Sibérie. ♂

4. *Capsule en colonne ou prismatique.*

miroir de Vénus. F. ☉
hybride. F. ☉
perfoliée. F. ☉
jaune. canaries, or. ♀

TRACHELIUM
à fleurs blenes. Afr. s., or. ♀

GESNERIA
cotonneux. Am. m., s. ch. ♀
(orn.)

PHYTEUMA
en épis. F. ♀
orbiculaire. F. ♀
hémisphérique. F. ♀
à feüll. pennées. orient, or. ♀

II. *Anthères réunies.*

LOBELIA
à longues fleurs. Am. m., s. ch. ♀
cardinale. Am. s. ♀ (orn.)
siphilitique. Am. s. ♀ (méd.)
renflé. Am. s. ☉
de Cliffort. Am. m. ☉
brûlant. F. ☉
triangulaire. cap, or. ♂
à longs pedoncules. ital. ☉
à feüll. d'érine. Afr. ☉
pubescent. cap, or. ♀

minuta L.
dortmanna Z.

nain. corse, or. ♀
aquatique, f. ♀

GOODENIA
ovata Smith.

GOODENIA
ovale, n. holl. ♀

JASIONE
montana L.
perennis Zmk.

JASIONÉ
de montagne, f. ♂
vivace, ♀

CLASSIS X.

CLASSE X.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

MONOPETALÆ.

MONOPÉTALES.

(*Corolla pistillo imposita* ,
antheræ connatæ.)

(Corolle sur le pistil , anthères
réunies.)

ORDO I.

ORDRE I.

SEMIFLOSCULOSÆ.

LES SEMIFLOSCULEUSES.

I. *Receptaculum nudum* , *semen absque pappo.*

I. Réceptacle nud , graines sans aigrette.

LAMPSANA
communis L.
— *crispa.*

LAMPSANE
commune, f. ☉
— *crépue.*

RHAGADIOLUS (*Lapsana* L.)
stellatus.
lampsanoïdes.
kolpinia Zmk.

RHAGADIOLE
étoilée, orient. ☉
fausse lampsane, orient. ☉
herissée, tartarie. ☉

II. *Receptaculum nudum* , *semen papposum.*

II. Réceptacle nud , graines couronnées
d'une aigrette.

PRENANTHES
muralis L.
vininea L.
purpurea L.
alba L.
pinnata L.

PRÉNANTHÈS
des murailles, f. ♂
effilé, f. ♀
pourpre, f., Alpes. ♀
blanc, f., Alpes. ♀
penné, canaries, or. ♀

CHONDRILLA
juncea L.

CONDRIILLE
jonciforme, f. ♀

LACTUCA
perennis L.
tenerrima Potirret.

LAITUE
vivace, f. ♀
glauque, f. ♀

saligna z.
 virosa z.
 — laciniata.
 scariola z.
 — sanguinea.
 sativa z.
 — romana.
 — capitata.
 — crispa.
 intybacea Jacq.
 spinosa z.

SONCHUS

fruticosus z.
 sibiricus z.
 tataricus z.
 cordifolius.
 plumieri z.
 alpinus z.
 floridanus z.
 multiflorus.
 oleraceus z.
 — asper.
 divaricatus Desf.
 chondrilloïdes Desf.
 tenerrimus z.
 palustris z.
 arvensis z.
 maritimus z.

HIERACIUM.

1. Caulc folioso.

fruticosum.
 umbellatum z.
 sabaudum z.
 — maculatum.
 — latifolium.
 blattarioides z.
 pyrenaïcum z.
 amplexicaule z.
 villosum z.
 grandiflorum Wald. }
 pappoleucum Vill. }
 alpinum z.
 intybaceum Jacq. }
 albidum Vill. }
 tubulosum Zmk. }
 cerinthoïdes z.
 paludosum z.

lancéolée. F. ☉
 vireuse. F. ☉
 — laciniée.
 escariote. F. ☉ (alim.)
 — pourpre.
 cultivée. ☉ (alim.)
 — romaine.
 — pommée.
 — crépue.
 à tige nue. Am. m. ☉
 épinense. Alger, or. ☿

LAITRON

arbrisseau. canaries, or. ☿
 de Sibérie. ♀
 de Tartarie. ♀
 à feuell. en cœur. ♀
 de plumier. F., Alpes. ♀
 des Alpes. F. ♂
 de Floride. Am. s. ♂
 à fleurs nombreuses.
 commun. F. ☉
 — rude.
 étulé. Égypte, or. ♀
 à tige de coudrille. Barb. ☉
 lucinié. F. ☉
 des marais. F. ♀
 des champs. F. ☉
 maritime. F. ♀

EPERVIÈRE.

1. Tige feuillue.

arbrisseau. ☿
 ombellifère. F. ♀
 de Savoie. F. ♀
 — tacheté.
 — à larges feuell.
 à feuell. de blattaire. F., Alp. ♀
 des Pyrénées. F. ♀
 amplexicaule. F., Alpes. ♀
 velue. Alpes. ♀
 à grandes fleurs. F., Alpes. ♀
 des Alpes. F. ♀
 tubulée. F., Alpes. ♀
 à feuell. de melinet. F., Alp. ♀
 des marais. F., Alpes. ♀

lampsanoïdes *Gouan.*
prenanthoïdes *L.*

jacquini *Vill.*
murorum *L.*
sylvaticum *L.*
prunellæfolium *All.* }
pumilum *L.* }
porrifolium *L.*
echioides *Wald.*

2. *Caule nudo multifloro.*

aurantiacum *L.*
piloselloïdes *Vill.* }
cymosum *Leers.* }
auricula *L.* }
dubium *L.* }

3. *Caule nudo unifloro.*

pilosella *L.*

CREPIS

sibirica *L.*
parviflora.
coronopifolia *Desf.*

albida *Vill.*
alpina *L.*
rubra *L.*
pauciflora.
nemausensis *Gouan.* }
andryala nemausensis *Vill.* }
foetida *L.*
pulchra *L.*
hispida *Wald.*
virgata *Desf.*
dioscoridis *L.*
patula.
tectorum *L.* }
virens *Vill.* }
biennis *L.*
cinerea. }
tectorum *Vill.* }
pungens.

DREPANIA (*Crepis* L.)

barbata.
— pallida.

à feuell. de *lampsane*. F., *Pyg.* ♀
à feuell. de *prenanthès*. F.,
Alpes. ♀

de *Jacq.* F., Alpes. ♀
des murs. F. ♀
des bois. F. ♀

à feuell. de *brunelle*. F., Alp. ♀

à feuell. de *poireau*. F., Alp. ♀
rude. *Allem.* ♀

2. Tige nue à plusieurs fleurs.

couleur de feu. F., Alpes ♀
à feuell. de *piloselle*. F., Alp. ♀
auriculée. F. ♀

3. Tige nue à une fleur.

piloselle. F. ♀ (méd.)

CRÉPIS

à larges feuell. *sibérie*. ♀
à petites fleurs. *orient.* ☉
à feuell. de *corne de cerf*.
barb. ☉
blanc. F., Alpes. ♀
des Alpes. F. ☉
rouge. F. ☉
à fleurs rares. *Égypte*. ☉
à tige nue. F. ☉
fétide. F. ☉
à fleurs de *lampsane*. F. ☉
hérissé. *hongrie*. ☉
effilé. *barbarie*. ♀
de *dioscoride*. F. ☉
étalé. ☉
des toits. F. ☉
bisannuel. F. ♂
cendré. F. ♂
piquant. ☉

DREPANIA

barbu. F. m. ☉
— à fleurs pâles.

HYOSERIS.

1. *Caule ramoso.*

hedypnoïs L.
rhagadioloïdes L.
cretica Cav.

2. *Caule nudo simplici.*

radiata L.
lucida L.
aspera L.
foetida L.
minima L.
taraxacoïdes Vill.

ZACINTHA

verrucaria.

TARAXACUM

dens-leonis.

LEONTODON

pyrenaïcum Conan.
aureum L.
bulbosum L.
autumnale L.
hastile L.
hispidum L.

PICRIS

hieracioïdes L.
sprengeriana. }
hieracium sprengerianum L. }
integrifolia.
rhagadioloïdes. }
crepis rhagadioloïdes L. }
globulifera.
asplenioides L.

HELMINTIA (*Picris* L.)

echioides.

SCORZONERA

hispanica L.
angustifolia L.
humilis L.
laciniata L.
resedifolia L.
eriosperma Conan.
aspera Desf.

PICRIDIMUM (*Scorzonera* L.)

vulgare
tingitanum.

HYOSÉRIS.

1. *Tige rameuse.*

dormeuse. F. ☉
rhagadiole. F. ☉
de Crète. ☉

2. *Tige nue simple.*

rayonnée. F. m. ☉
luisante. orient. ♂
rude. Italie. ☉
fétide. F. ☉
petite. F. ☉
commune. F. ♀

ZACINTHA

tuberculeux. orient. ☉

TARAXACUM

pissenlit. F. ♀ (méd.)

LÉONTODON

des Pyrénées. F. ♀
orangé. F., Alpes. ♀
bulbeux. F. ♀
d'automne. F. ♀
lancéolé. F. ♀
hérissé. F. ♀

PICRIS

épervière. F. ♂
de Sprenger. F. m. ☉
à feuell. entières. Eur. ☉
rhagadiole. ☉
globuleux. ☉
à feuell. d'asplénium. Barb. ☉

HELMINTIA

hérissé. F. ☉

SCORZONÈRE

d'Espagne. ♂ (alim., méd.)
à feuell. étroites. F. ♀
petite. F. ♀
lacinée. F. ♂
à feuell. de réséda. F. ☉
laineuse. F. m. ♀
rude. orient. ♀

PICRIDIMUM

commun. F. ☉
de Tanger. ☉

TRAGOPOGON

pratense L.
majus Jacq.
undulatum Jacq.
orientale L.
porrifolium L.
crocifolium L.

UROSPERMUM (Tragopogon L.)

dalechampii.
pieroïdes.

III. Receptaculum villosum aut paleaceum.**GEROPOGON**

glabrum L.

HYPOCHÆRIS

maculata L.
glabra L.
arachnoïdea Desf.
radicata L.

SERIOLO

levigata L.
ætnensis L.
cretensis L.

ANDRYALA

integrifolia L.
sinuata L.
lanata L.
ragusina L.
cheiranthifolia L'Her.

pinnatifida H. K.

CATANANCHE

cœrulea L.
lutea L.

CICHORIUM

intybus L.
endivia L.
— crispa.
spinosum L.

SCOLYMUS

maculatus L.
grandiflorus Desf.
hispanicus L.

CERCIFIX

des prés. F. ♂ (alim.)
élevé. Autriche. ♂
ondulé. orient. ♂
d'orient. ♂
à feuell. de poireau. F. ♂
à feuell. de safran. F. m. ♂

UROSPERMUM

de Dalechamp. F. ♂
hérissé. F. ☉

III. Réceptacle velu ou garni de paillettes.**GÉROPOGON**

glubre. Italie. ☉

HYPOCHÆRIS

tacheté. F. ♀
glabre. F. ☉
arachnoïde. Alger. ☉
à longues racines. F. ♀

SÉRIOLO

lisse. barbarie. ♀
de l'Etna. Italie. ☉
de Crète. ☉

ANDRYALA

à feuell. entières. F. ♂
sinué. F. ♂
laineux. F. ♀
de Raguse. F., or. ♀
à feuell. de giroflée. mère,
or. ♀
pinnatifide. canaries, or. ♀

CATANANCHE

bleue. F. ♂
jaune. F. m. ☉

CHICORÉE

sauvage. F. ♀ (méd., alim.)
endive. ☉ (alim.)
— crépue.
épineuse. F. m. ♂

SCOLYMUS

panaché. Italie. ☉
à grandes fleurs. barbarie. ♂
d'Espagne. ♂

ORDO II.

ORDRE II.

FLOSCULOSÆ.

LES FLOSCULEUSES.

I. *Receptaculum setosum aut paleaceum, semen papposum, flores flosculosi omnes hermaphroditi. (Polygamia æqualis L.)*

CNICUS

oleraceus L.
erisithales L.
acarna L.
spinosissimus L.
centauroïdes L.
cernuus L.

CARDUUS.

1. *Foliis decurrentibus.*

lanceolatus L.
leucographus L.
nutans L.
arvensis. }
serratula arvensis L. }
crispus L.
palustris L.
acanthioides L.
pycnocephalus Jacq.
argentatus L.
arabicus. Jacq.
dissectus L.
monspessulanus L.
canus L.
carlinioides Gouan. }
carlina pyrenaïca L. }

2. *Foliis sessilibus vel amplexicaulibus.*

semipectinatus Lmk.
helenioides L.
anglicus Lmk.
tuberosus L.
stellatus L.
syriacus L.
marianus L.
— viridis.
casabonæ L.
diacantha Bill. }
afer Jacq. }
fruticosus.
cryophorus L.
giganteus Desf.

I. Réceptacle garni de soies ou de paillettes, graines aigrettées, tous les fleurs hermaphrodites. (Polygamie égale).

CNICUS

des prés. F. ♂
érisitalès. F. ♀
acarna. Esp. ☉
hérissé. F., Alpes. ☉
à feuil. de centauree. F., Pyr. ♀
penché. Sibérie. ♀

CARDON.

1. Feuilles décurrentes.

lancéolé. F. ♂
panaché. F. m. ☉
penché. F. ♂
liémorrhoidal. F. ♀
crépu. F. ☉
des marais. F. ♀
à feuil. d'acanthé. F. ☉
à fleurs tombantes. F. ☉
argenté. Égypte. ☉
d'Arabie. ☉
déconpé. F. ♀
de Montpellier. F. ♀
blanchâtre. Autriche. ♀
à fleurs de carline. Pyrén. ♀

2. Feuilles sessiles ou amplexicaules.

demi-pectiné. Tartarie. ♀
à feuil. d'aunée. Sibérie. ♀
des prés. F. ♀
tubéreux. F. ♀
étoilé. Orient. ☉
de Syrie. ☉
marie. F. ♂ (méd.)
— vert.
casabon. Eur. austr., or. ♂
à 2 épines. Syrie. ♂
arbrisseau. Or. ♀
à tête laineuse. F. ♂
gigantesque. Barbarie.

ciliatus Murr.
serratuloides L.
acaulis L.

ONOPORDON

acanthium L.
 — *viride*.
illyricum L.
arabicum L.
acaule L.

CINARA

scolymus L.
cardunculus L.
humilis L.
acaulis L.

CARLINA

acaulis L.
acanthifolia All.
lanata L.
corymbosa L.
vulgaris L.

ATRACTYLIS

gummifera L.
cancellata L.
humilis L.

CARTILAMUS

tinctorius L.
albus.
lanatus L.
creticus L.
cœrulens L.
mitissimus L.
corymbosus L.
salicifolius L.

ARCTIUM

lappa L.
 — *tomentosa*.
grandiflora.

STENHELINA

dubia L.
chamaepeuce L.

SERRATULA

centauroïdes L.
spicata L.
squarrosa L.
tinctoria L.

ciliée. sibérie. ♀
sarette. f. ♀
sans tige. f. ♀

ONOPORDON

à feuil. d'acanthé. f. ♂
 — *vert*.
d'Illyrie. Eur. austr. ♂
d'Arabie. f. m. ♂
sans tige. f., pyrénées. ♂

ARTICHAUX

cultivé. f. m. ♀ (écon.)
cardon. barbarie. ♂ (écon.)
nain. Alger. ♀
sans tige. Alger. ♀

CARLINE

sans tige. f., Alpes. ♀
à feuil. d'acanthé. f., Alpes. ♀
laineuse. f. m. ☉
corymbifère. Italie, or. ♀
commune. f. ♂

ATRACTYLIS

gommeuse. barbarie. ♀ (écon.)
chardon prisonnier. f. m. ☉
nain. esp. ♂

CARTHAME

des teinturiers. ég. ☉ (arts.)
à tige blanche. orient. ☉
laineux. f. ☉
de Crète. ☉
bleu. esp. ♀
sans épines. f. ♀
corymbifère. Tunis, or. ♀
à feuil. de saule. canar., or. ♀

BARDANE

officinale. f. ♂ (méd.)
 — *cotonneuse*.
à grandes fleurs. f. ♂

STENHELINA

à feuil. de romarin. f., or. ♀
chamaepeuce. orient., or. ♀

SARETTE

lacinée. sibérie. ♀
à épis. Am. s. ♀
rude. Am. s. ♀
des teinturiers. f. ♀ (arts.)

coronata L.
heterophylla Desf.
pinnatifida.
carduus radiatus Wald. }

couronnée. sibérie. ψ
à feuell. variables. F., Alp. ψ
pinnatifide. Hongrie. ψ

II. *Receptaculum setosum aut paleaceum, semen papposum, flosculi steriles in ambitu.* (*Polygamia frustranea* L.)

II. Réceptacle garni de soies ou de paillettes, graine couronnée d'une aigrette, fleurons de la circonférence stériles, (*Polygamie frustranée.*)

ZOEGERA

leptaurea L.

ZOEGERA

d'orient. ☉ (orn.)

CENTAUREA.

CENTAURÉE.

1. *Squamæ calicinae laeves, nec ciliatæ nec spinosæ.*

1. Ecailles du calice lisses, dépourvues de cils et d'épines.

erupina L.
lippii L.
amberboï Lmk.
moschata L.
rhutenica Lmk.
centaurium L.
alpina L.
africana Lmk.

à feuell. de chondrille. F.m. ☉
de Lippi. égypte. ☉
odorante. orient. ☉ (orn.)
musquée. orient. ☉ (orn.)
glauque. Russie. ψ
grande. Italie. ψ
des Alpes. Italie. ψ
d'Afrique. barbare. ψ

2. *Squamæ calicinae serrato ciliatæ.*

2. Ecailles du calice dentées et ciliées.

phrygia L.
jacea L.
nigra L.
uniflora L.
pullata L.
montana L.
cyanus L.
paniculata L.
spinosa L.
ragusina L.
candidissima Lmk.
cinerea Lmk.
sempervirens L.
scabiosa L.
— italica.
atropurpurea.
diluta H. K.
orientalis L.
balsamita Lmk.

plumeuse. F., Alpes. ψ
jacée. F. ψ
noire. F. ψ
à une fleur. F.m. ψ
à colerette. F.m. ☉
de montagne. F., Alpes. ψ
bluet. F. ☉ (orn.)
paniculée. F. ☉
épineuse. orient, or. ♀
de Raguse. orient, or. ♀
très-blanche. Italie, or. ♀
cendrée. Italie, or. ψ
toujours verte. portug., or. ♀
scabieuse. F. ψ
— d'Italie.
noir-pourpre. orient. ♂
rose-pâle. Eur. mér. ☉
d'orient. or. ψ
à feuell. de balsamite. orient. ☉

3. *Squamæ calicis scariosæ.*

3. Ecailles du calice scarieuses.

glastifolia L.
alata Lmk.
alba L.
behen. L.

à feuell. de pastel. orient. ψ
aillée. tartarie. ψ
blanche. Espagne. ψ
behen. syrie, or. ψ (méd.)

conifera L.
rhapontica L.

4. *Spinæ calicinæ palmatæ.*

sonchifolia L.
ferox Desf.
seridis L.
aspera L.
napifolia L.
prolifera Vent.

5. *Spinæ calicis compositæ.*

benedicta L.
eriophora L.
calcitrapa L.
— major.
apula L.
melitensis L.
collina L.
solstitialis L.
verutum L.
multifida.

6. *Spinæ calicis simplices.*

salmantica L.
pumila L.
crocodylum L.
galactites L.

III. *Flosculi calice proprio cincti. (Polygamia segregata L.)*

ELEPHANTOPUS
scaber L.

GUNDELIA
tournefortii L.

SPHÆRANTHUS
indicus L.

ECHINOPS
sphaerocephalus L.
nitro L.
spinosus L.
horridus.
strigosus L.

IV. *Receptaculum nudum, semina absque pappo, flosculi omnes hermaphroditi.*

BALSAMITA Desf.
grandiflora Desf.
ageratifolia.
chrysanthemum flosculosum L. }

conifère. F. m., or. ♂
rhapontic. F., Alpes. ♀

4. Epines du calice palmées.
à feuell. de laitron. F. m. ⊙
hérissée. Alger. ♀
à feuell. de chicorée. Esp. ♀
rude. F. m. ♀
à feuell. de navet. orient. ⊙
prolifère. égypte. ⊙

5. Epines du calice rameuses.
chardon bénit. F. m. ⊙ (méd.)
laineuse. Alger. ⊙
chausse-trape. F. ♂ (méd.)
— grande. égypte. ♂
de la Pouille. ⊙
de Malte. F. m. ⊙
des collines. F. m. ♀
du solstice. F. ⊙
à longues épines. orient. ⊙
découpée. ♀

6. Epines du calice simples.
de Salamanque. F. m. ♂
petite. égypte. ♂
à feuell. de vulnéraire. syrie. ⊙
panachée. F. m. ♂

III. Fleurons entourés d'un calice partiel,
(Polygamie séparée.)

ELÉPHANTOPUS
rude. inde, s. ch. ♀

GUNDELIA
de Tournefort. syrie. ♀

BOULETTE
des Indes. s. ch. ♀

ECHINOPS
à grosses têtes. F. ♀
azuré. F. m. ♀
épineux. tunis. ♀
de Perse. ♀
à feuell. rudes. Esp. ⊙

IV. Réceptacle nud, graines sans aigrettes,
tous les fleurons hermaphrodites.

BALSAMITE
à grandes fleurs. Alg. ♀ (orn.)
à feuell. d'agératum. crête. ♀

suaveolens. }
 tanacetum balsamita L. }
 annua. }
 tanacetum annuum L. }

odorante. F. m. ♀

annuelle. esp. ☉

V. *Receptaculum nudum, villosum aut paleaceum, semina nuda, flosculi faminei in ambitu.* (*Polygamia superflua* L.)

V. Réceptacle nud, velu, ou garni de paillettes; fleurs femelles à la circonférence. (*Polygamie superflue.*)

HIPPIA

frutescens L.

HIPPIA

arbrisseau. cap, or. ♂

GYMNOSTYLES JUSS.
 anthemifolia.

GYMNOSTYLE

à feüill. d'anthémis. N. holl. ☉

TANACETUM

suffruticosum L.

vulgare L.

— crispum.

sibiricum L.

TANAIISIE

arbrisseau. cap, or. ♂

commune. F. ♀ (méd.)

— crépue.

de Sibérie. ♀

CARPESIMUM

cerneum L.

CARPESIMUM

penché. F. ♂

GRANGEA (Artemisia L.)

latifolia.

maderaspata.

decumbens.

minima.

GRANGEA

à feüill. larges. ☉

à feüill. sinuées. inde. ☉

tombant. N. holl. ☉

nain. chine. ☉

ARTEMISIA.

1. *Herbacea, calices oblongi.*

capillifolia Lmk.

vulgaris L.

palmata Lmk.

maritima L.

suaveolens Lmk.

1. Tiges herbacées, calices allongés.

capillaire. chine, or. ♀

commune. F. ♀ (méd.)

palmée. Espagne. ♀

maritime. F. ♀

odorante. F. ♀

2. *Herbacea, calice hemispharico.*

austriaca Jacq.

campestris L.

dracunculus L.

tanacetifolia L.

glacialis L.

rupestris L.

insipida Vill.

absinthium L.

absinthioides.

pontica L.

2. Tiges herbacées, calice hémisphérique.

d'Autriche. ♀

champêtre. F. ♀ (méd.)

estragon. Tartarie. ♀ (écon.)

à feüill. de tanaïs. F., Alp. ♀

des glaciers. F., Alp. ♀

des rochers. F., Alpes. ♀

insipide. F., Alpes. ♀

absinthe. F. ♀ (méd.)

fausse absinthe. ♀

de Pont. Italie. ♀ (méd.)

3. *Fruticosa.*

cœrulescens L.

corymbosa Lmk.

3. Tiges ligneuses.

bleuâtre. Italie. ♂

corymbifère. Italie. ♂

valentina. }
 hispanica Lmk. }
 abrotanum L.
 sinensis L.
 argentea L'Her.
 arborescens L.

MICROPUS

erectus L.
 supinus L.
 pygmaeus. }
 filago pygmaea L. }

VI. Receptaculum nudum rarius paleaceum,
 semina papposa, flosculi feminei in am-
 bitu.

FILAGO

montana L.
 germanica L.
 gallica L.
 pyramidata L.
 leontopodion L.

XERANTHEMUM

annuum L.
 inapertum L.
 fulgidum L.
 bracteatum Vent.

GNAPHALIUM.

1. Chrysocoma.

stoechas L.
 — minor.
 crassifolium Lmk.
 ovatum. }
 crassifolium L. }
 cymosum L.
 orientale L.
 arenarium L.
 luteo-album L.
 fetidum L.
 patulum L.

2. Argyrocoma.

teretifolium L.
 undulatum L.
 spathulatum Lmk.
 serpyllifolium Lmk.
 margaritaceum L.
 dioicum L.

de Valence. esp., or. ♀

citronelle. f. m. ♀ (méd.)
 moxa. chine, or. ♀ (méd.)
 argentée. canaries, or. ♀
 en arbre. f. m., or. ♀

MICROPUS

droit. f. m. ☉
 couché. f. ☉
 nain. f. m. ☉

VI. Réceptacle nud ou rarement garni de
 paillettes, graines aigrettées, fleurons
 femelles à la circonférence.

FILAGO

de montagne. f. ☉
 dicotome. f. ☉
 de France. f. ☉
 pyramidal. f. ☉
 pied de lion. f., Alpes. ♀

XÉRANTHÈME

anneau. f. ☉ (orn.)
 fermé. f. ☉
 éclatant. cap, or. ♂ (orn.)
 à grandes bractées. n. hoil.,
 or. ♂ (orn.)

IMMORTELE.

1. Fleurs jaunes.

stoechas. f. m., or. ♀ (méd.)
 — naine.
 à feuil. épaisses. or. ♀
 à feuil. ovales. cap, or. ♀
 corymbifère. cap, or. ♀
 d'orient. or. ♀ (orn.)
 des sables. Allemagne ☉
 jaune-blanche. f. ☉
 fétide. cap. ☉
 étalée. cap, or. ♀

2. Fleurs blanches.

à feuil. cylindriq. cap, or. ♀
 ondulée. am. m. ☉
 en spatule. ☉
 à feuil. de serpolet. cap, or. ♀
 des jardins. am. s. ♀ (orn.)
 pied de chat. f. ♀ (méd.)

supinum L.
alpinum L.
sylvaticum L.
uliginosum L.

CONYZA et BACCHARIS L.

neriifolia L.
ivaefolia L.
halimifolia L.
dioscoridis L.
odorata L.
candida L.
chinensis L.
gouani.
erigeron gouani L. }
ægyptiaca L.
squarrosa L.
rupestris L.
sordida L.
saxatilis L.

TUSSILAGO

alpina L.
farfara L.
alba L.
petasites L.
suaveolens.

VII. *Receptaculum nudum, semen papposum, flosculi omnes hermaphroditi.*

CACALIA.

1. Fruticosa.

laciniata L.
papillaris L.
anteuphorbium L.
kleinia L.
ficoïdes L.
cylindrica Lmk.
repens L.

2. Herbacea.

linaria Cav.

porophyllum L.
suaveolens L.
petasites Lmk.
tomentosa Lmk.
alliariæfolia Lmk.
atriplicifolia L.
sonchifolia L.

petite. F., Alpes.
des Alpes. F. ♀
des bois. F. ♂
des marais. F. ☉

CONISE

à feuell. de nérium. cap, or. ♀
à feuell. d'iva. Am. m., or. ♀
à feuell. d'halime. Am. s. ♀
de dioscoride. syrie, or. ♀
odorante. Am. m., s. ch. ♀
blanche. candie, or. ♀
de Chine. ☉
de Gouan. canaries, or. ♂
d'Egypte. ♀
rude. F. ♂
des rochers. barbarie, or. ♀
à trois fleurs. F. m., or. ♀
à une fleur. F. m., or. ♀

TUSSILAGE

des Alpes. F., Alpes. ♀
pas-d'âne. F. ♀ (méd.)
blanc. F. ♀
petasite. F. ♀
odorant. ♀ (orn.)

VII. Réceptacle nud, graines aigrettées, tous les fleurons hermaphrodites.

CACALIA.

1. Tiges ligneuses.

lacinié. cap, s. ch. ♀
mamelonne. cap, s. ch. ♀
à feuell. ovales. cap, s. ch. ♀
Kleinia. canaries, s. ch. ♀
ficoïde. cap, s. ch. ♀
cylindrique. cap, s. ch. ♀
rampant. cap, s. ch. ♀

2. Tiges herbacées.

à feuell. de linair. N. Esp.,
s. ch. ♀
à feuell. poreuses. Am. m. ☉
odorant. Am. s. ♀
à feuell. de tussilage. F., Alp. ♀
cotonneux. F., Alpes. ♀
à feuell. d'alliaire. F., Alp. ♀
à feuell. d'arroche. Am. s. ♀
à feuell. de laitron. inde. ☉

CHRYSOCOMA

dichotoma L. f.
coma aurea L.
cernua L.
linosyris L.
dracunculoïdes Lmk.
graminifolia L.
anthelmintica.
noveboracensis.
præalta.

EUPATORIUM.

1. *Calix imbricatus, 3 ad 9 florus.*

houstonis L.
dalea L.
scandens L.
altissimum L.
cannabium L.
syriacum Jacq.
sessilifolium L.
purpureum.
maculatum L.

2. *Calix imbricatus decemflorus et ultra.*

atriplicifolium Lmk.

perfoliatum L.
aromaticum L.
coelestinum L.
ageratoïdes L. f.
sessilifolium Lmk.
fruticosum.

STEVIA

serrata Cav. }
ageratum punctatum Ortéga. }
pedata Cav. }
ageratum pedatum Ortéga. }

KUHNIA

fruticosa Vent. }
eupatorium canescens Ortéga. }

AGERATUM

conyzoides L.
cœruleum.

CHRYSOCOME

dicothome. canaries, or. ♀
dorée. cap, or. ♀
penchée. cap, or. ♀
linosyris. F. ♀
à feuell. d'estragon. sibér. ♀
à feuell. de gramen. Am. s. ♀
antelmintique. inde, s. ch. ♂
de Novéboraco. Am. s. ♀
gigantesque. Am. s. ♀

EUPATOIRE.

1. *Calice imbriqué renfermant 3 à 9 fleurs.*

de Houston. Am. m., s. ch. ♀
de la Jamaïque. Am. m., s. ch. ♀
grimpante. Am. s., or. ♀
élevée. Am. s.; or. ♀
à feuell. de chanvre. F. ♀ (méd.)
pubescente. ♀
à feuell. sessiles. Am. s. ♀
pourpre. Am. s. ♀
maculée. Am. s. ♀

2. *Calice imbriqué renfermant 10 ou un plus grand nombre de fleurons.*

à feuell. d'arroche. Am. m.,
s. ch. ♀
perfoliée. Am. s., or. ♀
aromatique. Am. s., or. ♀
bleue. Am. s., or. ♀
agératum. Am. s. ♀
à feuell. sessiles. Am. s. ♀
ligneuse. ♀

STEVIA

à feuell. en scie. Mexique, or. ♀
à feuell. en pédale. Cuba. ☉

KUNIA

arbrisseau. île de Cuba, or. ♀

AGÉRATUM

fausse conise. Am. m. ☉
bleu. Am. m. ☉

VIII. *Receptaculum villosum aut paleaceum, semen nudum aut subnudum.*

CALEA

aspera Jacq.

TARCHONANTHUS

camphoratus L.

ATHANASIA

annua L.

trifurecata L.

crithmifolia L.

parviflora L.

tricuspis.

DIOTIS (*Athanasia L.*)

maritima.

SANTOLINA

chamæeparissus L.

rosmarinifolia L.

tomentosa.

eriosperma. }

an erecta L. }

ANACYCLUS

aureus L.

creticus L.

valentinus L.

ORDO III.

RADIATÆ.

I. *Receptaculum nudum, pappus nullus.*

COTULA

aurea L.

anthemoides L.

coronopifolia L.

turbinata L.

BELLIS

annua L.

perennis L.

MATRICARIA

parthenium L.

chamomilla L.

suavcolens L.

VIII. Réceptacle velu ou garni de paillettes, graines sans aigrettes.

CALÉA

à feuell. rudes. am. m. ☉

TARCONANTE

camphré. cap, or. ☿

ATHANASIA

annuel. f. m. ☉

trifurqué. cap, or. ☿

à feuell. de bacelle. cap, or. ☿

à petites fleurs. cap, or. ☿

à trois pointes. cap, or. ☿

DIOTIS

maritime. f. m., or. ♀

SANTOLINE

commune. f. m. ☿ (orn.)

à feuell. de romarin. esp., or. ☿

cotonneuse. esp., or. ☿

laineuse. italie. ♀

ANACYCLUS

jaune. f. m. ☉

de Crète. orient. ☉

de Valence. f. m. ☉

ORDRE III.

LES RADIÉES.

I. Réceptacle nud, graines sans aigrette.

COTULA

jaune. esp. ☉

à feuell. d'anthémis. esp. ☉

corne de cerf. cap. ☉

conique. cap. ☉

PAQUERETTE

annuelle. f. ☉

vivace. f. ♀

MATRICAIRE

officinale. f. ♀ (méd.)

chamomille. f. ☉

odorante. f. ☉ (méd.)

CHRYSANthemUM.

1. *Leucanthema*.

præaltum *vent.*
 corymbiferum *L.*
 frutescens *L.*
 pinnatifidum *L. S.*
 serotinum *L.*
 leucanthemum *L.*
 grandiflorum.
 montanum *L.*
 balsamita *L.*
 — multifida.
 monspeliense *L.*
 alpinum *L.*
 carinatum *Schousb.*

2. *Chrysanthema*.

myconis *L.*
 segetum *L.*
 coronarium *L.*
 — pallidum.

CALENDULA

arvensis *L.*
 ægyptica.
 officinalis *L.*
 stellata. *cav.*
 tomentosa *Desf.*
 hybrida *L.*
 pluvialis *L.*
 fruticosa *L.*

MADIA

viscosa *cav.*

OSTEOSPÉRMUM

moniliferum *L.*
 spinosum *L.*
 pinnatifidum *l'her.*

MILLERIA

quinqueflora *L.*
 contrayerva *Link.*

ERIOCEPHALUS

africanus *L.*

II. *Receptaculum nudum, semina papposa.*

BELLUM

minutum *L.*
 bellidioides *L.*

CHRISANTHÈME.

1. Fleurs blanches.

élevé. perse, or. Ψ
 corymbifère. *F. m.* Ψ
 arbrisseau. canaries, or. \mathfrak{h}
 pinnatifide. canaries, or. \mathfrak{h}
 tardif. *Am. s.* Ψ
 grande marguerite. *F.* Ψ
 à grandes fleurs. *F., pyrén.* Ψ
 de montagne. *F., Alpes.* Ψ
 balsamita. orient. Ψ
 — découpé.
 de Montpellier. *F. m.* Ψ
 des Alpes. *F.* Ψ
 en carène. maroc. \odot

2. *Fleurs jaunes.

à feuil. entières. *F. m.* \odot
 des moissons. *F.* \odot
 des jardins. orient. \odot (orn.)
 — à fleurs pâles.

SOUCI

des champs. *F.* \odot
 d'Egypte. \odot
 cultivé. *F.* \odot (écon.)
 étoilé. Espagne. \odot
 cotonneux. barbarie.
 hybride. cap. \odot
 des pluies. cap. \odot
 arbrisseau. cap, s. ch. \mathfrak{h}

MADIA

visqueux. chili. \odot

OSTÉOSPERME

à colliers. cap, or. \mathfrak{h}
 épineuse. cap, or. \mathfrak{h}
 pinnatifide. cap, or. \mathfrak{h}

MILLERIA

à 5 fleurs. *Am. m.* \odot
 contrayerva. chili. \odot

ERIOCÉPHALE

d'Afrique. cap, or. \mathfrak{h}

II. Réceptacle nud, graines aigrettées.

BELLUM

nain. orient. \odot
 fausse paquerette. Italie. \odot

HELENIUM

autumnale L.

quadridentatum Bill.

PECTIS

prostrata Cav.

multifida Ortega.

TAGETES

erecta L.

patula L.

lucida Cav.

tenuifolia Cav.

minuta.

papposa Mich.

DORONICUM et ARNICA L.

pardalianches L.

plantagineum L.

arnica L.

scorpioides L.

bellidiastrum L.

GORTERIA

rigens L.

pinnata L.

INULA

helenium L.

bifrons L.

oculus christi Lmk.

britannica L.

dysenterica L.

crispa.

gnaphalodes Vent. }

aster crispus Forsk. }

squarrosa L. }

spiræifolia Lmk. }

salicina L.

ensifolia L.

chrithmoides L.

hirta L.

montana L.

cinerea Lmk. }

vaillantii All. }

viscosa.

erigeron viscosum L. }

gravecolens.

erigeron gravecolens L. }

tuberosa.

erigeron tuberosum L. }

HELENIUM

d'automne. Am. s. ψ

à quatre dents. Am. s. ψ

PECTIS

couché. N. Esp., s. ch. ψ

découpé. Pérou. ☉

TAGÈTE

droite. Mexique. ☉

touffue. Mexique. ☉

luisante. N. Esp., or. ψ

à feuil. étroites. Pérou. ☉

à petites fleurs. Chili. ☉

aigrettée. Am. s. ☉

DORONIC

à feuil. en cœur. F., Alpes. ψ

à feuil. de plantain. F. ψ

arnica. F., Alpes. ψ (méd.)

scorpion. F. ψ

à fleurs de paquerette. F., Alp. ψ

GORTERIA

à grandes fleurs. Cap, or. ψ

penné. Cap, or. ψ

AUNÉE

officinale. F. ψ (méd.)

décurrente. F. ψ

œil de Christ. F. ψ

britannique. F. ψ

dysenterique. F. ψ

crépue. Égypte. ☉

rude. F. ψ

à feuil. de saule. F. ψ

ensiforme. F. ψ

criste marine. F. h (écon.)

velue. F. ψ

de montagne. F. ψ

cendrée. F. ψ

visquense. F. m., or. h

fétide. F. ☉

tubéreuse. F. m., or. ψ

glutinosa.
 aster glutinosus *car.* }

ERIGERON

canadense *L.*
 siculum *L.*
 longifolium.
 annuum. }
 aster annuus *L.* }
 philadelphicum *L.*
 alpinum *L.*
 uniflorum *L.*
 acre *L.*
 foetidum *L.*
 contortum.
 viscosum. }
 psidia glutinosa *Jacq.* }

BOLTONIA (*Matricaria L.*)

asteroides *L'Her.*
 glastifolia *L'Her.*

ASTER

dentatus *Andr.*
 fruticosus *L.*
 argenteus *Mich.* }
 sericeus *Vent.* }
 tenellus *L.*
 tripolium *L.*
 alpinus *L.*
 pyrenæus *Link.*
 amellus *L.*
 amygdalinus *Link.*
 leucanthemus.
 acris *L.*
 trinervis.
 dracunculoides *Link.*
 diversifolius *Mich.*
 amplexicaulis *Link.*
 novæ anglæ *L.*
 cordifolius *L.*
 patulus *Link.*
 rubricaulis *Link.*
 lævigatus *Link.*
 longifolius *Link.*
 amœnus *Link.*
 novi belgii *L.* }
 paniculatus *Link.* }

glutineuse. mexique, or. \mathfrak{h}

ERIGERON

de Canada. *F.* \odot
 de Sicile. *F. m.* \odot
 à feuell. longues. *Am. s.*
 à fleurs blanches. *Am. s.* \odot
 de Philadelphie. *Am. s.* Ψ
 des Alpes. *F.* Ψ
 à une fleur. *F.*, Alpes. Ψ
 âcre. *F.* \odot
 fétide. cap, or. \mathfrak{f}
 à feuell. contournées. \odot
 visqueuse. Antilles, s. ch. \mathfrak{h}

BOLTONIA

à fleurs d'aster. *Am. s.* Ψ
 à feuell. de pastel. *Am. s.* Ψ

ASTER

denté. *N. Holl.*, or. \mathfrak{h}
 arbrisseau. cap, or. \mathfrak{h}
 satiné. *Am. s.* \mathfrak{h}
 fragile. cap. \odot
 maritime. *F.* \mathfrak{f}
 des Alpes. *F.* Ψ
 des Pyrénées. *F.* Ψ
 amelle. *F. m.* Ψ (orn.)
 à feuell. d'amandier. *Am. s.* Ψ
 à fleurs blanches. *Am. s.* Ψ
 âcre. *F. m.* Ψ
 à trois nervures. Ψ
 à feuell. d'estrageon. Ψ
 à feuell. variables. *Am. s.* Ψ
 amplexicaule. *Am. s.* Ψ (orn.)
 de la Nouvelle - Angleterre.
Am. s. Ψ (orn.)
 à feuell. en cœur. *Am. s.* Ψ
 (orn.)
 étalé. *Am. s.* Ψ (orn.)
 à tiges pourpres. *Am. s.* Ψ
 (orn.)
 glabre. *Am. s.* Ψ
 à feuell. longues. *Am. s.* Ψ
 luisant. *Am. s.* Ψ (orn.)
 paniculé. *Am. s.* Ψ (orn.)

strictus.
 salicifolius *Lmk.*
 tradescanti *L.*
 coridifolius *Mich.*
 ericoïdes *L.*
 grandiflorus *L.*
 chinensis *L.*

miser *L.*

SOLIDAGO.

1. *Racemis secundis patulis.*

sempervirens *L.*
 elliptica *H. K.*
 canadensis *L.*
 glabra.
 nutans. .
 procera *H. K.*
 aspera *H. K.*

2. *Racemis erectis.*

integrifolia.
 multiflora.
 mexicana *L.*
 latifolia *L.*
 bicolor *L.*
 flexicaulis *L.*
 virga-aurea *L.*
 minuta *L.*
 rigida *L.*
 gracilis.

CINERARIA

geifolia *L.*
 lobata *L'Her.*
 alpina *L.*
 amelloïdes *L.*
 maritima *L.*
 populifolia *L'Her.*
 aurita *L'Her.*
 lanata *L'Her.*
 cruenta *L'Her.*

SENECIO.

1. *Floribus flosculosis.*

ceruus *L. f.* }
 rubens *Jacq.* }
 hieracifolius *L.*
 vulgaris *L.*

ramassé. *Am. s. ♀*

à feuell. de saule. *Am. s. ♀*

de *Tradescanti*. *Am. s. ♀*

à feuell. de coris. *Am. s. ♀*

à feuell. de bruyère. *Am. s. ♀*

à grandes fleurs. *Am. s. ♀*

reine-marguerite. chine. ☉

(orn.)

grêle. *Am. s. ♀*

VERGE-D'OR.

1. *Grappes unilatérales et étalées.*

toujours verte. *Am. s. ♀*

elliptique. *Am. s. ♀*

de *Canada*. *Am. s. ♀* (orn.)

glabre. *Am. s. ♀* (orn.)

penchée. *Am. s. ♀* (orn.)

élevée. *Am. s. ♀* (orn.)

rude. *Am. s. ♀* (orn.)

2. *Grappes redressées.*

à feuell. entières. *Am. s. ♀*

à fleurs nombreuses. ♀

du *Mexique*. *Am. s. ♀*

à larges feuell. *Am. s. ♀*

de deux couleurs. *Am. s. ♀*

tortueuse. *Am. s. ♀*

des bois. *F. ♀*

petite. *F. ♀*

à feuell. dures. *Am. s. ♀*

grêle. ♀

CINÉRAIRE

à feuell. de géum. cap, or. ☿

lobée. cap, or. ☿

des *Alpes*. *F. ♀*

à fleurs d'amelle. cap, or. ☿

maritime. *F. ☿*

à feuell. de peupl. canar., or. ♀

auriculée. canaries, or. ☿

lainense. canaries, or. ☿

pourpre. canaries, or. ☿

SÉNEÇON.

1. *Fleurs flosculeuses.*

à fleurs penchées. inde. ☉

à feuell. d'épervière. *Am. s. ☉*

commun. *F. ☉*

reclinatus *Her.*
discolor.

recliné. cap, or. \mathfrak{h}
de deux couleurs. \mathfrak{h}

2. *Floribus radiatis, ligulis revolutis.*

ægyptius L.
triflorus L.
sylvaticus L.
viscosus L.
coronopifolius Desf.

2. Fleurs radiées, demi-fleurons roulés:

d'Égypte. ☉
à fleurs ternées. Égypte. ☉
des bois. F. ☉
visqueux. F. ☉
corne-de-cerf. barbarie. ☉

3. *Floribus radiatis, radio patente, foliis pinnatifidis.*

dentatus Jacq.
elegans L.
jacobæa L.
crucifolius L.
abrotanifolius L.
incanus L.
nebrodensis L.

3. Fleurs radiées, demi-fleurons horizontaux, feuilles découpées.

denté. cap. ☉
violet. cap. ☉ (orn.)
jacobée. F. Ψ
à feuell. de roquette. F. ♂
à feuell. de citronnelle. F. ♂
blanc. Alpes. Ψ
à feuell. de paquerette. esp. ☉

4. *Floribus radiatis, radio patente, foliis indivisis.*

paludosus L.
sarracenicus L.
nemorensis L.
doria L.
coriaceus H. K.
doronicum L.
longifolius L.
halimifolius L.
rigidus L.

4. Fleurs radiées, rayons horizontaux, feuilles entières.

des marais. F. Ψ
traçant. F. Ψ
des forêts. F. Ψ
doria. F. m. Ψ
à feuell. de limonium. orient. Ψ
doronic. F., Alpes. Ψ
à feuell. longues. cap, or. \mathfrak{h}
à feuell. d'halime. cap, or. \mathfrak{h}
rude. cap, or. \mathfrak{h}

OTHONNA

cheirifolia L.
coronopifolia L.
pectinata L.

OTHONNA

spatule. tunis. \mathfrak{h}
corne-de-cerf. cap, or. \mathfrak{h}
pectiné. cap, or. \mathfrak{h}

III. *Semina non papposa, receptaculum paleaceum.*

III. Graines sans aigrette, réceptacle garni de paillettes.

ANTHEMIS.

1. *Floribus radio albis.*

cota L.
altissima L.
maritima L.
mixta L.
arvensis L.
cotula L.
nobilis L.
pyrethrum L.

ANTHÉMIS.

1. Demi-fleurons blancs.

piquante. ital. ☉
élevée. F. m. ☉
maritime. F. Ψ
corne-de-cerf. F. ☉
des champs. F. ☉
fétide. F. ☉
camomille. F. Ψ (méd.)
pyréthre. F. m., or. Ψ (méd.)

2. *Floribus radio luteis aut violaceis.*

tinctoria L.
valentina L.
 — *bicolor*.
arabica L.
grandiflora.

ovatifolia Ortega. —
globosa Ortega.
triloba Ortega.

ACHILLEA.

1. *Corollis radio luteis.*

santolina L.
falcata Lmk.
tenuifolia Lmk.
ageratum L.
ægyptiaca L.
bipinnata L.
pubescens L.
pauciflora Lmk.
decumbens Lmk.
abrotanifolia L.
filipendulina Lmk.

tomentosa L.

2. *Corollis radio albis aut purpureis.*

macrophylla L.
clavennæ L.
herbarota All. }
cuneifolia Lmk. }
serrata Retz.
ptarmica L.
alpina L.
sibirica L.
impatiens L.
florescens.
magna All. }
compacta Lmk. }
nana L. }
lanata Lmk. }
nobilis L.
ligustica All.
millefolium L.
 — *purpureum*.
rosea.
asplenifolia Vent. }

2. *Demi-fleurons blancs ou violets.*

des teinturiers. F., Alpes. ♀
de Valence. F. m. ☉
 — *de deux couleurs*.
d'Arabie. Alger. ☉ (orn.)
à grandes fleurs. chine. ♀
 (orn.)
à feuilles ovales. Pérou, s. ch. ♀
globuleuse. Mexique, or. ♀
à 3 lobes. N. esp., or. ♀

MILLEFEUILLE.

1. *Demi-fleurons jaunes.*

santoline. orient. ♀
falciforme. orient, or. ♀
à feuilles menues. orient, or. ♀
eupatoire. F. m. ♀ (méd.)
d'Égypte. orient. ♀
bipennée. orient. ♀
pubescente. orient. ♀
à fleurs rares. orient. ♀
tombante. Kanitzel. ♀
à feuil. de citronnelle. orient. ♀
à feuil. de filipendule. orient,
 ♀
cotonneuse. F., Alpes. ♀

2. *Demi-fleurons blancs ou roses.*

à larges feuil. F., Alpes. ♀
corne de cerf. F., Alpes. ♀
cunéiforme. F., Alpes. ♀
à feuil. en scie. Alpes. ♀
sternutatoire. F. ♀
des Alpes. F. ♀
de Sibérie. ♀
pectinée. sibérie. ♀
florescense. ♀
compacte. F., Alpes. ♀
petite. F., Alpes. ♀
odorante. F., Alpes. ♀
fasciculée. Alpes. ♀
commune. F. ♀
 — *pourpre*. (orn.)
rose. Am. s. ♀ (orn.)

PARTHENIUM

hysterophorus L.
integrifolium L.

BUPHTALMUM

frutescens L.
arborescens L.
peruvianum Lmk.
aquaticum L.
maritimum L.
spinosum L.
grandiflorum L.
procumbens.

SIGESBECKIA

orientalis L.
flosculosa l'Her.

ECLYPTA

erecta L.
prostrata L.

BALTIMORA

erecta L.

DAHLIA

pinnata Cav.
rosea Cav.
purpurea Cav.

POLYMNIA

uvcdalia L.
canadensis L.

ENCELIA

halimifolia Cav.
cancscens Cav.

XIMENESIA

encelioides Cav.

SCLEROCARPUS Jacq.

africanus Jacq.

SILPHIUM

laciniatum L.
terebinthinaceum Jacq.
perfoliatum L.
connatum L.

PARTHENIUM

lacinié. Am. m. ☉
à feuell. entières. Am. s., or. ♀

BUPHTALMUM

arbrisseau. Am. s., or. ♀
en arbre. Am. m., s. ch. ♀
du Pérou. s. ch. ♀
aquatique. F. ☉
maritime. F. ♀
épineux. F. m. ☉
à grandes fleurs. F. ♀
couché. ♀

SIGESBECKIA

d'orient. inde. ☉
flosculeux. pérou. ☉

ECLYPTA

droit. inde. ☉
couché. inde. ☉

BALTIMORA

droit. Am. s. ☉

DAHLIA

à feuell. pennées. Mexique ,
s. ch. ♀ (orn.)
rose. Mexique, s. ch. ♀ (orn.)
pourpre. Mexique, s. ch. ♀ (orn.)

POLYMNIA

à larges feuell. Am. s. ♀
de Canada. ♀

ENCELIA

à feuell. d'halime. N. esp.,
s. ch. ♀
à feuell. blanches. Mexique,
s. ch. ♀

XIMENESIA

à feuell. d'encelia. Mexique. ☉

SCLÉROCARPE

d'Afrique. ☉

SILPHIUM

lacinié. Am. s. ♀ (orn.)
à feuell. en cœur. Am. s. ♀
(orn.)
perfolié. Am. s. ♀ (orn.)
à feuell. réunies. Am. s. ♀ (orn.)

trifoliatum L.
 scabrum *Walth.*
 trilobatum L.

à feuell. ternées. AM. S. ☿ (orn.)
 à feuell. rudes. AM. S. ☿
 trilobé. AM. M., S. CH. ☿

COREOPSIS

auriculata L.
 tripteris L.
 verticillata L.
 delphinifolia *Link.*

alternifolia L.
 alata *Cav.*

CORÉOPSIS

auriculé. AM. S. ☿
 à trois ailes. AM. S. ☿ (orn.)
 verticillé. AM. S. ☿
 à feuell. de delphinium. AM. S.
 ☿ (orn.)
 à feuell. alternes. AM. S. ☿
 ailé. Mexique, or. ☿

COSMOS *Cav.*

bipinnata *Cav.*

COSMOS

bipenné. Mexique. ☉

RUDBECKIA

laciniata L.
 — angustifolia.
 pinnata *Vent.*
 aspera.
 triloba L.
 hirta L.
 purpurea L.
 amplexicaulis *Bosc.* }
 perfoliata *Cav.* }

RUDBECKIA

lacinié. AM. S. ☿ (orn.)
 — à feuell. étroites.
 à feuell. pennées. AM. S. ☿
 à feuell. rudes. AM. S. ☿
 trilobé. AM. S. ♂
 velu. AM. S. ♂
 pourpre. AM. S., or. ☿ (orn.)
 amplexicaule. Mexique. ☉

SANVITALIA *Cav.*

villosa *Cav.*
 lorantea atropurpurea *Ortega.* }

SANVITALIA

velu. N. ESP. ☉

IV. *Semina papposa, receptaculum paleaceum.*

IV. Graines aigrettées, réceptacle garni de paillettes.

HELIANTHUS

annuus L.
 multiflorus L.
 tuberosus L.
 mollis *Lmk.* }
 pubescens *Vahl.* }
 canescens *Mich.* }
 tubæformis *Jacq.*
 atrorubens *Lmk.*
 altissimus L.
 giganteus L.
 angustifolius L.
 strumosus L.
 divaricatus L.
 levis L. }
 buphtalmum helianthoides L. }
 prostratus.
 dentatus *Cav.*

SOLEIL

cultivé. Pérou. ☉ (orn.)
 à fleurs nombr. AM. S. ☿ (orn.)
 topinambour. Brésil. ☿ (alim.)

• cotonneux. AM. S. ☿

renflé. Mexique. ☉
 noir-pourpre. AM. S. ☿ (orn.)
 élevé. AM. S. ☿
 gigantesque. AM. S. ☿
 à feuell. étroites. AM. S. ☿
 fusiforme. AM. S. ☿
 étalé. AM. S. ☿

lisse. AM. S. ☿

couché. Pérou, or. ☿
 à feuell. dentées. Mex., or. ☿

GAILLARDA *fougeroux.*

pulchella. }
virgilia helioides l'her. }

GALINSOGA *cav.*

parviflora cav.
triloba cav.

PASCHALIA *ortéga.*

glauca ortéga.

AMELLUS

lychnitis L.
pedunculatus ortéga.

ZINNIA

pauciflora L.
multiflora L.

violacea cav. }
elegans Jacq. }
revoluta cav. }
tenuiflora Jacq. }

VERBESINA

gigantea Jacq.
atriplicifolia.
fruticosa L.
serrata cav.
alata L.
nodiflora L.

HETEROSPERMA *cav.*

pinnata cav.

BIDENS

tripartita L.
cernua L.
frondosa L.
pilosa L.
bullata L.
nivea L.
bipinnata L.
heterophylla ortéga.
diebotoma.

SPIILANTHUS

oleracea L.

fusca.

alemella L.

GAILLARDA

élégant. véra-cruz. ☉ (orn.)

GALINSOGA

à petites fleurs. pérou. ☉
trilobé. n. esp. ☉

PASCHALIA

à feuell. glauques. chili, s. ch. ♀

AMELLUS

bleu. cap, or. ♀
pedouculé. ☉

ZINNIA

à fleurs rares. pérou. ☉ (orn.)
à fleurs nombreuses. Louisiane. ☉ (orn.)

violet. mexique. ☉ (orn.)

roulé. mexique. ☉ (orn.)

VERBESINE

gigantesque. am. m., s. ch. ♀
à feuell. d'arroche. s. ch. ♀
arbrisseau. am. m., s. ch. ♀
à feuell. en scie. n. esp., s. ch. ♀
ailée. am. m., s. ch. ♀
nodiflore. am. m. ☉

HÉTÉROSPERME

à feuell. pennées. n. esp. ☉

BIDENS

à trois feuell. f. ☉
penché. f. ☉
feuillu. am. s. ☉
velu. am. m. ☉
bulleux. Italie. ☉
à fleurs blanches. am. s. ♀
bipenné. am. s. ☉
à feuell. de saule. n. esp., or. ♀
dichotome. ♀

SPIILANTHUS

cresson de Para. am. m. ☉
(méd.)

brun. am. m. ☉ (méd.)

alemella. inde. ☉

AGRIPHYLLUM (*Gorteria* L.)

asteroïdes.

echinatum.

gorteria echinata H. K. }

AGRIPHYLLUM

à feuell. d'yeuse. cap, or. ♣

hérissé. cap. ☉

ARCTOTIS

tristis L.

plantaginea L.

aspera L.

repens. Jacq.

ARCTOTIS

triste. cap. ☉

à feuell. de plantain. cap, or. ♣

rude. cap, or. ♣

rampant. cap, or. ♣

CLASSIS XI.**CLASSE XI.****DICOTYLEDONES****DICOTYLÉDONS****MONOPETALÆ.****MONOPÉTALES.**(*Corolla epigyna, antheræ
distinctæ.*)(Corolle sur le pistil, anthères
distinctes.)**ORDO I.****ORDRE I.****DIPSACEÆ.****LES DIPSACÉES.**

I. Flores aggregati.

I. Fleurs rapprochées.

MORINA

persica L.

MORINE

de Perse. ♣ (orn.)

DIPSACUS

sylvestris Jacq.

fullonum Wild.

laciniatus L.

pilosus L.

DIPSACUS

sauvage. F. ♂

chardon bonnetier. F. ♂ (arts.)

lacinié. F. ♂

velu. F. ☉

SCABIOSA.

I. Corollis quadrifidis.

SCABIEUSE.

I. Corolles à quatre divisions.

alpina L.

rigida L.

syriaca L. }

dichotoma Link. }

transylvanica L.

centauroïdes Link.

leucantha L.

succisa L.

arvensis L.

sylvatica L.

integrifolia L.

des Alpes. F. ♣

à feuell. dures. cap, or. ♣

de Syrie ☉

de Transylvanie. ☉

fausse centauree. F. m. ♣

à fleurs blanches. F. m. ♣

tronquée. F. ♣ (méd.)

des champs. F. ♣ (méd.)

des bois. F. ♣ (méd.)

à feuell. entières. F. ☉

2. *Corollis quinquefidis.*

columbaria L.

— lutea.

suaveolens.

lucida Vill.

setifera Lmk.

ochroleuca Jacq.

urceolata Desf. }

rutæfolia Vahl. }

divaricata Lmk. }

argentea L.

sieula L. }

divaricata Jacq. }

stellata L.

parviflora Desf. }

dichotoma Cyrillo. }

prolifera L.

atropurpurea L.

africana L.

cretica L.

graminifolia L.

palæstina L.

KNAUTIA

orientalis L.

plumosa L.

ALLIONIA

incarnata L.

II. Flores distincti.

VALERIANA.

1. *Semen unicum papposum.*

rubra L.

angustifolia All.

calcitrapa L.

dioica L.

officinalis L.

phu L.

tripteris L.

montana L.

tuberosa L.

celtica L.

saxatilis L.

pyrenæica L.

2. *Fructus trilocularis coronatus.*

cornucopiæ L.

olitoria Willd.

2. Corolle à cinq divisions.

colombaire. F. ♀

— jaune.

odorante. F. ♀

luisante. F., Alpes. ♀

sétifère. ☉

jaunâtre. All. ♂

urcéolée. Tunis. ♀

argentée. orient., or. ♀

de Sicile. ☉

étoilée. F. m. ☉

à petites fleurs. orient. ☉

prolifère. orient. ☉

des jardins. inde. ☉ (orn.)

d'Afrique. or. ♂

de Crète. or. ♂

à feuell. de gramen. F., Alp. ♀

de Palestine. or. ♀

KNAUTIA

d'orient. ☉

plumeux. orient. ☉

ALLIONIA

incarnat. Pérou. ☉

II. Fleurs distinctes.

VALÉRIANE.

1. Une seule graine aigrettée.

rouge. F. ♀ (orn.)

à feuell. étroites. F. ♀

chaussetrape. orient. ☉

dioïque. F. ♀

officinale. F. ♀

plu. F. ♀

à feuell. ternées. F., Alpes. ♀

de montagne. F., Alpes. ♀

tubéreuse. F., Alpes. ♀

nard-celtique. F., Alp. ♀ (méd.)

des rochers. F., Alpes. ♀

des Pyrénées. F. ♀

2. Fruit couronné et à trois loges.

corne d'abondance. barb. ☉

mâche. F. ☉ (alim.)

vesicaria wild.
coronata wild.
echinata wild.
sibirica L.

vésiculeuse. orient. ☉
couronnée. F. ☉
hérissée. F. ☉
de Sibérie. ♂

ORDO II.

ORDRE II.

RUBIACEÆ.

LÈS RUBIACÉES.

I. *Fructus dicoccus dispermus, stamina
 sapius 4.*

I. 2 graines accolées, ordinairement
 4 étamines.

SHERARDIA

arvensis L.

SHÉRARDIA

des champs. F. ☉

ASPERULA

arvensis L.
odorata L.
taurina L.
cynanchica L.
brevifolia Vent.
tinctoria L.
calabrica L.

ASPÉRULE

des champs. F. ☉
odorante. F. ♀
de Turin. F., Alpes. ♀
à l'esquinancie. F. ♀
à feuell. courtes. orient, or. ♂
des teinturiers. F. ♀
de Calabre. or. ♂

GALIUM.

I. *Fructu glabro.*

palustre L.
uliginosum L.
verum L.
mollugo L.
saxatile L.
provinciale Lmk.
lucidum.
glaucum L.
rubioïdes L.
sylvaticum L.
linifolium Lmk.
pumilum Lmk.
jussiaei Vill.
trichophyllum All.
parisiense Lmk.
divaricatum Lmk.

2. *Fructu hispido aut aspero.*

rotundifolium L.
aparine L.
— minor.
villosum Lmk.
spurium L.

CAILLELAIT.

I. *Fruit glabre.*

des marais. F. ♀
aquatique. F. ♀
jaune. F. ♀ (méd.)
blanc. F. ♀
des rochers. F. ♀
de Provence. ♀
luisant. F. ♀
glaucue. F. ♀
à feuell. de garance. F. ♀
des bois. F. ♀
à feuell. de lin. F. ♀

nain. F., Alpes. ♀

de Paris. ☉

étalé. F. ☉

2. *Fruit hérissé ou rude.*

à feuell. rondes. F. ♀
apariné. F. ☉
— petit.
velu. esp. ♀
à fruit rude. F. ☉

CRUCIANELLA

angustifolia L.
latifolia L.
ciliata Lth.
maritima L.

CRUCIANELLE

à feuell. étroites. f. ☉
à feuell. larges. f. ☉
ciliée. orient. ☉
maritime. f., or. ♪

VALANTIA

muralis L.
hispida L.
articulata L.
aparine L.
cruciata L.

VALANTIA

des murailles. f. ☉
velu. f. ☉
articulé. orient. ☉
à gros fruit. f. ☉
croisette. f. ♡

RUBIA

tinctorum L.
lucida L.
angustifolia L.
cordifolia L.

GARANCE

des teinturiers. f. ♡ (arts.)
luisante. barbare, or. ♪
à feuell. étroites. minorq., or. ♪
à feuell. en cœur. russe. ♡

ANTHOSPERMUM

æthiopicum L.

ANTHOSPERMUM

d'Ethiopie. s. ch. ♪

II. *Fructus dicoccus dispermus*, stamina 4,
rarius 5 aut 6.

II. 2 graines accolées, 4 étamines,
 rarement 5 ou 6.

HOUSTONIA

coccinea Andr.

HOUSTONIA

écarlate. Mexique, s. ch. ♪
 (orn.)

SPERMACOCE

verticillata L.
tenuior L.

SPERMACOCÉ

verticillé. am. m., s. ch. ♪
grêle. am. ☉

DIODIA

virginiana L.

DIODIA

de Virginie. or. ♡

PHYLLIS

nobla L.

PHYLLIS

à feuell. ternées. canar., or. ♪

III. *Fructus monocarpus bilocularis poly-*
spermus, stamina 4.

III. 1 fruit à 2 loges polyspermes,
 4 étamines.

OLDENLANDIA

madagascariensis.

OLDENLANDIA

de Madagascar. ☉

CATESEEA

spinosa L.

CATESBÆA

épineux. am. m., s. ch. ♪

IV. *Fructus monocarpus bilocularis poly-*
spermus, stamina 5.

IV. 1 fruit à 2 loges polyspermes,
 5 étamines.

RANDIA

aculeata L.

RANDIA

épineux. Antilles, s. ch. ♪

PINCKNEYA Mich.

pubens Mich.

PINCKNEYA

pubescent. am. s., or. ♪

RONDELETIA
triflora *vahl.*

GENIPA
americana *L.*

GARDENIA
florida *L.*
verticillata.

V. *Fructus monocarpus bilocularis dispermus, stamina 4.*

IXORA
coccinea *L.*
alba *L.*

ERNODEA *swartz.*
littoralis *swartz.*

VI. *Fructus monocarpus bilocularis dispermus, stamina 5.*

SERISSA *Juss.*
foetida.
lycium foetidum *L. f.*
lycium indicum *Retz.*
lycium japonicum *Thunb.*
buckhia coprosmodites *L'Her.*

CHIODOCCA
racemosa *L.*

PSYCHOTRIA
undata *Jacq.*

COFFEA
arabica *L.*

POEDERIA
foetida *L.*

VII. *Fructus monocarpus multilocularis loculis monospermis, stamina 4, 5 aut plura.*

GUETTARDA
scabra *Vent.*
matthiola scabra *L.*

VIII. *Fructus monocarpus multilocularis loculis polyspermis, stamina 5 aut plura.*

HAMELLIA
patens *L.*

RONDELÉTIA
à trois fleurs. Antilles, s. ch. 5

GÉNIPA
d'Amérique. Am. m., s. ch. 5

GARDÉNIA
à grandes fleurs. cap, or. 5
(orn.)
verticillé. s. ch. 5

V. 1 fruit à 2 loges monospermes,
4 étamines.

IXORA
écarlate. Am. m., s. ch. 5 (orn.)
blanc. inde, s. ch. 5

ERNODÉA
des rivages. Antilles, s. ch. 5

VI. 1 fruit à 2 loges monospermes,
5 étamines.

SÉRISSA
fétide. Japon, s. ch. 5

CHIOCOCCA
à grappes. Am. m., s. ch. 5

PSYCHOTRIA
ondulé. Am. m., s. ch. 5

CAFÉ
d'Arabie. As., s. ch. 5 (écon.,
méd.)

PÉDÉRIA
fétide. inde, s. ch. 5

VII. 1 fruit à plusieurs loges monospermes,
4, 5 ou un plus grand nombre d'éta-
mines.

GUETTARDA
rude. Antilles, s. ch. 5

VIII. 1 fruit à plusieurs loges polyspermes,
5 étamines ou plus.

HAMELLIA
ouvert. Am. m., s. ch. 5

IX. Flores aggregati supra receptaculum commune, aut rarius coadunati.

MITCHELLA

repens L.

OPERCULARIA Gærtner.

paleata Young.

sessiliflora Juss.

aspera Gærtner.

CEPHALANTHUS

occidentalis L.

ORDO III.

CAPRIFOLIA.

1. Calix caliculatus aut bracteatus, stylus 1, corolla monopétale.

LINNEA

borealis L.

TRIOSTEUM

perfoliatum L.

SYMPHORICARPOS (Lonicera L.)

parviflora.

DIERVILLA (Lonicera L.)

lutea.

LONICERA.

1. Caule volubili.

parviflora Lmk. }

dioica H. K. }

caprifolium L.

periclymenum L.

sempervirens L.

2. Caule recto, pedunculis bifloris.

tatarica L.

pyrenaica L.

nigra L.

cœrulea L.

xylostemon L.

alpigena L.

- II. Calix caliculatus aut bracteatus, stylus 1, corolla sub-polypétale.

VISCUM

album L.

IX Fleurs rapprochées sur un réceptacle commun, ou plus rarement réunies.

MITCHELLA

rampant. Am. s. h

OPERCULAIRE

à paillettes. N. holl., or. v

à fleurs sessiles. N. holl., or. v

à fruit rude. N. holl., or. v

CÉPHALANTE

d'occident. Am. s. h (orn.)

ORDRE III.

LES CHÈVREFEUILLES.

1. Calice caliculé ou accompagné de bractées, 1 style, corolle monopétale.

LINNÉE

boréale. Alpes. h

TRIOSTÉUM

perfolié. Am. s. v

SYMPHORINE

à petites fleurs. Am. s. h

DIERVILLA

jaune. Am. s. h (orn.)

CHÈVREFEUILLE.

1. Tige grimpante.

à petites fleurs. Am. s. h (orn.)

des jardins. F. m. h (orn.)

des bois. F. h (orn.)

toujours vert. Am. s. h (orn.)

2. Tige droite, pédoncules à 2 fleurs.

de Tartarie. h (orn.)

des Pyrénées. F. h (orn.)

à fruit noir. F., Alpes. h (orn.)

à fruit bleu. F., Alpes. h (orn.)

velu. F., Alpes. h (orn.)

des Alpes. F. h (orn.)

- II. Calice caliculé ou accompagné de bractées, 1 style, corolle presque polypétale.

GUI

blanc. F. h (méd.)

III. *Calix bracteatus, stylus nullus, stigmata 3, corolla monopetala.*

III. Calice accompagné de bractées, style nul, 3 stigmates, corolle monopétale.

VIBURNUM

tinus L.
— latifolius.
nudum L.
lentago L.
prunifolium L.

pyrifolium.

cassinoides L.

punicifolium.

lantana L.
— canadensis.
dentatum L.
— longifolium.
acrifolium L.

opulus L.
— sterilis.

HORTENSIA

rosea
hydrangea hortensia smith. }

SAMBUCUS

ebulus L.
canadensis L.
nigra L.
— virescens.
— laciniata L.
racemosa L.

IV. *Calix simplex, stylus 1, corolla sub-polypetala.*

CORNUS

sanguinea L.
alba L.
stricta l'Her.
paniculata l'Her. }
racemosa Link. }
sericea l'Her. }
anomum Mill. }
cœrulea Link. }
circinata l'Her. }
rugosa Link. }

VIOIRNE

laurier-tin. esp. h (orn.)
— à larges feuil.
nne. Am. s. h (orn.)
luisante. Am. s. h (orn.)
à feuil. de premier. Am. s. h (orn.)
à feuil. de poirier. Am. s. h (orn.)
à feuil. de cassiné. Am. s., or. h
à feuil. de grenadier. Am. s., or. h
cotonneuse. F. h
— de Canada.
dentée. Am. s. h (orn.)
— à longues feuil.
à feuil. d'érable. Am. s. h (orn.)
obier. F. h (orn.)
— boule de neige. (orn.)

HORTENSIA

rose. jap., or. h (orn.)

SUREAU

lieble. F. h (méd.)
de Canada. h
noir. F. h (écon., méd.)
— vert.
— lacinié.
à grappes. F. h (orn.)

IV. Calice simple, 1 style, corolle presque polypétale.

CORNOUILLER

sanguin. F. h (écon.)
blanc. Am. s. h (orn.)
élancé. Am. s. h (orn.)
paniculé. Am. s. h (orn.)

à fruit bleu. Am. s. h (orn.)

à feuil. rondes. Am. s. h (orn.)

florida L.
 mascula L.
 — flava.
 alternifolia L.
 succica L.
 canadensis L.

à grande fleur. Am. s. ♀ (orn.)
 mâle. F. ♀ (écon.)
 — à fruit jaune.
 à feuell. alternes. Am. s. ♀
 (orn.)
 de Suède. ♀
 de Canada. ♀

HEDERA

helix L.

LIERRE

commun. F. ♀ (orn., écon.)

CLASSIS XII.

CLASSE XII.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

POLIPETALÆ.

POLYPÉTALES.

(Stamina epigyna.)

(Étamines sur le pistil.)

ORDO I.

ORDRE I.

ARALIÆ.

LES ARALIES.

ARALIA

spinosa L.
 racemosa L.
 hispida Mich.
 nudicaulis L.

ARALIA

épineux. Am. s. ♀ (orn.)
 à grappes. Am. s. ♀
 velu. Am. s. ♀
 à tiges nues. Am. s. ♀

PANAX

quinquefolium L.
 aculeatum H. K.
 zanthoxylum trifoliatum L. }

PANAX

ginseng. chine, Am. s. ♀ (méd.)
 épineux. chine, or. ♀

ORDO II.

ORDRE II.

UMBELLIFERÆ.

LES OMBELLIFÈRES.

ÆGOPODIUM

podagraria L.

ÆGOPODIUM

podagraire. F. ♀

PIMPINELLA

saxifraga L.
 magna L.
 — rubens.
 dissecta Retz.
 peregrina L.
 dioica L.
 anisum L.

BOUCAGE

saxifrage. F. ♀
 élevé. F. ♀
 — rouge.
 lacinié. suisse. ♀
 étranger. ital. ♀
 dioïque. F. ♀
 anis. orient. ☉ (écon., méd.)

CARUM

carvi L.

APIUM

petroselinum L.

— crispum.

— tuberosum.

graveolens L.

— celeri.

ANETHUM

segetum L.

graveolens L.

foeniculum L.

SMYRNIUM

olusatrum L.

perfoliatum L.

PASTINACA

sativa L.

opopanax L.

lucida L.

dissecta Vent.

THAPSIA

villosa L.

garganica L.

SESELI

montanum L.

annuum L.

ammoïdes L.

elatum L.

tortuosum L.

IMPERATORIA

ostruthium L.

sylvestris.

angelica sylvestris L. }

verticillaris.

angelica verticillaris L. }

CHÆROPHYLLUM

sylvestre L.

bulbosum L.

temulum L.

aromaticum L.

aureum L.

hirsutum L.

coloratum L.

SCANDIX

odorata L.

CARVI

cultivé. F. ♂ (écon., méd.)

APIUM

persil. sardaigne. ♂ (alim.)

— crépu.

— tubéreux.

des marais. F. ♂

— céleri. (alim., méd.)

ANET

des moissons. portugal. ☉

fétide. esp. ☉

fenouil. F. m. ♀ (écon., méd.)

MACERON

à semill. ternées. F. ♂

perfolié. orient. ♂

PANAIS

cultivé. F. ♂ (alim., méd.)

opopanax. sicile. ♀ (méd.)

luisant. malion. ♂

déconpé. syrie, or. ♂

THAPSIA

veln. F. m. ♀

lisse. F. m. ♀

SÈSÉLI

de montagne. F. ♀

annel. F. ♂

à feuell. d' ammi. portugal. ☉

tuberculeux. F. ♀

tortueux. F. m. ♂

IMPÉRATOIRE

des Alpes. F. ♀ (méd.)

des prés. F. ♀

verticillée. F. ♀

MYRRHIS

sauvage. F. ♀

bulbeux. F. ♂

tacheté. F. ♂

aromatique. Autriche. ♀

jaune. F. ♀

veln. F. ♀

coloré. illyrie. ♂

CERFEUIL

musqué. F., Alpes. ♀ (écon.)

pecten *L.*
 australis *L.*
 pinnatifida *vent.*
 ceresfolium *L.*
 antriscus *L.*
 trichosperma *L.*
CORIANDRUM
 sativum *L.*
 testiculatum *L.*
ÆTHUSA
 cynapium *L.*
 meum *L.*
 huius *L.*
CICUTA
 virosa *L.*
 maculata *L.*
PHELLANDRIUM
 aquaticum *L.*
 mutellina *L.*
OENANTHE
 fistulosa *L.*
 crocata *L.*
 prolifera *L.*
 globulosa *L.*
 pinpinelloïdes *L.*
CUMINUM
 cyminum *L.*
BUBON
 macedonicum *L.*
 rigidius *L.*
 galbanum *L.*
 levigatum *H. K.*
 gummiferum *L.*
SISON
 segetum *L.*
 amomum *L.*
 canadense *L.*
 ammi *L.*
 inundatum *L.*
 verticillatum *L.*
SIMUM
 angustifolium *L.*
 latifolium *L.*
 nodiflorum *L.*
 repens *L.*

peigne de *Vénus*. *F.* ☉
 austral. *F. m.* ☉
 pinnatifide. *perse.* ☉
 cultivé. *F.* ☉ (écon.)
 hérissé. *F.* ☉
 à longues soies. *orient.* ☉
CORIANDRE
 cultivée. *orient.* ☉ (écon., méd.)
 bilobée. *eur. austr.* ☉
ÆTHUSA
 fétide ou petite ciguë. *F.* ☉ (vén.)
 meum. *F.*, *Alpes.* ☿ (méd.)
 à feuil. de coriandre. *F.* ♂
CIGUE
 aquatique. *F.* ☿ (vén.)
 tachetée. *am. s.* ☿ (vén.)
PHELLANDRIUM
 aquatique. *F.* ♂ (vén.)
 des *Alpes.* *F.* ☿
OENANTHÉ
 fistulense. *F.* ☿
 à feuil. de persil. *F.* ☿
 prolifère. *sicile.* ☿
 globuleuse. *F.* ♂
 à feuil. de boucage. *F.* ☿
CUMIN
 officinal. *orient.* ☉ (méd.)
BUBON
 de *Macédoine.* ♂
 à feuil. roides. *or.* ☿
 galbanum. *cap, or.* ☿ (méd.)
 lisse. *cap, or.* ☿
 gommifère. *cap, or.* ☿
SISON
 des moissons. *F.* ♂
 amomum. *F.* ♂
 de *Canada.* ☿
 ammi. *orient.* ☉
 aquatique. *F.* ☉
 verticillé. *F.* ☿
BERLE
 à feuil. étroites. *F.* ☿
 à feuil. larges. *F.* ☿
 nodiflore. *F.* ☿
 rampante. *F.* ☿

sisarum L.
 falcaria L.
 siculum L.

ANGELICA

archangelica L.

lucida L.
 atropurpurea L.
 razoulii *Couan.*
 triloba.
 laserpitium trilobum *Jacq.* }

LIGUSTICUM

levisticum L.

peloponense L.
 pyrenæum *Couan.*
 austriacum *Jacq.*
 peregrinum *Jacq.*

HERACLEUM

sphondylium L.
 angustifolium L.
 alpinum L.
 laciniatum.
 amplifolium *Lapeyr.*

LASERPITIUM

latifolium L.
 gallicum L.
 — crispum.
 siler L.
 halleri L.
 simplex L.
 thapsioides *Desf.*
 triquetrum *Vent.*

FERULA

communis L.
 ferulago L.
 tingitana L.
 orientalis L.
 nodiflora L.

PEUCEDANUM

officinale L.
 altissimum.
 alsaticum *Poiret.* }
 album. }
 an minus L. }

chervi. F. ψ (alim.)
falciforme. F. ψ
de Sicile. ♂

ANGÉLIQUE

de Bohême. F., Alpes. ♂ (écon.,
 méd.)
luisante. Am. s. ♂
noir-pourpre. Canada. ψ
de Razoul. F., pyrénées. ψ
trilobée. Italie. ψ

LIVÊCHE

officinale. F., Alpes. ψ (écon.,
 méd.)
cicutaire. Carniole. ψ (orn.)
des Pyrénées. F. ψ
d'Autriche. F. ψ
à feuell. de céleri. Portugal. ♂

BERCE

des prés. F. ψ (écon., méd.)
à feuell. étroites. F. ψ
des Alpes. F. ψ
laciniée. Sibérie. ψ
à grandes feuell. Pyrénées. ψ

LASER

à larges feuell. F. ψ
cunéiforme. F. ψ
 — *crépu.*
lancéolé. F. ψ
de Haller. F., Alpes. ψ
à tiges simples. F., Alpes. ψ
jaune. Barbarie, or. ψ
triangulaire. Asie, or. ψ

FÉRULE

commune. Eur. aust. ψ
luisante. Barbarie. ψ
de Tanger. Barbarie. ψ
d'orient. ψ (orn.)
nodiflore. Orient. ψ

PEUCÉDANUM

officinal. F. ψ (méd.)
gigantesque. ψ
blanc. ψ

tenuifolium *poiret.*
silaüs *L.*

CACHRYS

tomentosa *Desf.* }
panacisfolia *Vahl.* }
libanotis *L.*
sicula *L.*

CRITHMUM

maritimum *L.*

ATHAMANTA

libanotis *L.*
condensata *L.*
sibirica *L.*
cervaria *L.*
oreoselinum *L.*
sicula *L.*
cretensis *L.*
annua *L.*

SELINUM

chabraci *Murr.*
palustre *L.*
pyrenaum *Gouan.*
seguieri *L.f.*
peucedanoïdes.
austriacum *L.*
carvisfolia *L.*
monnieri *L.*

CONIUM

maculatum *L.*

BUNIUM

bulbocastanum *L.*
minus. *Gouan.*

AMMI

majus *L.*
visnaga. }
daucus visnaga *L.* }

DAUCUS

meoïdes.
carota *L.*

CAUCALIS

grandiflora *L.*
daucoïdes *L.*
latifolia *L.*
platicarpus *L.*

à semill. menues. ♀
des prés. *F.* ♀

CACHRYS

cotonneux. *barbarie.* ♀
libanotis. *sicile,* *or.* ♀
de Sicile. *or.* ♀

CRITHMUM

maritime. *F.* ♀ (*écon.*)

ATHAMANTA

libanotis. *suède.* ♀
à fleurs denses. *sibérie.* ♀
de Sibérie. ♀
glauc. *F.* ♀
oreosolinum. *F.* ♀
de Sicile. *F. m., or.* ♀
de Crète. *F., Alpes.* ♀
annuelle. *orient.* ☉

SËLINUM

de Chabrëus. *F.* ♀
des marais. *F.* ♀
des Pyrénées. *F.* ♀
de Segnier. *italie.* ♀
à feull. de peucedanum. ♀
d'Autriche. *F.* ♀
à feull. de carvi. *F., Alp.* ♀
de Lemonnier. *F. m.* ☉

CONIUM

ciguë des jardins. *F.* ♂

BUNIUM

terre-noix. *F.* ♀
petit. *F. m.* ♀

AMMI

officinal. *F.* ☉ (*méd.*).
bisnagre. *F.* ☉

CAROTTE

à feull. de meum. ♀
cultivee. *F.* ♂ (*alim., méd.*)

CAUCALIS

à grandes fleurs. *F.* ☉
à feull. de carotte. *F.* ☉
à larges feull. *F.* ☉
à gros fruit. *F.* ☉

leptophylla L.
anthriscus.
nodosa.

à feuell. menues. F. ☉
anthriscus. F. ☉
nodiflore. F. ☉

TORDYLIUM

syriacum L.
officinale L.
apulum L.
maximum L.

TORDYLIUM

de Syrie. orient. ☉
officinal. F. m. ☉
d'Italie. ☉
lanceolé. F. m. ☉

HASSELQUISTIA

egyptiaca L.

HASSELQUISTIA

d'Egypte. ☉

ARTEDIA

squamata L.

ARTEDIA

écailleux. orient. ☉

BUPLEVRUM.

1. Herbaceu.

rotundifolium L.
longifolium L.
stellatum L.
petraeum L.
ranunculoïdes L.
falcatum L.
semicompositum L.
odontites L.
junceum L.
tenuissimum L.
rigidum L.

2. Fruticosa.

spinosum L. f.
fruticescens L.
fruticosum L.
coriaceum l'Her.
gibraltaricum Link.
obliquum Vahl.
arborescens Jacq. }

1. Tiges herbacées.

à feuell. rondes. F. ☉
à feuell. longues. F., Alpes. ψ
étoile. F., Alpes. ψ
des rochers. F., Alpes. ψ
renoncule. F., Alpes. ψ
falciforme. F. ψ
demi-composé. F. m. ☉
odontités. F. m. ☉
jonciforme. F. ☉
filiforme. F. ☉
à feuell. dures. F. m. ψ

2. Tiges ligneuses.

épineux. F. m. h
à feuell. étroites. barb., or. h
arbrisseau. F. m. h (orn.)

coriace. barbaric, or. h

ECHINOPHORA

spinoso L.
tenuifolia L.

ECHINOPHORA

épineux. F. m. ψ
à petites feuell. orient. ψ

ASTRANTIA

major L.

ASTRANTIA

à grandes fleurs. F., Alpes. ψ
(orn.)
à petites fleurs. F., Alpes. ψ

minor L.

SANICULA

europæa L.
marylandica L.

SANICLE

d'Europe. F. ψ (méd.)
de Maryland. ψ

ERYNGIUM

plānum L.
 aquaticum L.
 dichotomum Desf.
 pusillum L.
 alpinum L.
 spina-alba Vill.
 campestre L.

dilatatum Zmk.
 bourgati Couan.
 maritimum L.
 tenue Desf.
 suaveolens Brouss.

HYDROCOTYLE

vulgaris L.
 sibthorpioides Zmk.
 americana L.
 spananthe Willd.
 spananthe paniculata Jacq. }

LAGOECIA

cuminoïdes L.

ERYNGIUM

à feuill. planes. F. ♂
 aquatique. Am. s. ♀
 dichotome. Barbarie. ☉
 petit. Barbarie, or. ♀
 des Alpes. F. ♀
 à épines blanches. F., Alp. ♀
 des champs, ou chardon Ro-
 land. F. ♀ (méd.)
 dilaté. Maroc. ♀
 bourgati. F. m. ♀
 maritime. F. ♀
 filiforme. Barbarie. ☉
 odorant. canaries. ☉

HYDROCOTYLÉ

écuelle d'eau. F. ♀
 à feuill. de sibthorpia.
 d'Amérique. Am. s. ♀
 barbu. Am. m. ☉

LAGOECIA

à feuill. de cumin. F. m. ☉

CLASSIS XIII.

CLASSE XIII.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

POLYPETALÆ.

POLYPÉTALES.

(Stamina hypogynā.)

(Étamines attachées sous le pistil.)

ORDO I.

ORDRE I.

RANUNCULACEÆ.

LES RENONCULES.

I. Capsulæ monospermæ non dehiscentes.

I. Capsules monospermes ne s'ouvrant pas.

CLEMATIS.

CLÉMATITE.

1. Scandentes.

1. Tiges grimpantes.

viorna L.
 viticella L.
 crispa L.
 florida Thunb.

viorne. Am. s. ♀
 blene. Esp. ♀ (orn.)
 crépue. caroline. ♀
 à grandes fleurs. Japon, or. ♀
 (orn.)
 d'orient. ♀
 brillante. F. ♀

orientalis L.
 vitalba L.

virginiana L.
 flammula L.
 cirrhosa L.
 calycina H. K. }
 balearica Zmk. }

2. *Erectæ.*

erecta L.
 integrifolia L.

ATRAGENE

alpina L.
 — flava.
 indica.

THALICTRUM

alpinum L.
 foetidum L.
 tuberosum L.
 minus L.
 majus Jacq.
 angustifolium L.
 flavum L.
 angulosum.
 glaucum.
 rugosum.
 nigricans Jacq.
 medium Jacq.
 atropurpureum Jacq. }
 aquilegifolium L. }

ANEMONE

hepatica L.
 vernalis L.
 pulsatilla L.
 alpina L.
 apiifolia Wild.
 coronaria L.
 stellata Zmk. }
 hortensis L. }
 baldensis L.
 sylvestris L.
 virginiana L.
 dichotoma L.
 trifolia L.
 nemorosa L.
 ranunculoïdes L.
 narcissiflora L.
 thalictroïdes L.

de Virginie. H
 odorante. F. m. H (orn.)
 à vrilles. Barbar. H (orn.)
 à grand calice. Mahon. H

: 2. Tige droite.

droite. F. m. ψ
 à feuell. entières. Autriche. ψ

ATRAGÈNE

des Alpes. F. H
 — jaune.
 des Indes. s. ch. H

PICAMON

des Alpes. F. ψ
 fétide. F. ψ
 tubéreux. F., Pyrén. ψ
 des bois. F. ψ
 élevé. Autriche. ψ
 à feuell. étroites. F. ψ
 des prés. F. ψ
 anguleux. ψ
 glauque. ψ
 ridé. F. m. ψ
 noir. Autriche. ψ
 moyen. Hongrie. ψ
 à feuell. d'ancolie. F., Alp. ψ
 (orn.)

ANÉMONE

hepatique. Eur. ψ (orn.)
 printanière. F. ψ
 pulsatile. F. ψ
 des Alpes. F. ψ
 à feuell. de persil. F., Alpes. ψ
 des jardins. orient. ψ (orn.)
 étoilée. F. m. ψ
 du mont Baldus. F., Alpes. ψ
 sauvage. suisse. ψ
 de Virginie. ψ
 dichotome. Canada. ψ
 à trois feuell. F. ψ
 des bois. F. ψ
 reconcule. F. ψ
 à fleurs de narcisse. F., Alp. ψ
 à feuell. de picamon. Am. s. ψ

ADONIS

æstivalis L.
autumnalis L.
vernalis L.

ANAMENIA Vent.

coriacea Vent. }
adonis capensis L. }

RANUNCULUS.

1. *F. liis simplicibus.*

flammula L.
lingua L.
gramineus L.
nodiflorus L.
pyrenæus L.
amplexicaulis L.
parnassifolius L.
bullatus L.
• ficaria L.
thora L.

2. *Foliis dissectis et divisis.*

creticus L.
spicatus Desf.
auricomus L.
sceleratus L.
pennsylvanicus L. f. }
canadensis Jacq. }
aconitifolius L.
platanifolius L.
asiaticus L.
glacialis L.
rutæfolius L.
nivalis L.
alpestris L.
hirsutus Curtis. }
pallidior Vill. }
phlœonotis Retz. }
bulbosus L.
repens L.
aeris L.
lanuginosus L.
chærophyllus L.
arvensis L.
muricatus L.
parviflorus L.
falcatus L.
hederaceus L.

ADONIS

d'été. F. ☉
d'automne. F. ☉
printanier. F., Alpes. ♀

ANAMENIA

à feüill. coriaces. cap, or. ♀

RENONCULE.

1. Feuilles entières.

petite donve. F. ♀
lanceoloc. F. ♀
à feüill. de gramen. F. ♀
à fleurs sessiles. F. ♀
des Pyrénées. F. ♀
amplexicanle. F., Alpes. ♀
à feüill. de parnassia. F., Alp. ♀
bulleuse. barbarie. ♀
petite chelidaine. F. ♀ (méd.)
thora. F., Alpes. ♀

2. Feuilles découpées.

de Crète. ♀
à épis. barbarie. ♀
printanière. F. ♀
scelerate. F. ☉ (vén.)
de Pensylvanie. ♂
à feüill. d'aconit. F., Alpes. ♀
à feüill. de platane. F., Alp. ♀
d'Asie. ♀
des glaciers. F., Alpes. ♀
à feüill. de rue. F., Alpes. ♀
des neiges. F., Alpes. ♀
des Alpes. F. ♀

velne. F. ☉

bulbense. F. ♀ (vén.)
rampante. F. ♀ (vén.)
âcre. F. ♀ (vén.)
lanuginense. F. ♀
à feüill. de cerfeuil. F. ♀
des champs. F. ☉
hérissée. F. ☉
à petites fleurs. F. ☉
falciforme. F. m. ☉
à feüill. de lierre. F. ♀

aquatilis L.
— circinatus.
peucedanoïdes.

MYOSURUS
minimus L.

II. Capsulæ polyspermæ.

TROLLIUS
europæus L.

HELLEBORUS
hyemalis L.
niger L.
viridis L.
foetidus L.
lividus H. K.

ISOPYRUM
thalictroïdes L.
fumarioïdes L.

NIGELLA
damascena L.
sativa L.
arvensis L.
hispanica L.
orientalis L.

GARIDELLA
nigellastrum L.

AQUILEGIA
vulgaris L.
alpina L.
viridiflora H. K.
canadensis L.

DELPHINIUM.

1. Unicapsularia.

consolida L.
ajacis L.

2. Capsulæ 3 aut 5.

ambiguum L.
peregrinum L.
grandiflorum L.
elatum L.
— hirsutum. }
— hybridum *Willd.* }
staphysagria L.

aquatique. F. ♀ (vén.)
— arrondie.
à feuell. de peucedanum. F. ♀

MYOSURUS
petit. F. ☉

II. Capsules polyspermes.

TROLLIUS
d'Europe. F., alpes. ♀

HELLEBORE
d'hiver. F., alpes. ♀
noir. F., alpes. ♀ (orn.)
vert. F., alpes. ♀
pié de griffon. F. ♀
livide. corse. ♀

ISOPYRUM
à feuell. de pigamon. F. ☉
à feuell. de fumeterre. F. ♀

NIGELLE
à involucre. F. m. ☉ (orn.)
cultivée. orient. ☉
des champs. F. ☉
d'Espagne. F. m. ☉
d'orient. ☉

GARIDELLE
de Provence. ☉

ANCOLIE
des jardins. F. ♀ (orn.)
des Alpes. F. ♀
à fleurs vertes. sibérie. ♀
de Canada. ♀ (orn.)

DELPHINIUM.

1. Une seule capsule.

des blés. F. ☉
d'Ajax. suisse. ☉ (orn.)

2. 3 ou 5 capsules.

de deux couleurs. maroc. ☉
etranger. barbarie. ☉
à grandes fleurs. sibérie. ♀
éleve. sibérie. ♀ (orn.)
velu. sibérie. ♀
staphysaigre. F. m. ♂ (vén.,
méd.)

ACONITUM.

1. *Corollæ flava.*

lycoctonum L.

pyrenaicum L.

anthora L.

2. *Corollæ caruleæ.*

napellus L.

cammarum L.

CALTHA

palustris L.

PÆONIA

mascula L. }

corallina Retz. }

femina L. }

officinalis Retz. }

villosa. }

humilis Retz. }

lobata.

albiflora Pallas.

anomala L.

tenuifolia L.

ZANTHORHIZA l'her.

apiifolia l'her.

III. *Germen unicum, bacca unilocularis polysperma.*

ACTÆA

spicata L.

— alba.

— rubra.

racemosa L.

PODOPHYLLUM

peltatum L.

ORDO II.

PAPAVÉRACEÆ.

I. *Stamina indefinita, antheræ filamentis adnatæ.*

SANGUINARIA

canadensis L.

ARGÉMONE

mexicana L.

ACONIT.

1. Corolles jaunes.

tue-loup. F., Alpes. ψ (vén.)

des Pyrénées. ψ (vén.)

anthora. F., Alpes. ψ (vén.)

2. Corolles bleues.

napel. F., Alpes. ψ (vén.)

à grandes fleurs. F., Alpes. ψ (vén.)

CALTHA

des marais. F. ψ (orn.)

PIVOINE

mâle. suisse. ψ (orn., méd.)

femelle. F., Alp. ψ (orn., méd.)

velue. esp. ψ (orn.)

lobée. ψ (orn.)

blanche. sibérie. ψ (orn.)

laciniée. sibérie. ψ (orn.)

à feuil. menues. sibér. ψ (orn.)

ZANTHORHIZA

à feuil. de persil. Am. s. ψ

III. 1 seul ovaire, baie polysperme à une loge.

ACTÆA

des Alpes. F. ψ (méd.)

— à fruit blanc. Am. s. ψ

— à fruit rouge.

à grappes. Am. s. ψ

PODOPHYLLUM

en bouclier. Am. s. ψ

ORDRE II.

LES PAVOTS.

I. Etamines indéfinies, anthères attachées le long du bord des filets.

SANGUINAIRE

de Canada. ψ

ARGÉMONE

du Mexique. ☉

PAPAVER.

1. *Capsulis hispidis.*

hybridum L.
argemone L.
alpinum L.
nudicaule L.

2. *Capsulis glabris.*

rheas L.
dubium L.
cambricum L.
orientale L.
sommiferum L.
— nigrum L.

CHELIDONIUM

glaucium L.
corniculatum L.
hybridum L.
majus L.
— quercifolium.

II. *Stamina definita.*

BOCCONIA

frutescens L.

HYPECOUM

procumbens L.

FUMARIA

cucullaria L.
bulbosa L.
solida *smith.*
nobilis L.
fungosa H. K.
sempervirens L.
lutea L.
vesicaria L.
parviflora *Link.*
officinalis L.
capreolata L.
claviculata L.
spicata L.

PAVOT.

1. *Capsules hérissées.*

hybride. F. ☉
argémone. F. ☉
des Alpes. F. ☿
à tiges nues. F., Alpes. ☿

2. *Capsules glabres.*

coquelicot. F. ☉ (méd.)
à long fruit. F. ☉
jaune. F., Alpes. ☿
d'orient. ☿ (orn.)
des jardins. F. ☉ (orn., méd.,
écon.)
— à graines noires.

CHÉLIDOINE

glaucue. F. ♂
cornue. F. m. ☉
hybride. F. m. ☉
officinale. F. ☿ (méd.)
— à feuil. de chêne.

II. *Etamines définies.*

BOCCONIA

arbrisseau. Am. m., s. ch. ♀

HYPÉCOUM

tombant. F. ☉

FUMETERRE

capuchon. Am. s. ☿
bulbeuse. F. ☿ (orn.)
solide. F. ☿
odorante. sibérie. ☿
fongueuse. Am. s. ☿
toujours verte. Am. s. ☉
jaune. barbarie. ☿
vésiculeuse. cap. ☉
à petites fleurs. F. m. ☉
officinale. F. ☉ (méd.)
à vrilles. F. m. ☉
claviculée. F. m. ☉
à épis. F. m. ☉

ORDO III.

CRUCIFERÆ.

I. *Siliquosæ.*

RAPHANUS

- sativus L.
 — olcifer.
 — niger.
 raphanistrum L.

SINAPIS

- arvensis L.
 alba L.
 nigra L.
 incana L.
 pubescens L.
 pyrenaïca L.
 hispida *schousb.*
 cernua *Thunb.*
 juncea L.
 brassicata L.
 erucoïdes L.

BRASSICA

- cheiranthos *vill.*
 eruca L.
 erucastrum L.
 richeri *vill.*
 alpina L.
 vesicaria L.
 oleracea L.
 — sylvestris.
 — sabellica.
 — gongliodes.
 — botrytis.
 — viridis.
 — capitata.
 — rubra.
 rapa L.
 napus L.
 arvensis L.
 campestris L.
 orientalis L.

TURRITIS et ARABIS L.

- glabra L.
 hirsuta L.
 arabis hispida *Lmk.* }

ORDRE III.

LES CRUCIFÈRES.

I. *Siliqueuses.*

RAIFORT

- cultivé. chine. ☉ (écon.)
 — radis.
 — noir. ♂
 des moissons. f. ☉

MOUTARDE

- des champs. f. ☉
 blanche. f. ☉
 sénévé. f. ☉ (écon.)
 incane. f. ♂
 pubescente. sicile, or. ♀
 des Pyrénées. f. ♂
 hérissée. maroc. ☉
 penchée. chine. ☉
 jonciforme. chine. ☉
 à feuil. de chou. chine. ☉
 fausse roquette. f. m. ☉

CHOU

- à fleur de cheiri. f., Alpes. ♂
 roquette. f. ☉
 fausse roquette. f. m. ☉
 de Richer. f., Alpes. ♀
 des Alpes. f. ♀
 vésiculeux. Espagne. ☉
 commun. f. ♂ (alim.)
 — sauvage. (alim.)
 — frisé. (alim.)
 — rave. (alim.)
 — fleur. (alim.)
 — vert. (alim.)
 — pommé. (alim.)
 — rouge. (alim.)
 turneps. f. ♂ (alim.)
 navet. f. ♂ (alim.)
 violet. f. ♀
 des champs. f. ☉
 d'orient. f. ☉

TOURETTE

- glabre. f. ♂
 velue. f. ♂

hispida L.
 bellidifolia L.
 verna L.
 thaliana L.
 pendula L.
 turrita L.

HESPERIS

matronalis L.
 tristis L.
 lyrata Lmk.
 africana L.
 laxa Lmk.
 verna L.
 maritima.
 cheiranthus maritimus L. }
 chia L.
 cheiranthus chius L. }
 linifolia Pourret.

CHEIRANTHUS

cheiri L.
 mutabilis l'Her.
 fenestralis L.
 sinuatus L.
 incanus L.
 annuus L.
 græcus.
 hesperis æstiva Lmk. variet B. }
 littoreus L.
 tristis L.
 tricuspидatus L.
 farsetia L.

ERYSIMUM

officinale L.
 barbarea L.
 præcox smith.
 alliaria L.
 repandum L.
 cheiranthus paniculatus Lmk. }
 cheiranthoides L.
 hieracifolium L.
 murale.
 cheiranthus erysimoides L. }
 alpinum.
 cheiranthus alpinus L. }
 quadrangulum.
 cheiranthus quadrangulus l'Her. }
 cheiranthus cornutus Lmk. }

hérissée. F., Alpes. ♀
 à feuell. de paquerette. F., Alp. ♀
 printanière. F., Alpes. ♀
 paniculée. F. ☉
 pendante. F., Alpes. ♂
 inclinec. F., Alpes. ♂

JULIENNE

cultivée. F., Alpes. ♂ (orn.)
 à fleurs brunes. Autriche. ♂
 en lyre. Sibérie. ☉
 d'Afrique. F. m. ☉
 à fleurs laches. Tartarie. ☉
 printanière. F. m. ☉
 de Mahon. F. m. ☉ (orn.)
 de Chio. orient. ☉
 à feuell. de lin. Esp. ♀

GIROFLÉE

jaune. F. ♂ (orn.)
 changeante. canaries, or. ♀
 fenestrelle. ♂ (orn.)
 sinuée. F. ☉
 incane. Esp. ♀
 quarantain. Eur. austr. ☉ (orn.)
 grecque. orient. ☉ (orn.)
 des rivages. F. m. ♂
 brune. F. m., or. ♀
 à trois pointes. F. m. ☉
 de farset. barbarie, or. ♀

ERYSIMUM

officinal. F. ☉ (méd.)
 à feuell. en lyre. F. ♀
 printanier. F. ♂
 alliaire. F. ♂ (méd.)
 festonné. F. ☉
 à petites fleurs. F. ☉
 à feuell. d'épervière. F. ♂
 des murailles. F. ♂
 des Alpes. F. ♀
 à long style. Sibérie. ♀

SISYMBRIUM.

1. *Siliquis declinatis levibus.*

nasturtium L.
 palustre *Pollich.* }
 terrestre *Curtis.* }
 sylvestre L.
 amphibium L.
 pyrenaicum L.
 tanacetifolium L. /
 tenuifolium L.
 hispanicum *Jacq.*

2. *Siliquis sessilibus axillaribus.*

polyceratum L.
 supinum L.
 bursifolium L.

3. *Caule nudo.*

murale L. }
 erucastrum *Couan.* }
 vimineum L.
 barbelieri L.
 repandum *Wild.* }
 mouense *All.* }
 arenosum L.

4. *Foliis pinnatis.*

sophia L.
 altissimum L.
 irio L.
 columnæ *Jacq.*
 loeselii L.
 obtusangulum *Wild.* }
 jacobæifolium *Bergeret.* }

5. *Foliis integris.*

strictissimum L.
 apetalum.

CARDAMINE.

1. *Foliis simplicibus.*

alpina *Wild.* }
 bellidifolia *All.* }
 asarifolia L.

2. *Foliis ternatis.*

resedifolia L.
 trifolia L.

CRESSON.

1. *Siliques lisses et abaissées.*

de fontaine. F. ♀ (alim., méd.)
des marais. F. ☉
sauvage. F. ☉
amphibie. F. ♀
des Pyrénées. F. ♀
à feuell. de tanaïsie. F., Alp. ♀
fausse roquette. F. ♀
d'Espagne. F. ☉

2. *Siliques sessiles axillaires.*

à siliques nombreuses. F. ☉
couché. F. ☉
à feuell. de tabouret. F. ☉

3. *Tige nue.*

des murailles. F. ☉
grêle. F. ☉
de barbelier. F. m. ☉
sinuë. F., Alpes. ♀
des sables. F., Alpes. ☉

4. *Feuilles pennées.*

sophia. F. ☉
élevé. F. ☉
irio. F. ☉
de Columna. F. ☉
de Loesel. F. ☉
à angles obtus. F., Alpes ☉

5. *Feuilles entières.*

ramassé. F., Alpes. ♀
sans pétales. ☉

CARDAMINÉ.

1. *Feuilles simples.*

des Alpes. F. ♀
à feuell. d'asarum. F., Alp. ♀

2. *Feuilles ternées.*

à feuell. de réséda. F., Alp. ♀
à feuell. ternées. F. ♀

3. *Foliis pinnatis.*

chelidonia L.
 amara L.
 impatiens L.
 hirsuta L.
 parviflora L.
 pratensis L.

DENTARIA

enneaphylla L.
 pinnata Lmk. }
 heptaphyllos Will. }
 pentaphyllos L.

II. *Siliculosæ.*

RICOTIA

ægyptiaca L.

LUNARIA

rediviva L.
 annua L.

BISCUTELLA

auriculata L.
 levigata L.
 apula L.

CLYPEOLA

jonthlaspi L.
 maritima L.
 alliacea. }
 peltaria alliacea L. }

ALYSSUM.

1. *Fruticulosa.*

spinosum L.
 saxatile L.
 alpestre L.

2. *Herbacea.*

incanum L.
 montanum L.
 calicinum L.
 campestre L.
 clypeatum L.

3. *Siliculis inflatis.*

deltoïdeum L.
 sinuatum L.
 utriculatum L.

3. Feuilles pennées.

à feuell. de chélidoine. F. ♀
 amer. F. ♀
 élastique. F. ♂
 velu. F. ⊙
 à petites fleurs. F. ⊙
 des prés. F. ♀

DENTAIRE

à 9 feuell. F., Alpes. ⊙
 pennée. F., Alpes. ♀
 à 5 feuell. F., Alpes. ♀

II. Les siliculeuses.

RICOTIA

d'Egypte. ⊙

LUNAIRE

vivace. F. ♀ (orn.)
 annuelle. F. ⊙ (orn.)

BISCUTELLA

auriculé. F. m. ⊙
 à fruit lisse. F. ⊙
 à fruit rude. F. ⊙

CLYPEOLA

jonthlaspi. F. m. ⊙
 maritime. F. m. ♂

à odeur d'ail. Autriche. ♀

ALYSSON.

1. Tiges ligneuses.

épineux. F. m. ♀
 des rochers. orient. ♀
 des Alpes. F. ♀

2. Tiges herbacées.

blanc. F. ♂
 de montagne. F., Alpes. ♀
 à petites fleurs. F. ⊙
 des champs. F. ⊙
 en bonclier. Liban. ♂

3. Silicules renflées.

deltoïde. syrie, or. ♀
 sinué. Espagne. ♂
 à utricules. orient. ♀

DRABA.

1. *Caule nudo.*

aizoïdes L.
alpina L.
verna L.
pyrenaïca L.

2. *Caule folioso.*

muralis L.
hirta L.
incana L.

COCHLEARIA

officinalis L.
danica L.
armoracia L.

draba L.
glastifolia L.

CORONOPUS

vulgaris.

SENEBIERA *dec.*

pinnatifida *dec.* }
lepidium didymum L. }

IBERIS

semperflorens L.

sempervirens L.
saxatilis L.
cinerea.
gibraltarica L.
rotundifolia *wild.*
carnosa *wild.*
amara L.
umbellata L.
pinnata L.
limifolia L.
nudicaulis L.

THLASPI

arvense L.
campestre L.
alliaceum L.
saxatile L.
montanum L.
perfoliatum L.
alpestre L.
hirtum L.

DRABA.

1. *Tige nue.*

aizoïde. F., Alpes. ♀
des Alpes. F. ♀
printanier. F. ☉
des Pyrénées. F. ♀

2. *Tige feuillue.*

des murailles. F. ☉
hérisse. F. ♀
blanc. F., Alpes. ♂

COCHLEARIA¹

officinal. F. ♂ (méd.)
de Danemarck. ♂
cran de Bretagne. F. ♀ (écon.,
méd.)
draba. F. ♀
à feuell. de pastel. F. ♂

CORNE DE CERF

commune. F. ☉

SÉNÉBIÈRA

pinnatifide. AS. ♂

IBERIS

de tous les mois. sicile, or. ♀
(orn.)
toujours verte. F., Alpes. ♀
des rochers. F., Alpes. ♀
cendrée. esp., or. ♀
de Gibraltar. esp., or. ♀
à feuell. rondes. F., Alpes. ♀
à feuell. charmes. F., pyr. ♀
omère. F. ☉ (orn.)
ombellifère. esp. ☉ (orn.)
pennée. F. m. ☉
à feuell. de lin. F. m. ♂
à tige nue. F. ☉

THLASPI

à grandes siliques. F. ☉
pubescent. F. ♂
alliace. F. ☉
des rochers. F. ♂
de montagne. F., Alpes. ♀
perfolié. F., Alpes. ♂
alpestre. F. ☉
velu. F. m. ♂

ceratocarpon *L.f.*hursa pastoris *L.*

sativum.

lepidium sativum *L.* }

— latifolium.

— crispum.

nudicaule.

lepidium nudicaule *L.* }

rudérale.

lepidium rudérale *L.* }

LEPIDIUM

perfoliatum *L.*subulatum *L.*procumbens *L.*alpinum *L.*petraeum *L.*latifolium *L.*iberis *L.*cardamines *L.*vesicarium *L.*

ANASTATICA

hierochuntica *L.*

VELIA

pseudocytisus *L.*annua *L.*

MYAGRUM

perenne *L.*orientale *L.*rugosum *L.*perfoliatum *L.*sativum *L.*paniculatum *L.*saxatile *L.*

BUNIAS

spinosa *L.*erucago *L.*egyptiaca *L.*balearica *L.*orientalis *L.*

KAKILE

maritima.

CRAMBEE

maritima *L.*tatarica *L.*

à fruit cornu. sibérie. ☉

bourse à berger. *F.* ☉cresson alénois. ☉ (écon.,
méd.)

— à larges feuell.

— crépu.

à tige nue. *F.* ☉sans pétales. *F.* ☉

LÉPIDIUM

perfolié. orient. ☉

en aléne. *Esp.* ♀couché. *F.* ☉des Alpes. *F.* ♀des rochers. *F.* ☉passe-rage. *F.* ♀ (écon.)ibérus. *F.* ♀à feuell. lyrées. *Esp.* ♂

vésiculeux. orient. ☉

ANASTATICA

rose de Jériko. *Af. s.* ☉

VELIA

faux cityse. orient., or. ♀

annuel. barbare. ☉

CAMELINE

vivace. *Allem.* ♀

d'orient. ☉

ridée. *F. m.* ☉amplexicaule. *F.* ☉cultivée. *F.* ☉ (écon.)paniculée. *F.* ☉des rochers. *F.*, Alpes. ♀

BUNIAS

épineux. égypte. ♂

tétragone. *F. m.* ☉

d'Égypte. ☉

de Mahon. ☉

d'orient. ♀

KAKILÉ

maritime. *F.* ☉

CRAMBÉ

maritime. *F.* ♀ (écon.)

de Tartarie. ♀

orientalis L.
hispanica L.
filiformis Jacq.
strigosa L'Her.

d'orient. ♀
d'Espagne. ☉
filiforme. ♀
des Canaries. or. ♀

ISATIS

tinctoria L.
lusitanica L.

PASTEL

des teinturiers. f. ♂ (arts.)
de Portugal. ☉

ORDO IV.**CAPPARIDES.****CLEOME**

gigantea L.
pentaphylla L.
spinosa L.
dodecandra L.
icosandra L.
arabica L.
viscosa L.
ornithopodioides L.

CLÉOMÉ

gigantesque. guinée, s. ch. ♀
à 5 feuell. inde. ☉
épineux. am. m. ☉
à 12 étamines. inde. ☉
à 20 étamines. ceylan. ☉
d'Arabie. égypte. ☉
visqueux. ceylan. ☉
pié-d'oiseau. orient. ☉

CAPPARIS

spinosa L.
longifolia Swartz.
saligna Vahl.

CAPRIER

cultivé. f. m. ♀ (écon.)
à longues feuell. am. m., s. ch. ♀
à feuell. de saule. am. m.,
 s. ch. ♀
tortueux. Antilles, s. ch. ♀
feuillu. Antilles, s. ch. ♀

RESEDA

luteola L.
glauca L.
sesamoïdes L.
alba L.
undata L.
lutea L.
phyteuma L.
odorata L.
canescens L.

RÉSÉDA

gaude. f. ♂
glauque. f., pyrénées. ♂
sésamoïde. f. ☉
blanc. Espagne. ☉
à 3 styles. Espagne. ♀
jaune. f. ♀
à grand calice. f. ☉
odorant. Barbarie. ☉ (orn.)
velu. orient. ♀

DROSERA

rotundifolia L.
longifolia L.

ROSSOLIS

à feuell. rondes. f. ☉
à feuell. longues. f. ☉

PARNASSIA

palustris L.

PARNASSIA

des marais. f. ♀

ORDO V.

S A P I N D I.

CARDIOSPERMUM
halicacabum L.

PAULLINIA
pinnata L.

SERJANIA
triterната. }
paullinia polyphylla L. }

KOELREUTERIA
paullinioides l'her. }
paniculata Lmk. }

SAPINDUS
saponaria L.
rigidus H. K.
indica.

ALLOPHYLLUS Swartz.
racemosus Swartz.

EUPHORIA
lit-chi. }
sapindus edulis H. K. }

MELICOCCA
bijuga.

CUPANIA
glabra Swartz.

ORDO VI.

A C E R A.

ÆSCULUS
hypocastanum L.

flava H. K.
pavia L.
macrostachia Mich.

ACER
negundo L.
pensylvanicum L. }
striatum Lmk. }

ORDRE V.

LES SAVONNIERS.

CARDIOSPERME
pois de merveille. Am. m. ☉

PAULLINIA
à feuell. pennées. Am. m.,
s. ch. ☿

SERJANIA
triterné. Am. m., s. ch. ☿

KOELREUTÉRIA
paniculé. Pérou. ☿ (orn.)

SAVONNIER
commun. inde., s. ch. ☿
à feuell. roides. Am. m., s. ch. ☿
des Indes. s. ch. ☿

ALLOPHYLLUS
à grappes. Am. m., s. ch. ☿

EUPHORIA
lit-chi. chine, s. ch. ☿ (alim.)

MELICOCCA
à 4 feuell. Am. m., s. ch. ☿

CUPANIA
glabre. Am. m., s. ch. ☿

ORDRE VI.

LES É R A B L E S.

ÆSCULUS
maronnier d'Inde. Asie. ☿
(orn.)
jaune. Am. s. ☿ (orn.)
pavia rouge. Am. s. ☿ (orn.)
nain. Am. s. ☿ (orn.)

ERABLE
à feuell. de frêne. Am. s. ☿ (orn.)
jaspé. Am. s. ☿ (orn.)

montanum *H. K.* }
 spicatum *Lmk.* }
 tataricum *L.*
 rubrum *L.*
 coccineum *H. K.* }
 tomentosum. }
 saccharinum *L.*
 platanoides *L.*
 — laciniosum.
 pseudo-platanus *L.*
 campestre *L.*
 opahis *L.*
 opulifolium *Vill.*
 monspesulanum *L.*
 creticum *L.*

HYPOCRATEA
 volubilis *L.*

ORDO VII.

MALPIGHIÆ.

BANISTERIA
 laurifolia *L.*

 tomentosa.
 periplocæfolia.

TRIOPTERIS
 jamaïcensis *L.*

MALPIGHIA
 glabra *L.*
 puniceifolia *L.*

myrtifolia.

urens *L.*
 nitida *L.*
 macrophylla.
 coccigera *L.*

aquifolia *L.*

TRIGONIA
 villosa *Aublet.*

ERYTHROXYLUM
 hypericifolium *Lmk.*

de montagne. *Am. s. h*

de Tartarie. *h* (orn.)

rouge. *Am. s. h* (orn.)

écarlate. *Am. s. h* (orn.)

à sucre. *Am. s. h* (écon.)

plane. *F. h*

— lacinie.

sicomore. *F. h*

champêtre. *F. h*

opale. *F., Alpes. h*

à feuil. d'obier. *F., Alpes. h*

de Montpellier. *h* (orn.)

de Crète. *h*

HYPOCRATEA

sarmenteux. *Am. m., s. ch. h*

ORDRE VII.

LES MALPIGHIES.

BANISTERIA
 à feuil. de laurier. *Am. m.,*
s. ch. h
 cotonneux. *Am. m., s. ch. h*
 à feuil. de periploca. *Am. m.,*
s. ch. h

TRIOPTÉRIS
 de la Jamaïque. *s. ch. h*

MALPIGHIA
 glabre. *Am. m., s. ch. h*
 à feuil. de grenadier. *Am. m.,*
s. ch. h
 à feuil. de myrte. *Am. m.,*
s. ch. h
 brillant. *Am. m., s. ch. h*
 luisant. *Am. m., s. ch. h*
 à larges feuil. *Am. m., s. ch. h*
 à feuil. de kermès. *Am. m.,*
s. ch. h
 à feuil. de houx. *Am. m., s. ch. h*

TRIGONIA
 velu. cayenne, *s. ch. h*

ERYTHROXYLUM
 à feuil. de millepertuis. *île*
de F., s. ch. h

ORDO VIII.

HYPERICA.

HYPERICUM.

1. *Trigyna.*

ægyptiacum L.
scabrum L.
coris L.
nummularium L.

pulchrum L.
tomentosum L.
clodes L.
crispum L.
humifusum L.
montanum L.
hirsutum L.
perforatum L.
quadrangulare L.
delphinense vill. }
dubium smith. }
canariense L.
androsæmum L.
hircinum L.
elatum Desrouss.
triplinerve vent.
prolificum L.
dolabriforme vent.
heterophyllum vent.

2. *Styli* 5.

richeri vill. }
sinbriatum Desrouss. }
amplexicaule Desrouss.
calycinum L.
clunense L.
balearicum L.

ORDO IX.

GUTTIFERÆ.

CLUSIA

rosea L.

MAMMEA

americana L.

ORDRE VIII.

LES MILLEPERTUIS.

MILLEPERTUIS.

1. 3 styles.

d'Égypte. or. 5
rude. orient. 5
verticillé. F., Alpes. 5
à feuell. de nummulaire. F.,
 Alpes. 7
élégant. F. 7
cotonneux. F. m., or. 7
des marais. F. 7
crépu. Barbarie. 7
couché. F. ☉.
de montagne. F. 7
velu. F. 7
officinal. F. 7 (méd.)
tétragone. F. 7
du Dauphiné. F., Alpes. 7
des Canaries. or. 5 (orn.)
androsème. F. 5 (méd.)
fétide. orient. 5
élevé. 5
à 3 nervures. Am. s. 7
prolifique. Am. s. 5 (orn.)
en doloire. Am. s. 7
à feuell. variables. perse, or. 5

2. 5 styles.

de Richer. F., Alpes. 7
amplexicaule. 7
à grand calice. orient. 5 (orn.)
de Chine. or. 5 (orn.)
de Mahon. 5

ORDRE IX.

LES GUTTIERS.

CLUSIA

rose. Am. m., s. ch. 5

MAMMÉA

abricot de St. - Domingue.
 s. ch. 5 (alim.)

ORDO X.

AURANTIA.

I. *Fructus monospermus.*BALANITES *Delisle.*

ægyptiaca. }
 xymentia ægyptiaca L. }

FISSILIA

psittacorum.

II. *Fructus polyspermus baccatus.*

MURRAYA

sinica L.

CITRUS

medica L.

— acida.
 — cedra.
 — tuberosa.
 — balotina.
 — limon.
 — florentina.
 aurantium L.

— olyssiponense.
 — violaceum.
 — multiflorum.
 — lunatum.
 — maximum.
 — bergamium.
 decumana L.
 sinense.
 trifolia L.

LIMONIA

trifoliata L.

III. *Fructus polyspermus capsularis.*

TERNSTROMIA

elliptica *swartz.*

THEA

bohea L.
 — viridis.

CAMELLIA

japonica L.

ORDRE X.

LES ORANGERS.

I. Fruit monosperme.

BALANITE

d'Egypte. s. ch. ♪

FISSILIA

bois de perroquet. île de F.,
 s. ch. ♪

II. Une baie polysperme.

MURRAYA

buis de Chine. s. ch. ♪ (orn.)

CITRONNIER

commun. inde, or. ♪ (écon.,
 méd.)

— aigre.
 — cédra.
 — poncire.
 — balotin.
 — lime-douce.
 — de Florence.
 oranger. asic, or. ♪ (écon.,
 méd.)
 — de Portugal.
 — violet.
 — riche-deponille.
 — turc.
 — chadec.
 — bergamotte.
 pampelmonsc. inde, or. ♪
 de Chine. or. ♪
 à fenill. ternées. japon, or. ♪

LIMONIA

à fenill. ternées. inde, s. ch. ♪

III. Une capsule polysperme.

TERNSTROMIA

elliptique. am. m., s. ch. ♪

THÉ

bon. chine, or. ♪ (écon., méd.)
 — vert.

CAMELLIA

du Japon. or. ♪ (orn.)

ORDO XI.

MELIÆ.

I. *Folia simplicia.*

WINTERANIA
canella L.f.

AYTONIA
capensis L.f.

II. *Folia composita.*

PORTESIA *cav.*
ovata *cav.*

TRICHILIA
spondioides Jacq.

GUAREA
trichilioïdes L.

MELIA
azedarach L.

SWIETENIA
mahogoni L.

CEDRELA
odorata L.

ORDO XII.

VITES.

CISSUS
orientalis.
acida L.
quadrangularis L.
sicyoides L.
antarcticus *vent.*
quinquefolia.
hederacca *wild.*
hedera quinquefolia L. }

VITIS
vinifera L.
laciniosa L.

ORDRE XI.

LES AZÉDARACS.

I. Feuilles simples.

WINTÉRANIA
cannelle blanche. Am.m., s.ch.
h (méd.)

AYTONIA
du Cap. or. h

II. Feuilles composées.

PORTÈSIA
à feüll. ovales. Am.m., s.ch. h

TRICHILIA
à feüll. de monbin. Am. m.,
s. ch. h

GUAREA
faux trichilia. Am.m., s.ch. h

MÉLIA
azédarac. inde, or. h (orn.)

SWIÉTÉNIA
mahogoni, acajon à meubles.
Am.m., s.ch. h (arts.)

CÈDRELA
odorant, acajon à planches.
Am.m., s.ch. h (arts.)

ORDRE XII.

LES VIGNES.

CISSUS
d'orient. perse, or. h
acide. Am. m., s. ch. h
quadrangulaire. inde, s.ch. h
à feüll. dentées. Am.m., s.ch. h
antarctique. N. Holl., or. h

vigne vierge. Am. s. h

VIGNE
cultivée. Asie. h (écon.)
laciniée. h (écon.)

vulpina L.
 labrusca L.
 cordifolia Mich.
 virginiana.
 rubra Mich. Herb. }
 arborea L.

de renard. Am. s. h
 cotonneuse. Am. s. h
 à feuell. en cœur. Am. s. h
 de Virginie. Am. s. h
 à feuell. de persil. Am. m.,
 s. ch. h

ORDO XIII.

GERANIA.

GERANIUM.

1. *Staminibus 7 antheriferis.* (Pelargonia.)

fulgidum L.
 inquinans L.
 — roseum.
 hybridum L.
 flabellatum.
 zonale L.
 — variegatum.
 acetosum L.
 glaucum L. f. }
 lanceolatum Cav. }
 canum. }
 tomentosum Andr. }
 peltatum L.
 grandiflorum Andr.

cortusæfolium Jacq. non l'Her.

hamatum Jacq. }
 eclinatum Curtis. }
 tetragonum L.
 reniforme Andr.
 papilionaceum L.
 inodorum.
 cotyledonis L.

vitifolium L.
 angulosum H. K. }
 acerifolium Cav. }
 beaufortianum.
 cucullatum L.
 ribifolium Jacq.
 tomentosum Jacq.
 rigidum Willd.

ORDRE XIII.

LES GÉRANIUM.

GÉRANIUM.

1. 7 étamines fertiles. (Les Pélargonium.)

couleur de feu. cap, or. h (orn.)
 écarlate. cap, or. h (orn.)
 — rose.
 hybride. cap, or. h (orn.)
 en éventail. cap, or. h
 à zones. cap, or. h (orn.)
 — panaché.
 acide. cap, or. h

lancéolè. cap, or. h

à feuell. blanches. cap, or. h

en bouclier. cap, or. h

à grandes fleurs. cap, or. h
 (orn.)

à feuell. de cortusa. cap, or. h
 (orn.)

à crochets. cap, or. h (orn.)

tétragone. cap, or. h (orn.)

reniforme. cap, or. h

papilionacé. cap, or. h (orn.)

inodore. n. noll., or. h

à feuell. de cotylédon. cap, or.
 h

à feuell. de vigne. cap, or. h

anguleux. cap, or. h (orn.)

de Beaufort. cap, or. h (orn.)

capuchon. cap, or. h (orn.)

à feuell. de grosciller. cap, or. h

drapé. cap, or. h

à feuell. dures. cap, or. h

<i>cordifolium</i> <i>cap.</i> }	<i>à feuell. en cœur.</i> cap, or. 5
<i>cordatum</i> <i>H. K.</i> }	(orn.)
<i>violarium</i> <i>Jacq.</i>	<i>à fleurs de pensée.</i> cap, or. 5
	(orn.)
<i>ovale</i> <i>l'Her.</i>	<i>ovale.</i> cap, or. 5
<i>betulinum</i> <i>L.</i>	<i>à feuell. de bouleau.</i> cap, or. 5
— <i>incisum.</i>	— <i>incisé.</i>
<i>formosissimum.</i>	<i>élégant.</i> cap, or. 5 (orn.)
<i>capitatum</i> <i>L.</i>	<i>à fleurs en tête.</i> cap, or. 5
	(orn.)
<i>viscosum</i> <i>cap.</i> }	<i>visqueux.</i> cap, or. 5
<i>glutinosum</i> <i>l'Her.</i> }	— <i>lacinié.</i>
— <i>laciniatum.</i>	<i>à feuell. de chêne.</i> cap, or. 5
<i>quercifolium</i> <i>L.</i>	(orn.)
<i>terebinthinaceum</i> <i>cap.</i> }	<i>térébinthinacé.</i> cap, or. 5
<i>graveolens</i> <i>l'Her.</i> }	<i>radula.</i> cap, or. 5 (orn.)
<i>radula</i> <i>cap.</i>	<i>rude.</i> cap, or. 5
<i>scabrum</i> <i>L.</i>	<i>à 5 pointes.</i> cap, or. 5
<i>tricuspidatum</i> <i>l'Her.</i>	<i>de deux couleurs.</i> cap, or. 5
<i>bicolor</i> <i>Jacq.</i>	(orn.)
<i>quinquevulnerum</i> <i>Andr.</i>	<i>à 5 taches.</i> cap, or. 5 (orn.)
<i>carnosum</i> <i>L.</i>	<i>charnu.</i> cap, or. 5
<i>gibbosum</i> <i>L.</i>	<i>gibbeux.</i> cap, or. 5
<i>ceratophyllum</i> <i>l'Her.</i>	<i>à feuell. cornues.</i> cap, or. 5
<i>exstipulatum</i> <i>cap.</i>	<i>sans stipules.</i> cap, or. 5
<i>crispum</i> <i>L.</i>	<i>crépu.</i> cap, or. 5
<i>hermanniæfolium</i> <i>L. f.</i> }	<i>trilobé.</i> cap, or. 5
<i>ternatum</i> <i>L. f.</i>	<i>trifide.</i> cap, or. 5
<i>trifidum</i> <i>Jacq.</i>	<i>adulterin.</i> cap, or. 5
<i>adulterinum</i> <i>l'Her.</i>	<i>incisé.</i> cap, or. 5
<i>incisum</i> <i>Andr.</i>	<i>suave.</i> cap, or. 5
<i>suaveolens.</i>	<i>à longs pédoncules.</i> cap, or. 5
<i>tabulare</i> <i>L.</i> }	<i>à feuell. d'alchimille.</i> cap, or. 5
<i>elongatum</i> <i>cap.</i> }	5
<i>alchimilloïdes</i> <i>L.</i>	<i>odorant.</i> cap, or. 5
<i>odoratissimum</i> <i>L.</i>	<i>à feuell. d'astragale.</i> cap, or. 5
<i>astragalifolium</i> <i>Jacq.</i> }	5
<i>pinatum</i> <i>H. K.</i> }	<i>à tiges nombreuses.</i> cap, or. 5
<i>multicaule</i> <i>Jacq.</i>	<i>à feuell. de betoine.</i> cap, or. 5
<i>betonicum</i> <i>cap.</i>	<i>à feuell. de coriandre.</i> cap, or. 5
<i>coriandrifolium</i> <i>L.</i>	5
<i>myrrhisfolium</i> <i>L.</i>	<i>à feuell. de myrrhis.</i> cap, or. 5
<i>lacerum</i> <i>Jacq.</i>	<i>lacéré.</i> cap, or. 5
<i>grossularioides</i> <i>L.</i>	<i>filiforme.</i> cap, or. 5

carneum Jacq.
 lobatum L.
 triste L.
 daucifolium Cav. }
 flavum Burm. }

2. *Staminibus 5 antheriferis.* (Erodia.)

alpinum Burm.
 petraeum Conan.
 cicutarium L.
 romanum L.
 moschatum L.
 hirtum Forsk.
 laciniatum Cav.
 maritimum L.
 malacoïdes L.
 glaucophyllum L.
 ciconium L.
 gruinum L.
 geifolium Desf. }
 hymenodes l'Her. }
 trifolium Cav. }
 pusillum L.
 chamædrioides Cav. }
 reichardi Murr. }

3. *Staminibus 10 antheriferis.* (Gerania.)

pyrenaïcum L.
 tuberosum L.
 • macrorrhizum L.
 anemonefolium l'Her. }
 palmatum Cav. }
 phæum L.
 roscum l'Her. mss.
 reflexum L.
 lividum l'Her.
 nodosum L.
 striatum L.
 aconitifolium l'Her.
 sylvaticum L.
 maculatum L.
 pratense L.
 varium l'Her. }
 cineraceum Lapeyr. }
 incanum L.
 argenteum L.
 robertianum L.
 lucidum L.

à petites fleurs. cap, or. ψ
 lobe. cap, or. ψ
 à fleurs brunes. cap, or. ψ (orn.)
 à feuil. de carotte. cap, or. ψ
 (orn.)

2. 5 étamines fertiles. (Les Erodium.)

des Alpes. ital. ψ
 des rochers. F., pyrénées. ψ
 à feuil. de ciguë. F. ⊙
 romain. F. ⊙
 musqué. F. ⊙
 pubescent. Égypte, or. ψ
 lacinié. barbarie. ⊙
 maritime. F. ⊙
 malacoïde. F. m. ⊙
 glauque. Égypte. ⊙
 bec de cigogne. F. ⊙
 bec de grue. F. ⊙
 à feuil. de bénoite. barbarie,
 or. ♂ (orn.)
 petit. F. ⊙
 à feuil. de chamædris. corse,
 or. ψ

3. 10 étamines fertiles. (Les Géranium.)

des Pyrénées. F. ⊙
 tubéreux. ital. ψ
 à grosse racine. ital. ψ
 à feuil. d'anémone. madère,
 or. ψ
 brun. F., Alpes. ψ
 rose. F., Alpes. ψ
 réfléchi. F., Alpes. ψ
 livide. F., Alpes. ψ
 noueux. F., Alpes. ψ
 réticulé. ital. ψ (orn.)
 à feuil. d'aconit. F., Alpes. ψ
 des bois. F., Alpes. ψ
 tacheté. Am. s. ψ
 des prés. F. ψ
 cendré. F., pyrénées. ψ
 incane. cap, or. ψ
 argenté. F. m. ψ
 herbe à Robert. F. ♂
 luisant. F. ⊙

bohemicum L.
divaricatum Wild.
carolinianum L. }
lanuginosum Jacq. }
molle L.
columbinum L.
dissectum L.
rotundifolium L.
sibiricum L.
sanguineum L.

de Bohême. ☉
étalé. Hongrie. ☉
de Caroline. ☉
à feuell. molles. F. ☉
colombin. F. ☉
découpé. F. ☉
à feuell. rondes. F. ☉
de Sibérie. ☉
sanguin. F. ☿

MONSONIA

speciosa L. f.

Genera geraniis affinia.

MONSONIA

élégant. cap, or. ☿

Genres qui ont de l'affinité avec les
Géranium.

TROPÆOLUM

majus L.
 — *multiplex.*
minus L.

CAPUCINE

cultivée. pérou. ☉ (orn., écon.)
 — *à fleurs doubles.* s.ch. ☿
à petites fleurs. pérou. ☉

IMPATIENS

balsamina L.
noli me tangere L.

BALSAMINE

des jardins. inde. ☉ (orn.)
des bois. F. ☉

OXALIS.

1. *Foliis ternatis, scapo unifloro.*
acetosella L.
purpurea Jacq.

1. Feuilles ternées, hampe à une fleur.
des bois. F. ☿ (écon., méd.)
pourpre. cap, or. ☿

2. *Foliis ternatis, scapo multifloro.*
violacea L.
cernua Jacq.

2. Feuilles ternées, hampe à plusieurs
fleurs.
violet. Am. s. ☿
incliné. cap, or. ☿

3. *Foliis ternatis, pedunculis unifloris,*
caule inferne nudo.
versicolor L.

3. Feuilles ternées, pédoncules à une fleur,
tige nue inférieurement.
bigarré. cap, or. ☿

4. *Foliis ternatis, pedunculis unifloris,*
caule folioso.
incarnata L.

4. Feuilles ternées, pédoncules à une fleur,
tige toute feuillue.
incarnat. cap, or. ☿

5. *Foliis ternatis, pedunculis multifloris,*
caule folioso.
corniculata L.
stricta Jacq.

5. Feuilles ternées, pédoncules à plusieurs
fleurs, tige feuillue.
cornu. F. ☿
serré. Am. s. ☿

ORDO XIV.

ORDRE XIV.

MALVACEÆ.

LES MALVACÉES.

I. *Stamina in tubum corolliferum connata indefinita fructus multicapsularis, capsulæ capitata.*

I. Étamines indéfinies, réunies en un tube adhérent à la corolle, plusieurs capsules réunies en tête.

PALAVA *Cav.*

PALAVA

malvifolia Cav.
malope parviflora L'her. }

à feuell. de mauve. Pérou. ☉

MALOPE

MALOPÉ

malacoides L.
trifida Cav.

à feuell. ovales. Barbarie. ♂
à 5 lobes. Afr. s. ☉

KITAIBELIA *Wild.*

KITAIBELIA

vitifolia Wild.

à feuell. de vigne. Hongrie. ♀

II. *Stamina in tubum corolliferum connata indefinita, fructus multicapsularis, capsula in orbem disposita aut in unam coalita.*

II. Étamines indéfinies réunies en un tube adhérent à la corolle, plusieurs capsules disposées circulairement ou réunies en une seule.

MALVA.

MAUVE.

1. *Foliis indivisis.*

1. Feuilles non-lobées.

spicata L.
polystachia Cav.
scoparia Cav. et L'her. non Jacq.
scabra Cav.
americana L.
angustifolia Cav.

à épis. Am. m., s. ch. ♀
à plusieurs épis. Pérou, s. ch. ♀
à balais. Pérou, s. ch. ♀
ronde. Pérou, s. ch. ♀
d'Amérique. Am. m. ☉
à feuell. étroites. Mex., s. ch. ♀

2. *Foliis angulatis.*

2. Feuilles anguleuses.

asperima Jacq.
miniata Cav.
fragrans Cav.
capensis Cav.
virgata Cav.
abutiloïdes L.

rapeuse. cap, or. ♀
rouge. s. ch. ♀ (orn.)
odorante. cap, or. ♀
du Cap. or. ♀
effilée. cap, or. ♀ (orn.)
à feuell. d'abutilon. Am. m., s. ch. ♀
du Pérou. ☉
de Lima. ☉
de Caroline. ☉
de Shérard. Italie, or. ♂
à petites fleurs. Barbarie. ☉
verticillée. Chine. ☉
à petit fruit. Égypte. ☉
à feuell. rondes. F. ♀ (méd.)
sauvage. F. ♂ (méd.)
crépue. Orient. ☉
alcée. F. ♀

peruviana L.
linensis L.
caroliniana L.
sherardiana L.
parviflora L.
verticillata L.
microcarpa.
rotundifolia L.
sylvestris L.
crispa L.
alcea L.

moschata L.

ægyptia L.

musquée. F. ♀

d'Égypte. ☉

LAVATERA.

1. Caule fruticoso.

arborea L.

micans L.

olbia L.

pseudo-olbia.

unguiculata.

triloba L.

lusitanica L.

maritima *Coman.*

2. Caule herbaceo.

punctata *All.*

cretica L.

thuringiaca L.

trimestris L.

ALTHEA et ALCEA L.

rosea L.

— sinensis.

ficifolia L.

pallida *Wald.*

officinalis L.

narbonensis *Cav.*

cannabina L.

ludwigii L.

hirsuta L.

MALACHRA

capitata L.

alceaefolia *Jacq.*

triloba.

PAVONIA *Cav.*urens *Cav.*typhalea *Cav.*cuneifolia *Cav.*hibiscus præmorsus L. *f.* }spiniflex *Cav.*

hibiscus spiniflex L. }

— aristata.

zeylanica.

hibiscus zeylanicus L. }

URENA

lobata L.

sinuata L.

LAVATERA.

1. Tige ligneuse.

en arbre. ital. or. ♀*brillant.* esp. or. ♀*olbia.* F. m., or. ♀*faux olbia.* or. ♀*onguiculé.* or. ♀*à 3 lobes.* F. m., or. ♀*de Portugal.* or. ♀*maritime.* F. m., or. ♀

2. Tige herbacée.

punctué. nice. ☉*de Crète.* ☉*du Tyrol.* ☉*à opercule.* F. m. ☉

ALTHEA

rose trémière. chine. ♂ (orn.)— *de Chine.**à feuil. de figuier.* sibérie. ♂
(orn.)*à fleurs pâles.* Hongrie. ♂*officinal.* F. ♀ (méd.)*de Narbonne.* F. m. ♀*à feuil. de chanvre.* F. m. ♀*de Ludwig.* sicile. ☉*velu.* F. ☉

MALACHRA

à fleurs en tête. Am. m. ☉*à feuil. d'alcea.* Am. m. ☉*à 3 lobes.* ☉

PAVONIA

piquant. île de F., s. ch. ♀*à 3 pointes.* Am. m., s. ch. ♀*cunéiforme.* cap, or. ♀*épineux.* Am. m., s. ch. ♀— *à longues arêtes.**de Ceylan.* ☉

URENA

à feuil. lobées. Am. m., s. ch. ♀*à feuil. sinuées.* Am. m., s. ch. ♀

NAPÆA

scabra L. }
 sida dioïca *cav.* }
 levis L. }
 sida napæa *cav.* }

SIDA

spinosa L.
 frutescens *cav.*
 carpinifolia L.

rhombifolia L.
 alnifolia L.
 unilocularis *l'Her.*
 retusa L.
 viscosa L.
 angustifolia *cav.*

umbellata L.
 triquetra L.
 virgata *cav.*
 periplocifolia L.

nutans *l'Her.*
 fragrans *l'Her.*
 ricinoides *l'Her.* }
 palmata *cav.* }
 nudiflora *l'Her.* }
 stellata *cav.* }
 crassifolia *l'Her.*

mollissima *cav.*
 arborea L. *f.* }
 peruviana *cav.* }
 reflexa *cav.* }
 retrorsa *l'Her.* }
 tiliaefolia.

gigantea *Jacq.*
 palmata *cav.* }
 jatrophioides *l'Her.* }
 abutilon L.
 indica L.
 occidentalis L.
 asiatica L.
 crispa L.
 hirta *cav.* }
 pilosa *l'Her.* }
 mollis *ortega.*

NAPÆA

rude. am. s. ♀

lisse. am. s. ♀

SIDA

épineux. am. m. ☉
arbrisseau. am. m., s. ch. ♀
à feuell. de charme. canaries,
 or. ♀

rhomboïdal. inde, s. ch. ♀
à feuell. d'aune. inde. ☉
à une loge. île de F. ☉
émoussé. inde. ☉
visquieux. am. m., s. ch. ♀
à feuell. étroites. île de Bourbon,
 s. ch. ♀

ombellifère. am. m. ☉
triangulaire. am. m., s. ch. ♀
effilé. pérou, s. ch. ♀
à feuell. de periploca. am. m.,
 s. ch. ♀
à fleurs penchées. pér., s. ch. ♀
odorant. am. m., s. ch. ♀

à feuell. de ricin. pérou. ☉

à fleurs nues. am. m., s. ch. ♀
à feuell. épaisses. am. m.,
 s. ch. ♀

velouté. pérou, s. ch. ♀
en arbre. pérou, s. ch. ♀

réfléchi. pérou, s. ch. ♀

à feuell. de tilleul. am. m.,
 s. ch. ♀

gigantesque. am. m., s. ch. ♀

à feuell. palmées. pérou. ☉

abutilon. suisse. ☉

des Indes. s. ch. ♀

d'occident. am. m. ☉

d'Asie. inde. ☉

crépu. caroline. ☉

hérissé. inde. ☉

à feuell. molles. pérou, s. ch. ♀

*mauritiana l'Her.**triloba Jacq.**hastata L.**anoda hastata Cav. }* *parviflora. }* *anoda parviflora Cav. }* *de l'Ile-de-France. s. ch. ♀**à 5 lobes. cap, or. ♀**à fenill. hastées. mexique. ☉**à petites fleurs. mexique. ☉*

III. *Stamina in tubum corolliferum connata
indefinita, fructus simplex multilocu-
laris.*

III. Etamines indéfinies réunies en un tube
adhérent à la corolle, une capsule à plu-
sieurs loges.

HIBISCUS*solandra l'Her.**solandra lobata Murray. }* *palustris L.**moschentos L.**speciosus H. K.**pentacarpus L.**populneus L.**tiliaceus L.**mutabilis L.**rosa-sinensis L.**phoeniceus L. f.**syriacus L.**ficulneus L.**manihot L.**flabellatus.**cannabinus L.**digitatus.**abelmoschus L.**esculentus L.**sabdariffa L.**tubulosus Cav.**vitifolius L.**trionum L.***HIBISCUS***à 5 lobes. île de Bourbon. ☉**des marais. Am. s. ♀ (orn.)**moscheutos. Am. s. ♀ (orn.)**lacinié. Am. s. ♀ (orn.)**à 5 fruits. Italie. ♀**à fenill. de peuplier. inde, s. ch. ♀**à fenill. de tilleul. inde, s. ch. ♀**à fleurs changeantes. inde, s. ch. ♀**rose de Chine. s. ch. ♀ (orn.)**rose. inde, s. ch. ♀**mauve en arbre. orient. ♀ (orn.)**à fenill. de figuier. ceylan, s. ch. ♀**à grandes fleurs. inde, s. ch. ♀**en éventail. N. Holl., s. ch. ♀**à fenill. de chanvre. inde. ☉**digité. s. ch. ♀**abelmosc. inde, s. ch. ♀**comestible. inde. ☉ (écon.)**oscille de Guinée. inde. ☉**tubulé. inde. ☉**à fenill. de vigne. inde, s. ch. ♀**vésiculeux. Italie. ☉***MALVAVISCUS** *Cav.**arborescens Cav.**achania malvaviscus H. K. }* **MALVAVISCUS***en arbre. Am. m., s. ch. ♀***LAGUNEA***squamea Vent.**hibiscus patersonii Andr. }* **LAGUNEA***écailleux. N. Holl., or. ♀***REDUTEA** *Vent.**heterophylla Vent.***REDUTEA***à fenill. variables. Am. m., s. ch. ♂*

GOSSYPIMUM

- herbaceum L.
 micranthum Cav.
 arboreum L.
 hirsutum L.
 vitifolium Link.
 purpurascens.

IV. *Stamina basi in urceolum sessilem connata, omnia fertilia, definita aut indefinita.*

MELOCHIA

- pyramidata L.
 corchorifolia L.
 mollissima.
 tomentosa L.

STUARTIA

- malachodendron L.
 pentagyna L.

GORDONIA

- lasianthus L.
 pubescens Link.

BOMBAX

- ceiba L.

ADANSONIA

- digitata L.

V. *Stamina basi in urceolum sessilem connata, sterilia fertilibus intermixta, definita aut indefinita.*

PENTAPETES

- phoenicea L.

THEOBROMA

- cacao L. }
 cacao sativa Link. }

AMBROMA Jacq. (*Theobroma* L.)

- fastuosa Jacq. }
 ambroma angusta L.f. }

GUAZUMA Juss. (*Theobroma* L.)

- ulmifolia. }
 theobroma guazuma L. }
 bubroma guazuma Willd. }

DOMBEYA Cav.

- ferruginea Cav.

COTONNIER

- de Malthe. syrie, or. ♀ (écon.)
 à petites fleurs. perse, s. ch. ♀
 en arbre. inde, s. ch. ♀
 velu. Am. m., s. ch. ♀
 à feuill. de rigne. inde, s. ch. ♀
 pourpre. Am. m., s. ch. ♀

IV. Étamines toutes fertiles, définies ou indéfinies, filets réunis à la base en un corps cylindrique sessile et évasé.

MÉLOCHIA

- pyramidal. Brésil, s. ch. ♀
 à feuill. de corète. inde. ☉
 velouté. Am. m., s. ch. ♀
 cotonneux. Am. m., s. ch. ♀

STUARTIA

- à 1 style. caroline, or. ♀
 à 5 styles. virginie. ♀

GORDONIA

- à feuill. glabres. carol., or. ♀
 pubescent. caroline, or. ♀

FROMAGER

- Ceiba. Am. m., s. ch. ♀

BAOBAB

- digité, pain de singe. Afr. m.,
 s. ch. ♀

V. Étamines définies ou indéfinies, les unes stériles, les autres fertiles; filets réunis à la base en un cylindre sessile et évasé.

PENTAPÉTÈS

- écarlate. inde. ☉

CACAO

- cultivé. Am. m., s. ch. ♀ (écon.)

AMBROMA

- à larges feuill. inde, s. ch. ♀

GUAZUMA

- à feuill. d'orme. Am. m., s. ch. ♀

DOMBEYA

- ferrugineux. île de F., s. ch. ♀

BYTTNERIA

ovata *Lmk.*

VI. *Stamina basi in urceolum germini arcte circumpositum et cum ipso stipitatum connata, plerumque definita et fertilia.*

AYENIA

pasilla *L.*

HELICTERES

isora *L.*

jamaïcensis *Lmk.* }

STERCULIA

balanghas *L.*

platanifolia *L.*

fœtida *L.*

ORDO XV.

MAGNOLIÆ.

ILICIAM

floridanum *L.*

parviflorum *vent.*

MAGNOLIA

grandiflora *L.*

glauca *L.*

acuminata *L.*

tripetala *L.* }

unibreila *Lmk.* }

macrophylla *Mich.*

auriculata *Mich.*

purpurea *curtis.* }

obovata *Thunb.* }

discolor *vent.* }

pumila *Andr.*

LIRIODENDRON

tulipifera *L.*

Genera magnoliis affinia.

DILLENIA

scandens *Willd.*

OCHNA

nitida *L.*

BYTTNERIA

à feuell. ovales. pérou, s. ch. ♀

VI. Étamines ordinairement définies et fertiles, filets réunis à la base autour de l'ovaire en un cylindre porté sur un pédicelle.

AYENIA

petit. am. m., s. ch. ♂

HELICTERÈS

isora. am. m., s. ch. ♀

STERCULIA

balanghas. inde, s. ch. ♀

à feuell. de platane. chine,
or. ♀

fétide. inde, s. ch. ♀

ORDRE XV.

LES MAGNOLIERS.

BADIANE

de la Floride. or. ♀ (écon.)

à petites fleurs. floride, or. ♀

MAGNOLIA

à grandes fleurs. floride, or.
♀ (orn.)

glauque. virginie. ♀ (orn.)

à feuell. aiguës. am. s. ♀ (orn.)

ombrelle. am. s. ♀ (orn.)

à grandes feuell. am. s. ♀ (orn.)

auriculé. caroline. ♀ (orn.)

pourpre. chine, s. ch. ♀ (orn.)

petit. chine, s. ch. ♀ (orn.)

TULAPIER

de Virginie. ♀ (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les
Magnoliers.

DILLENIA

sarmenteux. n. holl., or. ♀

OCHNA

à feuell. luisantes. am. m.,
s. ch. ♀

ORDO XVI.

ANONÆ.

ANONA

squamosa L.

muricata L.

cherimolia Miller. }
tripetala H. K. }

glabra L.

reticulata L.

triloba L.

ORDO XVII.

MENISPERMA.

CISSAMPELOS

pareira L.

MENISPERMUM

canadense L.

virginicum L.

carolinianum L.

ORDO XVIII.

BERBERIDES.

BERBERIS

vulgaris L.

— rubra.

— violacea.

— canadensis.

cretica L.

sibirica Pallas.

sinensis.

EPIMEDIUM

alpinum L.

HAMAMELIS

virginiana L.

ORDRE XVI.

LES ANONES.

ANONE

écailleuse , pomme canelle.
inde, s. ch. ♀ (alim.)hérissée , cachiman. Am. m.,
s. ch. ♀ (alim.)cherimolia. Pérou , s. ch. ♀
(alim.)

glabre. Am. m., s. ch. ♀

cœur de bœuf. Am. m., s. ch. ♀

à 5 lobes , assiminier. Am. s. ♀

ORDRE XVII.

LES MÉNISPERMES.

CISSAMPELOS

pareira-brava. Am. m., s. ch. ♀
(méd.)

MÉNISPERME

de Canada. ♀

de Virginie. ♀

de Caroline. ♀

ORDRE XVIII.

LES VINETTIERS.

BERBÉRIS

épine-vinette. f. ♀ (écon., méd.)

— à fruit rouge.

— à fruit violet.

— de Canada.

de Crète. ♀

de Sibérie. ♀

de Chine. ♀

ÉPIMÉDIUM

des Alpes. f. ♀

HAMAMELIS

de Virginie. Am. s. ♀

ORDO XIX.

TILIACEÆ.

I. *Stamina basi monadelpha definita.*

WALTHERIA

- americana L. }
 arborescens Cav. }
 indica Jacq. }

HERMANNIA

- denudata L. f.
 hyssopifolia L.
 lavandulifolia L.
 althæifolia L.
 cuneifolia L.
 alnifolia L.
 micans Schrad. }
 latifolia Jacq. }
 scabra Cav.
 multiflora Jacq.

MAHERNIA

- pinnata L.
 glabrata L. f.

II. *Stamina distincta, plerumque indefinita, fructus multilocularis.*

CORCHORUS

- hirsutus L.
 siliculosus L.
 trilocularis L.
 olitorius L.
 hirtus Jacq. an Lin.
 æstuans L.
 tridens L.

HELIOCARPUS

- americanus L.

TRIUMFETTA

- lappula L.

FLACURTIA l'Her.

- ramontchi l'Her.

GREWIA

- nitida Juss.
 orientalis L.
 occidentalis L.

ORDRE XIX.

LES TILLEULS.

I. *Étamines définies, filets réunis à la base.*

WALTHÉRIA

- d'Amérique. s. ch. h

HERMANNIA

- lisse. cap, or. h
 à feuell. d'hysope. cap, or. h
 à feuell. de lavande. cap, or. h
 à feuell. d'althéa. cap, or. h
 cunéiforme. cap, or. h
 à feuell. d'aune. cap, or. h
 à feuell. brillantes. cap, or. h
 rude. cap, or. h
 à fleurs nombr. cap, or. h

MAHERNIA

- à feuell. pennées. cap, or. h
 lisse. cap, or. h

II. *Étamines distinctes, ordinairement indéfinies, fruit à plusieurs loges.*

CORCHORUS

- velu. Am. m., s. ch. h
 siliqueux. Am. m., s. ch. h
 à 3 loges. indc. ☉
 cultivé. Afr. ☉ (alim.)
 hérissé. Am. m. ☉
 à 6 pointes. Am. m. ☉
 à 3 pointes. inde. ☉

HÉLIOCARPUS

- d'Amérique. Am. m., s. ch. h

TRIUMFETTA

- hérissé. Am. m., s. ch. h

FLACURTIA

- ramontchi. inde, s. ch. h

GREWIA

- luisant. chine, s. ch. h
 d'orient. inde, s. ch. h
 d'occident. cap, or. h

TILIA

sylvestris.
europæa L.
pubescens H. K.
americana L.
alba H. K.

III. *Stamina distincta indefinita, fructus unilocularis.*

BIXA

orellana L.

TILLEUL

sauvage. F. ♀ (orn., méd.)
commun. F. ♀ (orn., méd.)
pubescent. Am. s. ♀ (orn.)
d'Amérique. Am. s. ♀ (orn.)
argenté. Am. s. ♀ (orn.)

III. *Étamines distinctes indéfinies, fruit à une loge.*

ROCOU

cultivé. Am. m., s. ch. ♀ (arts.)

ORDO XX.

CISTII.

CISTUS.

1. *Corollæ albæ aut flavescentes.*

populifolius L.
laurifolius L.
ladaniferus L.
 — *maculatus.*
monspeliensis L.
salvifolius L.

2. *Corollæ roseæ.*

symphitifolius Link. }
vaginatus H. K. }
purpureus Link.
villosus L.
complicatus Link.
incanus L.
heterophyllus Desf.
albidus L.
crispus L.
creticus L.

HELIANTHEMUM (Cistus L.).

1. *Exstipulata fruticosa.*

umbellatum L.
halimifolium L.
ocymoides Link.
alyssoides Link.
calycinum L.
levipes L.
funaria L.
celandicum L.
marifolium L.

ORDRE XX.

LES CISTES.

CISTE.

1. Corolles blanches ou jaunâtres.

à feuell. de peuplier. Esp., or. ♀
à feuell. de laurier. F. m., or. ♀
ladanifère. Esp., or. ♀
 — *tacheté.*
de Montpellier. F. m., or. ♀
à feuell. de sauge. F. m., or. ♀

2. Corolles roses.

à feuell. de consoude. canaries,
 or. ♀
pourpre. orient, or. ♀
velu. Esp., or. ♀
plissé. orient, or. ♀
incane. orient, or. ♀
à feuell. diverses. Barb., or. ♀
cotonneux. F. m., or. ♀
crépu. F. m., or. ♀
de Crète. or. ♀ (méd.)

HELIANTHÈME.

1. Tiges ligneuses, point de stipules.

ombellifère. F. ♀
à feuell. d'halime. F. m., or. ♀
à feuell. de basilic. Esp., or. ♀
à feuell. d'alysson. F. ♀
à grand calice. Barb., or. ♀
glauc. F. m., or. ♀
funaria. F. ♀
d'eland. F. ♀
à feuell. de marum. F. ♀

2. *Stipulata fruticosa.*

squamatum L.
 lippii Z.
 canariense Z.
 lavandulæfolium Lmk. }
 syriacum Jacq.
 serpyllifolium Z.
 thymifolium L.
 pilosum L.
 racemosum L.
 vulgare L.
 — latifolium.
 mutabile Jacq.

3. *Exstipulata herbacea.*

guttatum L.
 canadense Z.

4. *Stipulata herbacea.*

ledifolium L.
 salicifolium L.
 niloticum L.
 ægyptiacum Z.

*Genera cistis affinia, fructu trivalvi, valvis
 seminiferis, sed definite staminifera.*

VIOLE.

1. *Acaules.*

hirta L.
 palustris L.
 odorata L.

2. *Caulescentes, stipulis indivisis.*

cenisia L.
 canina L.
 mirabilis L.
 canadensis L.
 montana L.
 biflora Z.
 verticillata Ortega.

3. *Stipulis pinnatifidis,*

tricolor L.
 — hortensis.
 rothomagensis.
 grandiflora Z.
 calcarata Z.
 cornuta L.

2. Tiges ligneuses, feuilles accompagnées
de stipules.

écailloux. Esp., or. h
 de Lippi. Égypte. ☉
 des Canaries. or. h
 à feill. de lavande. F. m., or. h
 à feill. de serpolet. F., Alp. h
 à feill. de thym. F. m., or. h
 velu. F. h
 à grappes. Esp., or. h
 commun. F. h
 — à larges feill.
 à fleurs changeantes. F. m. h

3. Tiges herbacées, point de stipules.

maculé. F. ☉
 de Canada. ☉

4. Tiges herbacées, feuilles accompagnées
de stipules.

à feill. de ledum. F. m. ☉
 à feill. de saule. F. m. ☉
 du Nil. ☉
 d'Égypte. ☉

Genres qui ont de l'affinité avec les Cistes,
 fruit à 3 valves, graines attachées aux
 valves, étamines définies.

VIOLETTE.

1. Tige nulle.

velue. F. ψ
 des marais. F. ψ
 odorante. F. ψ (orn., méd.)

2. Une tige, stipules entières.

du mont Cénis. F., Alpes. ψ
 de chien. F. ψ
 sans corolle. F. ψ
 de Canada. ψ
 de montagne. F., Alpes. ψ
 à 2 fleurs. F., Alpes. ψ
 verticillée. Mexique. ☉

3. Stipules pinnatifides.

tricolor. F. ☉
 — pensée. (orn.)
 de Ronen. F. ψ
 à grandes fleurs. F., pyrén. ψ
 à long éperon. F., Alpes. ψ
 cornue. F., pyrénées. ψ

ORDO XXI.

RUTÆ.

I. *Folia stipulacea sæpius opposita.*

TRIBULUS

terrestris L.

cistoides L.

FAGONIA

cretica L.

ZYGOPHYLLUM

fabago L.

morgsana L.

album L.

GUAIAACUM

sanctum L.

II. *Folia sæpius alterna nuda.*

BORONIA *smith.*

pinnata smith.

CORREA *Andr.* (*Mazeutoxeron* Bill.)

alba Andr.

CROVEA *Andr.*

saligna Andr.

RUTA

sylvestris Mill.

legitima Jacq.

montana H. K.

graveolens L.

chalepensis L.

linifolia L.

PEGANUM

harmala L.

DICTAMNUS

albus L.

Genera rutis affinia.

MELIANTHUS

major L.

minor L.

comosus Vahl.

ORDRE XXI.

LES RUES.

I. Feuilles ordinairement opposées ,
accompagnées de stipules.

TRIBULUS

hérissé. F. ☉

à fleurs de ciste. Am. m. ☉

FAGONIA

de Crète. orient, s. ch. ♂

FABAGELLE

commune. orient. ♀

membranuse. cap, or. ♀

à fleurs blanches. barb., or. ☉

GAIAC

commun. Am. m., s. ch. ♀

(méd, arts.)

II. Feuilles ordinairement alternes et sans
stipules.

BORONIA

à feuilles pennées. N. holl.,

or. ♀

CORRÈA

à fleurs blanches. N. holl., or. ♀

CROVÈA

à feuell. de saule. N. holl., or. ♀

RUE

sauvage. barbarie, or. ♀

puante. F. m. ♀ (méd.)

ciliée. Arabie, or. ♀

à feuell. de lin. esp., or. ♀

PÈGANUM

harmala. barbarie. ♀

FRAXINÈLLE

cultivée. F. m. ♀ (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les Rues.

MÉLIANTE

à larges feuell. cap., or. ♀

à feuell. étroites. cap, or. ♀

velu. cap, or. ♀

DIOSMA

rubra L.
ericoides L.

ciliata L.
hirsuta L.

DIOSMA

rouge. cap, or. h (orn.)
à feüill. de bruyère. cap, or. h
(orn.)
cilié. cap, or. h (orn.)
velu. cap, or. h (orn.)

ORDO XXII.

ORDRE XXII.

CARYOPHYLLÉE.

LES CARYOPHYLLÉES.

I. *Calix partitus, stamina 3, stylus 1 aut*
sæpius 3.

I. Calice partagé, 3 étamines, 1 à 3 styles.

ORTEGIA

hispanica L.

ORTÉGIA

d'Espagne. ☉

HOLOSTEUM

umbellatum L.

HOLOSTÉUM

ombellifère. F. ☉

POLYCARPON

tetraphyllum L.

POLYCARPON

à 4 feüill. F. ☉

MOLLUGO

verticillata L.

MOLLUGO

verticillé. Am. s. ☉

MINUARTIA

campestris L.

dichotoma L.

MINUARTIA

des chaups. esp. ☉

dichotome. esp. ☉

POLYCARPEA Link.

teneriffæ Link.

POLYCARPEA

de Ténériffe. ☉

QUERIA

canadensis L.

QUÉRIA

de Canada. ☉

II. *Calix partitus, stamina 4, styli 2*
aut 4.

II. Calice partagé, 4 étamines, 2 ou 4 styles.

BUFONIA

tenuifolia L.

BUFONIA

à feüill. menues. F. ☉

SAGINA

procumbens L.

erecta L.

cerastioides Smith.

SAGINA

couché. F. ☉

droit. F. ☉

à feüill. de cérastium. F. ☉

III. *Calix partitus, stamina 5 ad 8,*
styli 2, 3 aut 4.

III. Calice partagé, 5 à 8 étamines,
2, 3 ou 4 styles.

ALSINE

media L.

segetalis L.

mucronata L.

MORGELINE

des oiseaux. F. ☉

des moissons. F. ☉

pointue. F. ☉

PHARNACEUM

cerviana L.

PHARNACEUM

filiforme. esp. ☉

MOERHINGIA

muscosa L.

ELATINE

hydropiper L.

alsinastrum L.

IV. Calix partitus, stamina 10, styli 3
aut 5.

SPERGULA

nodosa L.

arvensis L.

pentandra L.

saginoïdes L.

CERASTIUM.

1. Capsulis oblongis.

perfoliatum L.

vulgatum L. }

viscosum curtis. }

semidecandrum L.

viscosum L. }

vulgatum curtis. }

dichotomum L.

arvense L.

alpinum L.

2. Capsulis subrotundis.

latifolium L.

tomentosum L.

aquaticum L.

CHERLERIA

sedoides L.

ARENARIA

peploïdes L.

tetraquetra L.

biflora L.

trinervis L.

spatulata Desf.

ciliata L.

serpyllifolia L.

balcarica l'Her.

montana L.

rubra L.

media L.

dianthoides Smith.

cucubaloïdes Smith.

saxatilis L.

striata L.

MOERHINGIA

tonffu. F., Alpes. ♀

ÉLATINÉ

à fenill. de serpolet. F. ☉

verticillé. F. ☉

IV. Calice partagé, 10 étamines,
3 à 5 styles.

ESPARGOUTTE

noueuse. F. ♀

des champs. F. ☉

à 5 étamines. F. ☉

à fenill. de sagina. F. ♀

CÉRASTIUM.

1. Capsules oblongues.

perfoliè. orient. ☉

commun. F. ☉

à 5 étamines. F. ☉

visqueux. F. ♀

dichotome. Esp. ☉

des champs. F. ♀

des Alpes. F. ♀

2. Capsules presque rondes.

à larges fenill. F., Alpes. ♀

cotonneux. F. ♀

aquatique. F. ♀

CHERLERIA

sèdoïde. F., Alpes. ♀

ARÉNARIA

à fenill. de peplis. F. ♀

tétragone. F. m. ♀

à 2 fleurs. F., Alpes. ♀

à 5 nervures. F. ☉

en spatule. barbaric ☉

ciliè. F., Alpes. ♀

à fenill. de serpolet. F. ☉

de Mahon. ♀

de Montagne. F. ♀

à fleurs rouges. F. ☉

membraneux. F. ☉

à fenill. d'œillet. orient. ♀

à fleurs de bœhen. orient. ♀

des rochers. F. ♀

striè. F. ♀

verna L.
tenuifolia L.
fasciculata L.
triflora L.

printanier. F. ♀
à feuell. menues. F. ☉
fasciculé. F. ☉
à 3 fleurs. F. ♀

STELLARIA

hemorum L.
holostea L.
graminea L.
uliginosa curtis. }
alsine wild. }

STELLULAIRE

des bois. F. ♀
des haies. F. ♀
à feuell. de gramen. F. ♀
des marais. F. ☉

V. *Calix tubulosus*, *stamina* 10, *styli* 2, 3
aut 5.

V. Calice en tube, 10 étamines, 2, 3 ou
 5 styles.

GYPSOPHILA

repens L.
viscosa murray.
paniculata L.
 — *grandiflora*.
altissima L.
strutium L.
fastigiata Lmk. an *lin*?
perfoliata L.
muralis L.
saxifraga L.

GYPSOPHILA

rampant. F., Alpes. ♀
visqueux. orient. ☉
paniculé. sibérie. ♀
 — *à grandes fleurs*.
élevé. sibérie. ♀
strutium. esp., or. ♂
corymbifère. suisse. ♀
perfolié. esp. ♀
des murailles. F. ♂
caliculé. F. ♀

SAPONARIA

officinalis L.
vaccaria L.
ocymoides L.
lutea L.
orientalis L.
porrigens L.

SAPONAIRE

officinale. F. ♀ (méd., écon.)
anguleuse. F. ☉
à feuell. de basilic. F. ♀
jaune. F., Alpes. ♀
d'orient. ☉
à longs pédoncules. orient. ☉

DIANTHUS.

1. *Flores aggregati*.

barbatus L.
carthusianorum L.
armeria L.
prolifer L.
atrorubens All.
ferrugineus L.
collinus Wald.

OELLILET.

1. *Fleurs rapprochées*.

de poète. F. ♂ (orn.)
à 5 nervures. F. ♀
velu. F. ☉
prolifère. F. ☉
brun-pourpre. F., Alpes. ♂
rouillé. ital. ♂
des collines. hongrie. ♀

2. *Flores solitarii plures in eodem caule*.

corymbosus.
caryophyllus L.
 — *ruber*.
moschatus Mayer.

2. *Plusieurs fleurs solitaires sur la même
 tige*.

corymbifère. ♀ (orn.)
des jardins. F. ♀ (orn.)
 — *ratatut*.
mignardise. ♀ (orn.)

plumarius L.
 superbus L.
 chinensis L.
 deltoides L.
 attenuatus *smith.*
 leptopetalus *Marschal.*

3. *Caule subunifloro herbaceo.*

alpinus L.

4. *Caule fruticoso.*

arboreus L.
 fruticosus L.

plume. F., Alpes. ♀ (orn.)
 superbe. F., Alpes. ♀ (orn.)
 de Chine. ☉ (orn.)
 deltoïde. F. ♀
 aminci. F. m. ♀
 à pétales linéaires. Russie. ♀

3. Tige herbacée ordinairement à une fleur.

des Alpes. F. ♀

4. Tige ligneuse.

à feuil. épaisses. orient, or. ♂
 à feuil. aiguës. orient, or. ♂

SILENE.

1. *Floribus solitariis lateralibus.*

Insitanica L.
 quinquevulnera L.
 cerastioides L.
 gallica L.
 tridentata *Desf.*
 nocturna L.
 sericea *All.*

2. *Floribus lateralibus confertis.*

arenaria *Desf.*
 nutans L.
 amara L.
 paradoxa L.
 fruticosa L.
 huplevroides L.
 gigantea L.
 viridiflora L.

3. *Floribus ex dichotomia caulis.*

sedoides *Desf.*
 conoïdea L.
 conica L.
 behen L.
 noctiflora L.
 maritima *Hild.*
 antirrhina L.
 inaperta L.
 polyphylla L.
 portensis L.
 apetala *Wald.*
 cretica L.
 muscipula L.
 rubella L.

SILÉNÉ.

1. Fleurs solitaires latérales.

de Portugal. ☉
 à 5 taches. F. ☉
 échancré. F. ☉
 non-denté. F. ☉
 à 5 dents. F. m. ☉
 nocturne. F. m. ☉
 soyeux. F. m. ☉

2. Fleurs latérales ramassées.

des sables. barbarie. ☉
 à fleurs penchées. F. ♀
 à fleurs ternées. tartarie. ♀
 odorant. Italie. ♀
 arbrisseau. Sicile, or. ♂
 à feuil. de huplèvre. orient. ♀
 gigantesque. Afr., or. ♂
 à fleurs vertes. F., Alpes. ♂

3. Fleurs dans les bifurcations des tiges.

à feuil. de sedum. barbar. ☉
 à gros fruit. F. ☉
 conique. F. ☉
 faux behen. orient. ☉
 noctiflore. Suisse. ☉
 maritime. F. ♀
 à feuil. de linair. Am. s. ☉
 fermé. Eur. Austr. ☉
 fasciculé. Allemagne. ☉
 paniculé. Portugal. ☉
 apétale. ☉
 de Crète. ☉
 gobbe-mouche. F. m. ☉
 incarnat. orient. ☉

bipartita Desf.
stricta L.

4. *Floribus terminalibus.*

chloræfolia Smith.
picta.

armeria L.

atocion L. }
orchidea L. f. }

rupestris L.

alpestris Jacq.

saxifraga L.

vallesia L.

acaulis L.

à fleurs roses. arb. ☉ (orn.)

à fleurs serrées. f. m. ☉

4 Fleurs terminales.

à feuell. de chlora. orient, or. ♀

à réseau.

à bouquets. f. ☉ (orn.)

atocion. orient. ☉

des rochers. f., Alpes. ♂

à 4 dents. f. ♀

saxifrage. f., Alpes. ♀

du Valais. f., Alpes ♀

sans tige. f., Alpes. ♀

CUCUBALUS

stellatus L.

bacciferus L.

behen L.

— *alpinus.*

— *angustifolius.*

roseus.

fabarius Wild.

tataricus L.

sibiricus L.

multiflorus Wild.

cæspitosus.

viscosus L.

catholicus L.

otites L.

BÉHEN

étoilé. am. s. ♀

baccifère. f. ♀

commun. f. ♀

— *des Alpes.*

— *à feuell. étroites.*

à fleurs roses.

dichotome. sicile. ♀

de Tartarie. ♀

de Sibérie. ♀

à fleurs nombreuses. hongr. ♀

touffu. ♀

visqueux. italic. ♂

de Rome. ♀

dioïque. f. ♀

LYCHNIS

grandiflora Jacq. }

coronata Thunb. }

chalcedonica L.

flos-cuculi L.

viscaria L.

alpina L.

dioïca L.

— *rubra.*

LYCHNIS

à grandes fleurs. japon, or. ♀
(orn.)

croix de Jérusalem. russic. ♀
(orn.)

des prés. f. ♀

visqueux. f. ♀

des Alpes. f. ♂

dioïque. f. ♀

— *rouge.*

GITHAGO

segetum.

agrostema githago L. }

GITHAGO

nielle des blès. f. ☉

AGROSTEMA

coronaria L.

flos-jovis L.

cœli-rosa L.

AGROSTÉMA

coquelourde. f. ♂ (orn.)

rose. f., Alpes. ♀ (orn.)

maritime. f. m. ☉ (orn.)

VI. *Calix tubulosus , stamina pauciora quam 10 , styli 2 aut 3.*

VELEZIA
rigida L.

SAROTHTA
gentianoïdes L.

Genera caryophylleis affinia.

FRANKENIA
levis L.
pulverulenta L.
hirsuta L.

LINUM.

1. *Floribus cæruleis , albis aut rubentibus.*

usitatissimum L.

perenne L.
narbonense L.
tenuifolium L.
alpinum L.
catharticum L.
radiola L.

2. *Floribus luteis.*

gallicum L.
strictum L.
suffruticosum L.
maritimum L.
campanulatum L.

VI. Calice en tube, moins de 10 étamines ,
2 ou 3 styles.

VELEZIA
à feuell. roides. esp. ☉

SAROTHTA
filiforme. am. s. ☉

Genres qui ont de l'affinité avec les
Caryophyllées.

FRANKENIA
lisse. F. m. ♀
pulvérulent. F. m. ☉
velu. orient.

LIN.

1. Fleurs bleues , blanches ou rouges.

cultivé. eur. austr. ☉ (écon.,
méd.)

vivace. sibérie. ♀ (écon.)

de Narbonne. ♀

à feuell. menues. F. ♀

des Alpes. F. ☉

cathartique. F. ☉ (méd.)

radiola. F. ☉

2. Fleurs jaunes.

à petites fleurs. F. ☉

rude. F. m. ♂

sous-arbrisseau. esp., or. ♂

maritime. F. ♀

campanulé. F. m., or. ♀

CLASSIS XIV.

CLASSE XIV.

DICOTYLEDONES

DICOTYLEDONS

POLYPETALÆ.

POLYPÉTALES.

(Stamina perigyna.)

(Étamines attachées au calice.)

ORDO I.

ORDRE I.

SEMPERVIVÆ.

LES JOUBARBES.

TILLÆA
muscosa L.

TILLÆA
nain. F. ☉

BULLIARDA *dec.**vaillantii dec.**tillæ aquatica Lmk.**tillæ vaillantii wild.***CRASSULA.**1. *Herbaceæ.**glomerata L.**ciliata L.**acutifolia Lmk.**rubens L. f.**sedum rubens L.**orbicularis L.**lycopodioides Lmk.**muscosa Thunb.*2. *Fruticosa.**coccinea L.**scabra L.**perfoliata L.**perfossa Lmk.**tetragona L.**obvallata L.**cultrata L.**falcata dec.**portulacea Lmk.**obliqua H. K.**lucida Lmk.**spathulata Thunb.**cordata L. f.**lactea H. K.**cotyledon Jacq.***COTYLEDON***orbiculata L.**hemisphærica L.**ungulata Lmk.**tuberculosa Lmk.**hispida Lmk.**viscosa Vahl.**hispanica L.**umbilicus L.**lutea H. K.**lusitanica Lmk.**cymosa dec.***KALANKOE** *Adans.**laciniata dec.**cotyledon laciniata L.**spathulata dec.***BULLIARDA***de Vaillant. F. ☉***CRASSULE.**1. *Tiges herbacées.**agglomérée. cap. ☉**ciliée. cap, or. ☿**à feuil. aiguës. cap, or. ☿**rouge. F. ☉**orbiculaire. cap, or. ☿**lycopode. cap, or. ☿*2. *Tiges ligneuses.**écarlate. cap, or. ♀ (orn.)**rude. cap, or. ♀**perfoliée. cap, or. ♀**enfilée. cap, or. ♀**tétragone. cap, or. ♀**à feuil. serrées. cap, or. ♀**tranchante. cap, or. ♀**falciforme. cap, or. ♀**à feuil. de pourpier. cap, or. ♀**luisante. cap, or. ♀**en cœur. cap, or. ♀**blanche. cap, or. ♀**cotylédon. cap, or. ♀***COTYLÉDON***orbiculaire. cap, or. ♀**hémisphérique. cap, or. ♀**ongulé. cap, or. ♀**tuberculeux. cap, or. ♀**hispide. barbarie. ☉**d'Espagne. ☉**nombril de Vénus. F. ☿**jaune. Portugal, or. ☿**corymbifère. ☿***KALANKOÉ***lacinié. inde, s. ch. ♀**en spatule. chine, or. ♀*

egyptiaca Dec. }
cotyledon aegyptiaca Lmk. }
crenata Dec. }
vercia crenata Andr. }
cotyledon crenata Vent. }

d'Égypte. s. ch. ♀

crênelé. cap, or. ♀

SEDUM.

1. Planifolia.

rhodiola. }
rhodiola rosea L. }
telephium L.
 — *purpureum.*
 — *maximum.*
anacampseros L.
 — *longifolium.*
aizoon L.
stellatum L.
hybridum L.
populifolium L.
cepaea L.

2. Teretifolia.

dasyphyllum L.
reflexum L.
virens H. K.
rupestre L.
altissimum Poiret. }
sempervivum sediforme Jacq. }
hispanicum L. }
rupestre Vill. }
album L.
acre L.
sexangulare L.
anglicum L. f.
villosum L.
nudum H. K.
cruciatum.

SEMPERVIVUM

arborescens L.
canariense L.
glutinosum. H. K.
tortuosum H. K.
villosum H. K.
aizoïdes Lmk.
tectorum L.
globiferum L.
hirtum L.
montanum L.

SÉDUM.

1. Feuilles planes.

odorant. F., Alpes, or. ♀
téléphium. F. ♀ (méd.)
 — *pourpre.*
 — *à larges feuil.*
anacampseros. F. ♀
 — *à feuil. longues.*
aizoon. sibérie. ♀
etoilé. F. ☉
hybride. Tartarie. ♀
à feuil. de peuplier. sibér. ♀
cepaea. F. ☉

2. Feuilles cylindriques.

à feuil. épaisses. F., Alpes. ♀
penché. F. ♀
verdoyant. Portugal. ♀
des rochers. F. ♀

élevé. Eur. ♀

d'Espagne. or. ♀

blanc. F. ☉

vermiculaire. F. ♀

hexagone. F. ♀

d'Angleterre. ♀

velu. F. ☉

à tige nue. canaries, or. ♀

à feuil. en croix. ♀

JOUBARBE

en arbre. barbarie, or. ♀
des Canaries. or. ♀
glutineuse. canaries, or. ♀
tortueuse. canaries, or. ♀
velue. canaries, or. ♀
aizoïde. canaries, or. ♀
des toits. F. ♀ (méd.)
à globules. F. ♀
hérissée. suisse. ♀
de montagne. F., Alpes. ♀

arachnoïdeum L.
monanthos H. K.

PENTHORUM

sedoïdes L.

ORDO II.

SAXIFRAGÆ.

I. *Fructus superus, capsularis birostris.*

HEUCHERA

americana L.

SAXIFRAGA.

1. *Foliis integris, caule subnudo.*

longifolia Lapeyr.

cotyledon L.
pensylvanica L.
burseriana L.
androsacea L.
stellaris L.
umbrosa L.
hirsuta L.
geum L.
cuneifolia L.
crassifolia L.

punctata L.
sarmentosa L. f.

2. *Foliis indivisis, caule folioso.*

rotundifolia L.
oppositifolia L.
aizoïdes Willd. }
autumnalis æder. }
aspera L.

3. *Foliis lobatis.*

granulata L.
geranioides L.
tridactylites L.
cespitosa L.
hypnoides L.
furcata Lapeyr.

toile d'araignée. F., Alp. ☞
à une fleur. canaries, or. ☞

PENTHORUM

à grappes. Am. s. ☞

ORDRE II.

LES SAXIFRAGES.

I. Ovaire supère, une capsule à deux pointes.

HEUCHERA

d'Amérique. Am. s. ☞

SAXIFRAGE.

1. Feuilles entières, tiges presque nues.

à longues feuell. F., pyrén. ☞
(orn.)
cotylèdon. F., Alpes. ☞
de Pensylvanie. ☞
à une fleur. F., Alpes. ☞
androsacée. F., Alp. ☞
étoilée. F., Alpes. ☞
ombreuse. F., Alpes. ☞
velue. F., Alpes. ☞
géum. F., Alpes. ☞
cunéiforme. F., Alpes. ☞
à feuell. épaisses. sibérie. ☞
(orn.)
ponctuée. sibérie. ☞
sarmenteuse. japon. ☞

2. Feuilles entières, tige feuillue.

à feuell. rondes. F., Alpes. ☞
à feuell. opposées. F., Alpes. ☞
aïzoïde. F., Alpes. ☞
rude. F., Alpes. ☞

3. Feuilles lobées.

grenue. F. ☞
à feuell. de géranium. F., py-
rénées. ☞
à 5 pointes. F. ☉
touffue. F., Alpes. ☞
hypnoïde. F., Alp. ☞
fourchue. F., pyrénées. ☞

decipiens Ehr. }
palmata Smith. }

palmée. F., pyrénées. ψ

TIARELLA

cordifolia L.
biternata Vent.

TIARELLE

à feüill. en cœur. Am. s. ψ
biternée. Am. s. ψ

MITELLA

diphylla L.
nuda L.

MITELLA

à 2 feüill. Am. s. ψ
à tige nue. Asie. ψ

II. *Fructus inferus, capsularis aut baccatus.*

II. Ovaire infère, une capsule ou une baie.

CHRYSOSPLENIUM

oppositifolium L.
alternifolium L.

CHRYSOSPLÉNium

à feüill. opposées. F. ψ
à feüill. alternes. F. ψ

ADOXA

moschatellina L.

ADOXA

moschatelle. F. ψ

HYDRANGEA

arborescens L.
nivea Mich. }
radiata Wild. }

HYDRANGEA

en arbre. Am. s. h
cotonneux. Am. s. h

ORDO III.

C A C T I.

I. *Petala et stamina definita.*

RIBES.

1. *Inermia.*

rubrum L.
— album.
petræum Jacq.
nigrum L.
prostratum l'Her. }
glandulosum H. K. }
pensylvanicum Lmk. }
floridum l'Her. }
alpinum L.

2. *Aculeata.*

cynosbati L.
diacantha Pallas.
orientale.
grossularia L.
uvacrispa L.
— rubra.

ORDRE III.

LES CIERGES.

I. Pétales et étamines définies.

GROSEILLIER.

1. Tiges sans épines.

rouge. F. h (écon., méd.)
— blanc.
des rochers. F., Alpes. h
cassis. F. h (écon., méd.)
couché. Am. s. h
de Pensylvanie. h
des Alpes. F. h

2. Tiges garnies d'aiguillons.

cynosbati. Am. s. h
à 2 aiguillons. Russie. h
du Liban. h
épineux. F. h
à maquereau. F. h (écon.)
— rouge.

II. *Petala et stamina indefinita.*

CACTUS.

1. *Opuntia, caule plano.**Opuntia* L.— *ficus-indica.*— *tuna.*— *polyanthos.*— *nana.*— *inermis.**coccinellifer* L.*curassavicus* L.*spinosissimus* H. K.*phyllanthus* L.*pereskia* L.2. *Echino-melocacti subrotundi.**mammillaris* L.*melocactus* L.3. *Erecti cylindrici.**cylindricus* Lmk.*heptagonus* L.*tetragonus* L.*peruvianus* L.*royeni* L.4. *Repentes.**grandiflorus* L.*flagelliformis* L.*parasiticus* L.*triangularis* L.*prismaticus.*

ORDO IV.

PORTULACÆÆ.

I. *Fructus unilocularis.*

PORTULACA

pilosa L.*oleracea* L.

TALINUM

anacampseros Willd. }*portulaca anacampseros* L. }*patens* Willd.*reflexum* Cav.

II. Pétales et étamines indéfinies.

CIERGE.

1. Les opuntia, tiges applaties.

Opuntia Afr., s. ch. ♪ (écon.)— *figue d'Inde.* Am. m., s. ch.— *tuna.*— *à fleurs nombreuses.*— *petit.*— *sans épines.**à cochenille.* Am. m., s. ch. ♪*de Curaçao.* s. ch. ♪*très-épineux.* Am. m., s. ch. ♪*scolopendre.* Am. m., s. ch. ♪*Pereskia.* Am. m., s. ch. ♪

2. Mélocactes hérissés, presque ronds.

mamelonné. Am. m., s. ch. ♪*mélocacte.* Am. m., s. ch. ♪

3. Tige droite cylindrique.

cylindrique. Pérou, s. ch. ♪*heptagone.* Am. m., s. ch. ♪*tétragone.* Am. m., s. ch. ♪*du Pérou.* or. ♪*lanugineux.* Am. m., s. ch. ♪

4. Tige rampante.

à grandes fleurs. Am. m.,

s. ch. ♪

serpentin. Am. m., or. ♪*parasite.* Am. m., s. ch. ♪*triangulaire.* Am. m., s. ch. ♪*prismatique.* Am. m., s. ch. ♪

ORDRE IV.

LES PORTULACÉES.

I. Fruit à une loge.

POURPIER

velu. Am. m. ☉*cultivé.* F. ☉ (alim., méd.)

TALINUM

anacampseros. cap, or. ♪*paniculé.* Am. m., s. ch. ♪*jaune.* Am. m., s. ch. ♪

trichotomum *Dec.*
fruticosum *Willd.*

TURNERA
cistoïdes *L.*

MONTIA
fontana *L.*

TAMARIX
gallica *L.*
germanica *L.*

TELEPHIUM
iniperati *L.*

CORRIGIOLA
littoralis *L.*

SCLERANTHUS
annuus *L.*
perennis *L.*

II. Fructus multilocularis.

TRIANTHEMA
monogyna *L.*

CLAYTONIA
virginica *L.*

PORTULACARIA
afra *Jacq.*
claytonia portulacaria *L.* }

ORDO V.

F I C O I D E Æ.

REAUMURIA
vermiculata *L.*

NITRARIA
scoberi *L.*
tridentata *Desf.*

SESUVIUM
portulacastrum *L.*
revolutifolium *Ortega.*

AIZOON
canariense *L.*
hispanicum *L.*

GLINUS
lotoïdes *L.*

trichotome. s. ch. ♀
ligneux. Am. m., s. ch. ♀

TURNERA
à fleurs de ciste. Am. m. ☉

MONTIA
aquatique. F. ☉

TAMARIX
de France. ♀ (orn.)
d'Allemagne. ♀ (orn.)

TÉLÉPHIUM
d'impérati. F. ♀

CORRIGIOLA
des sables. F. ☉

SCLÉRANTHUS
annuel. F. ☉
vivace. F. ♀

II. Fruit à plusieurs loges.

TRIANTHÉMA
monogyne. Am. m. ☉

CLAYTONIA
de Virginie. ♀

PORTULACARIA
d'Afrique. cap, or. ♀

ORDRE V.

LES FICOIDES.

REAUMURIA
à feuil. de sédum. barb., or. ♀

NITRARIA
à feuil. entières. russie, or. ♀
à 5 dents. barbarie, or. ♀

SÈSUVIUM
à feuil. de pourpier. inde. ♂
roulé. cuba. ♂

AIZOON
des Canaries. ☉
d'Espagne. ☉

GLINUS
lotoïde. esp. ☉

MESEMBRYANTHEMUM.

FICOIDE.

1. Foliis planis.

cristallinum L.
linguiforme L.
tortuosum L.
expansum L.
pinnatifidum L. f.
cordifolium L. f.
cuneifolium Jacq. }
limpidum H. K. }
helianthoides H. K.

2. Foliis subtus convexis.

ciliatum H. K.
geniculiflorum L.
noctiflorum L.
pallens H. K.
bicolorum L. }
coccineum Haw. }
tuberosum L.
tenuifolium L.
violaceum Dec.
stipulaceum L.
corniculatum L.
loreum L.
verruculatum L.
echinatum H. K.
viridiflorum H. K.
splendens L.
villosum L.
micans L.
rostratum L.
caninum Haw.
felinum Haw.
tigrinum Haw.
testiculatum Jacq.

3. Foliis teretibus.

nodiflorum L.
brachiatum H. K.
hispidum L.
tuberculatum Dec.
striatum Haw.
barbatum L.
stellatum Mill.
calamiforme L.

1. Feuilles planes.

cristalline. madère. ☉
linguiforme. cap, or. ☿
tortueux. cap, or. ☿
ouvert. cap, or. ♀
pinnatifide. cap. ☉
en cœur. cap, or. ♀
cunéiforme. cap. ☉
à fleur de soleil. cap. ☉

2. Feuilles convexes en dessous.

cilié. cap, or. ♀
geniculiflore. cap, or. ♀
de nuit. cap, or. ♀
pâle. cap, or. ♀
écarlate. cap, or. ♀
tubéreux. cap, or. ♀
à feuil. menues. cap, or. ♀
violet. cap, or. ♀
à stipules. cap, or. ♀
cornu. cap, or. ♀
courroie. cap, or. ♀
à feuil. lisses. cap, or. ♀
hérissé. cap, or. ♀
à fleurs vertes. cap, or. ♀
luisant. cap, or. ♀
velu. cap, or. ♀
argente. cap, or. ♀
bec-de-grue. cap, or. ☿
gueule de chien. cap, or. ☿
gueule de chat. cap, or. ☿
gueule de tigre. cap, or. ☿
bilobé. cap, or. ☿

3. Feuilles cylindriques.

nodiflore. barbarie. ☉
étale. cap, or. ♀
hispidé. cap, or. ♀
tuberculeux. cap, or. ♀
strié. cap, or. ♀
barbu. cap, or. ♀
étoilé. cap, or. ♀
doigt d'enfant. cap, or. ♀

4. *Foliis triquetris.*

falcatum L.
 reptans H. K.
 spinosum L.
 glomeratum L.
 glaucum L.
 spectabile Haw.
 aureum L.
 serratum L.
 scabrum L.
 uncinatum L.
 — minus.
 pugioniforme L.
 filamentosum L.
 acinaciforme L.
 lacerum Haw.
 deltoïdes L.
 albidum L.
 bellidiflorum L.
 dolabriforme L.

TETRAGONIA

decumbens Mill.
 echinata H. K.
 expansa Murr.
 cristallina l'Her.

O R D Œ VI.

ONAGRÆ.

I. *Stylus multiplex.*

MYRIOPHYLLUM

spicatum L.
 verticillatum L.

PROSERPINACA

palustris L.

CERCODEA

erecta Murr.
 halogaris cercodia H. K.
 halogaris alata Jacq.
 tetragonia ivafolia L.f. }

II. *Stylus 1, fructus capsularis, stamina
 petalis numero æqualia aut pauciora.*

TRAPA

natans L.

4. Feuilles triangulaires.

falciforme. cap, or. h
 rampant. cap, or. h
 épineux. cap, or. h
 aggloméré. cap, or. h
 glauque. cap, or. h
 à grandes fleurs. cap, or. h
 doré. cap, or. h
 denté. cap, or. h
 rude. cap, or. h
 à crochets. cap, or. h
 — petit.
 en poignard. cap, or. h
 filamenteux. cap, or. h
 en sabre. cap, or. h
 lacéré. cap, or. ψ
 deltoïde. cap, or. h
 blanc. cap, or. ψ
 à fl. de paquerette. cap, or. ψ
 en doloire. cap, or. h

TÉT-RAGONIA

tombant. cap, or. h
 hérissé. cap, or. ⊙
 étalé. n. zélande ⊙
 cristallin. pérou. ⊙

O R D R E VI.

LES ONAGRES.

I. Plusieurs styles.

VOLANT-D'EAU

à épis. f. ψ
 verticillé. f. ψ

PROSERPINACA

des marais. am. s. ψ

CERCODÉA

à tige droite. n. zélande, or. h

II. Un style, une capsule, étamines en
 nombre égal ou moindre que les pétales.

MACRE

flottante. f. ψ (alim.)

LOPEZIA

racemosa cav.

CIRCÆA

*lutetiana L.**alpina L.*III. *Stylus 1, fructus capsularis, stamina
petalorum dupla.*

JUSSIÆA

erecta L.

OENOTHERA.

1. *Capsulis teretibus.**biennis L.**suaveolens.**parviflora L.**muricata L.**longiflora L.**mollissima L.**nocturna Jacq.-}**albicans Lmk. }**sinuata L.*2. *Capsulis angulatis.**tetraptera Cav.**purpurea Curt.**rosea L.**pumila L.*

GAURA

*biennis L.**fruticosa Jacq.**mutabilis Cav.*

EPILOBIUM

*angustifolium Lmk. }**angustissimum H. K. }**spicatum Lmk. }**angustifolium H. K. }**hirsutum Willd.**pubescens Roth.**montanum L.**palustre L.**tetragonum L.**dodonei Will.**latifolium Fl. Dan.**alpinum L.*

LOPEZIA

à grappes. Mexique. ☉ (orn.)

CIRCÉE

*des bois. F. ♀**des Alpes. F. ♀*III. Un style, une capsule, étamines en
nombre double des pétales.

JUSSIÆA

à tige droite. Am. m. ☉

ONAGRE.

1. *Capsules cylindriques.**commune. F. ♂**odorante. Am. s. ♂**à petites fleurs. Am. s. ♂**tuberculeuse. Am. s. ♂**à longues fleurs. Buénos-Ayres,**or. ♂**veloutée. Buénos-Ayres. ☉**noctiflore. cap. ☉**sinuée. Am. s., or ♂*2. *Capsules anguleuses.**à 4 ailes. Mexique, s. ch. ♀**pourpre. Am. s. ☉**rose. Pérou, or. ♀**naine. Am. s. ♀*

GAURA

*bisannuelle. Am. s. ♂**arbrisseau. Am. m., s. ch. ♀**à fleurs changeantes. Mexiq.,**s. ch. ♀*

EPILOBIUM

*à feuil. étroites. F. ♀ (orn.)**à grappes. F. ♀ (orn.)**velu. F. ♀**pubescent. F. ♀**à feuil. ovales. F. ♂**des marais. F. ♀**tétragone. F. ♀**de Dodoens. F., Alpes. ♀**à larges feuil. F., Alpes. ♀**des Alpes. F. ♀*

IV. *Stylus 1, fractus baccatus.*

IV. Un style, une baie.

FUSCHIA

magellanica *Link.* }
 coccinea *H. K.* }
 lycioides *Andr.*

FUSCHIA

de Magellan. or. ♀ (orn.)
 à feuilles de lycium. Am.,
 s. ch. ♀

ORDO VII.

ORDRE VII.

MYRTI.

LES MYRTES.

I. Flores in foliorum axillis aut in pedunculis multifloris oppositi, folia plerumque opposita et punctata.

1. Fleurs opposées dans les aisselles des feuilles ou sur des pedoncules communs, feuilles souvent opposées et parsemées de petites glandes transparentes.

MELALEUCA

thymifolia *Smith.* }
 coronata *Andr.* }
 gnidiæfolia *Vent.* }
 hypericifolia *Smith.*

myrtifolia *Vent.*ericifolia *Andr.*styphelioides *Smith.*

diosmæfolia.

MELALEUCA

à feuell. de thym. N. Holl., or. ♀

à feuell. d'hypericum. N. Holl.,
or. ♀à feuell. de myrte. N. Holl.,
or. ♀à feuell. de bruyère. N. Holl.,
or. ♀à feuell. de styphelia. N. Holl.,
or. ♀à feuell. de diosma. N. Holl.,
or. ♀

LEPTOSPERMUM

squarrosum.

myrtifolium.

thea *Wild.*pubescens *Wild.*arachnoïdum *Smith.*juniperinum *Smith.*

LEPTOSPERMUM

rude. N. Holl., or. ♀

à feuell. de myrte. N. Holl.,
or. ♀

thea. N. Holl., or. ♀

pubescens. N. Holl., or. ♀

arachnoïde. N. Holl., or. ♀

à feuell. de genévrier. N. Holl.,
or. ♀

FABRICIA

levigata *Smith.*

FABRICIA

lisse. N. Holl., or. ♀

METROSYDEROS

saligna *Smith.*lanceolata *Smith.* }citrina *Curtis.* }linearis *Smith.*lophanta *Vent.*

— latifolia.

METROSYDEROS

à feuell. de saule. N. Holl., or. ♀

lancéolé. N. Holl., or. ♀

à feuell. linéaires. N. Holl., or. ♀

en panache. N. Holl., or. ♀

— à feuell. larges.

marginata.
pliniaefolia.

corifolia vent.
anomala vent. }
hirsuta Andr. }
connata.
angustifolia smith.
laurifolia.

EUCALYPTUS

robusta smith.
resinifera smith.
piperita smith.
obliqua l'Her.

PSIDIUM

pyriferum L.
montanum swartz.

MYRTUS

communis L.

— *boetica.*
— *romana.*
— *tarentina.*
— *belgica.*
— *mucronata.*
pimenta L.

tomentosa H. K.
horizontalis vent.

EUGENIA

umbiflora L.
jambois L.

CALYPTRANTHES swartz.

zuzygium swartz. }
myrtus zuzygium L. }

CARYOPHYLLUS

aromaticus L.

DECUMARIA

barbara L.

PUNICA

granatum L.

— *nanum.*
— *flavum.*

bordé. N. holl., or. h
à feuell. de plinia. N. holl.,
or. h
à feuell. de coris. N. holl., or. h
anomale. N. holl., or. h
à feuell. réunies. N. holl., or. h
à feuell. étroites. N. holl., or. h
à feuell. de laurier. N. holl.,
or. h

EUCALYPTUS

gigantesque. N. holl., or. h
résineux. N. holl., or. v
poivré. N. holl., or. h
oblique. N. holl., or. h

GOYAVIER

poire. inde, or. h (alim.)
de montagne. Am. m., s. ch. h

MYRTE

commun. F. m., or. h (orn.,
méd.).
— *d'Andalousie.*
— *romain.*
— *de Tarente.*
— *moyen.*
— *pointu.*
pimento, toute-épice. Am. m.,
s. ch. h (écon.)
cotonneux. chine, s. ch. h
horizontal. Am. m., s. ch. h

EUGÉNIA

à une fleur. Brésil, s. ch. h
jamrose. inde, s. ch. h (alim.)

CALYPTRANTHES

zuzygium. Am. m., s. ch. h

GIROFLIER

aromatique. Moluques, s. ch. h
(écon., méd.)

DÉCUMARIA

sarmenteux. caroline. h

GRENADIER

cultivé. Afr. s., or. h (écon.,
orn.)
— *nain.*
— *jaune.*

PHILADELPHUS
 coronarius L.
 — nanus.
 inodorus L.

SERINGAT

odorant. eur. aust. ♀ (orn.)
 — nain.
 inodore. caroline. ♀ (orn.)

ORDO VIII.

MELASTOMÆ.

MELASTOMA
 elæagnoides *Wahl.*

ORDRE VIII.

LES MÉLASTOMES.

MÉLASTOME
 à feuell. de chalef. am. m.,
 s. ch. ♀

ORDO IX.

SALICARIÆ.

I. Flores polypetali.

LAGERSTROMIA
 indica L.

LAUSONIA
 inermis L. }
 spinosa L. }

LYTHRUM
 salicaria L.
 virgatum L.
 hyssopifolia L.

CUPHEA *Jacq.*
 viscosissima *Jacq.* }
 lythrum cuphea L.f. }

II. Flores sæpe apctali.

ISNARDIA
 palustris L.

GLAUX
 maritima L.

PEPLIS
 portula L.

ORDRE IX.

LES SALICAIRES.

I. Fleurs polypétales.

LAGERSTROMIA
 des Indes. s. ch. ♀ (orn.)

HENNÉ
 d'orient. s. ch. ♀ (arts.)

SALICAIRE
 commune. F. ♀ (orn.)
 effilée. autriche. ♀ (orn.)
 à feuell. d'hysope. F. ☉

CUPHÉA
 visqueux. Brésil. ☉

II. Fleurs souvent sans pétales.

ISNARDIA
 des marais. F. ♀

GLAUX
 maritime. F. ♀

PEPLIS
 aquatique. F. ☉

ORDO X.

R O S A C E Æ.

1. *Germen simplex inferum polystylum, pomum calicino limbo umbilicatum multiloculare.*

MALUS (*Pyrus* L.)

communis.

— sylvestris.

— prasonila.

— paradisiaca.

— castanea.

— cavillea.

— apiosa.

coronaria H. K.

sempervirens. }

angustifolia H. K. }

hybrida.

baccata Z.

spectabilis H. K.

PYRUS

communis Z.

— pyrastr.

— pompeiana.

— rufescens.

— liquescens.

pollveria L.

salicifolia Z. f.

cydonia Z.

— lusitanica.

GRATÆGUS

torminalis Z.

latifolia Link.

aria Z.

— longifolia.

chamæmespylus. }

humilis Link. }

arbutifolia Link.

pyrifolia Link.

spicata Link.

racemosa Link.

amelanchier. }

rotundifolia Link. }

ORDRE X.

LES ROSACÉES.

I. Un seul ovaire infère, plusieurs styles, une pomme à plusieurs loges terminée par un ombilic couronné par le calice.

POMMIER

commun. F. h (écon.)

— sauvageon.

— de reinette.

— de paradis.

— de châtaignier.

— de Calville.

— d'apis.

odorant. Am. S. h

toujours vert. Am. S. h

hybride. h

baccifère. Sibérie. h

à bouquets. Chine. h (orn.)

POIRIER

commun. (écon.)

— sauvageon.

— bon chrétien.

— de rousselet.

— de beurré.

cotonneux. F. h

à feuil. de saule. Sibérie. h

coignassier. F. h (écon.)

— de Portugal.

ALISIER

des bois. F. (écon.)

de l'ontainebleau. F. h

allouchier. F. h

— à feuil. longues.

nain. F., Alpes. h

à feuil. d'arbousier. Am. S. h
(orn.)à feuil. de poirier. Am. S. h
(orn.)

à epis. Am. S. h (orn.)

à grappes. Am. S. h (orn.)

amélanchier. F. h (orn.)

SORELS

aucuparia L.
domestica L.
hybrida L.

MESPYLUS (*Crataegus* L.)

oxyacantha L.
 — *plena*.
 — *rubra*.
monogyna Jacq.
azarelus L.
 — *aronia*.
tanacetifolia Poiret.

tomentosa L.

corallina. }
acerifolia Poiret. }
coccinea L. }
latifolia Poiret. }
pyrifolia. }
cornifolia Poiret. }
linearis. }
prunifolia Poiret.

crus-galli L.
pyracantha L.
cotoneaster L.
germanica L.
japonica Thunb.

II. *Germina plura indefinita calice urceolari
 supra coarctato tecta, singula monostyla.*

ROSA.

I. *Fructibus subglobosis.*

berberifolia Pallas.
eglantaria L. {
lutea H. K. }
 — *punicea*.
sulphurea H. K.
spinosissima L.
scotica.
cinnamomea L.
arvensis L.
carolina L.
parviflora Willd.

SORBIER

des oiseleurs. F. h (orn.)
cormier. F. h (écon.)
de Laponie. h (orn.)

NÉFLIER

aube-épine. F. h (orn., écon.)
 — *double*. (orn.)
 — *de Mahon*. (orn.)
monogyne. F. h
azerolle. F. m. h (écon.)
 — *d'orient*. h (écon.)
à feuell. de tanaïsie. orient. h
 (orn.)
cotonneux ou *Pinchaw*. Am. s.
 h

petit corail. Am. s. h (orn.)
écarlate. Am. s. h (orn.)
à larges feuell. Am. s. h (orn.)
à feuell. de poirier. Am. s. h
 (orn.)
à feuell. étroites. Am. s. h (orn.)
à feuell. de prunier. Am. s. h
 (orn.)
pie-de-coq. Am. s. h (orn.)
buisson ardent. F. m. h (orn.)
cotoneaster. F., Alpes. h (orn.)
cultivé. F. h (écon.)
du Japon ou *bibacier*. h
 (écon.)

II Plusieurs ovaires indéfinis renfermés
 dans un calice étranglé à son sommet,
 chaque ovaire surmonté d'un style.

ROSIER.

I. Fruits presque ronds.

à une feuille. perse, or. h
églantier. Allemagne. h (orn.)
 — *ponceau*. (orn.)
jaune. orient. h (orn.)
hérissé. F. h
d'Ecosse. h
cannelle. F., Alpes. h
des champs. F. h
de Caroline. h
à petites fleurs. Am. s. h.

villosa L.

sinica L.

2. *Fructibus ovatis.*

remensis.

burgundiaca.

damascena H. K.

centifolia L.

— unguiculata.

muscosa.

maxima.

semperflorens.

turbinata H. K. }

francofurtensis. }

gallica L.

— versicolor.

bracteata *Wend.*kamtschatica *Went.*

alba L.

collina *Murr.*

rubiginosa L.

camina L.

glauca. }

rubrifolia *Vill.* }

alpina L.

pendulina L.

moschata L.

diversifolia *Went.* }semperflorens *Jacq.* }chinensis *Jacq.* }

sempervirens L.

balearica.

velu. F. h

de Chine. h

2. Fruits ovales.

de Champagne. h (orn.)

de Bourgogne ou pompon. h
(orn.)

de Damas. h (orn.)

à cent feuil. h (orn.)

— onguiculé. (orn.)

mousseux. h (orn.)

de Hollande. h (orn.)

de tous les mois. h (orn.)

à gros cul. h (orn.)

de Provins. Eur. h (orn., méd.)

— panache. (orn.)

de Macartney. chine. h (orn.)

du Kamtschatka. h

blanc. Eur. h (orn.)

des collines. F. h

odorant. F. h

de chien. F. h

glauque. F., Alpes. h

des Alpes. F. h

à fruit pendaut. F. h

musqué. Barb. h (orn., écon.)

à feuil. variables. chine, or.
h (orn.)

toujours vert. Allemagne. h

de Mahon. or. h

III. Germina plura definita (rarius unum),
calice urecolari su ra coarctato recta,
quasi inféra, singula monostyla, semina
totidem.

III. Ovaires en nombre défini, rarement
un seul, surmontés chacun d'un style et
renfermés dans un calice étranglé au
sommet; autant de graines.

POTERIUM

sanguisorba L.

hybridum L.

caudatum H. K.

spinosum L.

PIMPRENELLE

des jardins. F. v (écon., méd.)

hybride. F. m. ♂

à grappes. madère, or. h

épineuse. orient, or. h

SANGUISORBA

officinalis L.

media L.

canadensis L.

SANGUISORBE

officinale. F. v (écon.)

moyenne. Am. s. v

de Canada. v

ANCISTRUM

sanguisorbæ *L. f.*repens *vent.*

AGRIMONIA

eupatoria *L.*

— alba.

— odorata.

repens *L.*agrimonioides *L.*

CLIFFORTIA

ilicifolia *L.*

ALCHIMILLA

vulgaris *L.*hybrida *L.*alpina *L.*pentaphyllea *L.*

aphanes.

aphanes arvensis *L.* }

SIBBALDIA

procumbens *L.*

IV. *Germina plura indefinita vere supera, receptaculo communi imposita, singula monostyla, semina totidem nuda aut rarius baccata.*

TORMENTILLA

erecta *L.*reptans *L.*

POTENTILLA

1. *Foliis pinnatis.*fruticosa *L.*anserina *L.*multifida *L.*supina *L.*bifurca *L.*rupestris *L.*pennsylvanica *L.*2. *Foliis digitatis.*recta *L.*intermedia *L.*hirta *L.*argentea *L.*verna *L.*

ANCISTRUM

à feuell. de pimprenelle. nouv.
zél. Ψ rampant. pérrou, or. Ψ

AIGREMOINE

officinale. *F.* Ψ (méd.)

— blanche.

— odorante.

rampante. orient. Ψ à feuell. ternées. Italie. Ψ

CLIFFORTIA

à feuell. de houx. cap, or. Ψ

ALCHIMILLE

commune, pié-de-lion. *F.* Ψ
(méd.)hybride. *F.*, Alpes. Ψ satinée. *F.*, Alpes. Ψ à 5 feuell. *F.*, Alpes. Ψ perche-pierre. *F.* \odot

SIBBALDIA

couché. *F.*, Alpes. Ψ

IV. Plusieurs ovaires supères et indéfinis attachés à un réceptacle commun, surmontés chacun d'un style, autant de graines nues, ou plus rarement renfermées dans une baie.

TORMENTILLE

droite. *F.* Ψ rampante. *F.* Ψ

POTENTILLE.

1. Feuilles pennées.

arbrisseau. Sibérie. Ψ (orch.)argentine. *F.* Ψ (méd.)laciniée. *F.* Ψ couchée. *F.* \odot bifurquée. Sibérie. Ψ des rochers. *F.*, Alpes. Ψ de Pensylvanie. Ψ

2. Feuilles digitées.

droite. *F. m.* Ψ moyenne. *F.*, Alpes. Ψ hérissée. *F. m.* Ψ argentée. *F.* Ψ printanière. *F.* Ψ

alchimilloïdes *Lapeyr.*

aurea *L.*

grandiflora *L.*

alba *L.*

incisa.

reptans *L.*

lupinoïdes *Wild.* }

valderia *Vill.*

caulescens *L.*

3. *Foliis ternatis.*

monspeliaca *L.*

norvegica *L.*

parviflora.

fragaria sterilis *Vill.* }

emarginata.

fragaria sterilis *L.* }

FRAGARIA

vesca *L.*

— *monophylla.*

— *efflagellis.*

— *semperflorens.*

— *moschata.*

— *nigra.*

— *viridis.*

— *virginiana.*

— *chiloensis.*

— *ananassa.*

COMARUM

palustre *L.*

GEUM

urbanum *L.*

virginianum *Murr.*

canadense *Murr.* }

strictum *Wild.*

alepicum *Jacq.* }

rivale *L.*

nutans *Lmk.*

pyrenaicum *Wild.*

montanum *L.*

reptans *L.*

DRYAS

octopetala *L.*

à feuell. d'alchimille. *F., py-*
rénées. *ψ*

dorée. *F., Alpes.* *ψ*

à grandes fleurs. *F., Alpes.* *ψ*

blanche. *F., Alpes.* *ψ*

incisée. *ψ*

quintefeuille. *F. ψ (méd.)*

à feuell. de lupin. *F., Alpes.* *ψ*

tombante. *F. ψ*

3. Feuilles ternées.

de Montpellier. *F. ψ*

de Norvège. *ψ*

à petites fleurs. *F. ψ*

échancrée. *F. ψ*

FRAISIER

des bois. *F. ψ (écon., méd.)*

— *à une feuille.*

— *sans coulans.*

— *de tous les mois.*

— *capiton.*

— *noir.*

— *vert.*

— *écarlate.*

— *du Chili.*

— *ananas.*

COMARUM

des marais. *F. ψ*

BENOITE

officinale. *F. ψ (méd.)*

de Virginie. *ψ*

de Canada. *ψ*

des ruisseaux. *F., Alpes.* *ψ*

penchée. *F. ψ*

des Pyrénées. *F. ψ*

de montagne. *F., Alpes.* *ψ*

rampante. *F., Alpes.* *ψ*

DRYAS

à 8 pétules. *F., Alpes.* *ψ*

RUBUS.

RONCE.

1. *Fruticosi.*

idæus L.
occidentalis L.
villosus H. K. }
vulpinus. }
fruticosus L.
 — *inermis*.
 — *laciniatus*.
tomentosus L.
glandulosus.
pinnatus.
cæsius L.
 — *crispus*.
odoratus L.

2. *Herbacei.*

saxatilis L.
arcticus L.
chamæmorus L.

V. *Germina plura definita supera monostyla, capsulæ totidem mono aut polyspermæ.*

SPIRÆA.

1. *Herbaceæ.*

filipendula L.
aruncus L.
ulmaria L.
lobata L.
trifoliata L.

2. *Fruticosa.*

sorbifolia L.
salicifolia L.
levigata L.
tomentosa L.
hypericifolia L.
crenata L.
opulifolia L.

VI. *Germen unicum monostylum, nux mono aut disperma nuda aut drupacea.*

PRUNUS.

1. *Cerasi. Nucleo subrotundo.*

caroliniana Mill.
laurocerasus L.
lusitanica L.

1. Tige ligneuse.

framboisier. F. h (écon.)
d'occident. Am. s. h (écon.)
velue. Am. s. h
des haies. F. h (écon., méd.)
 — *sans épines*.
 — *laciniée*.
cotonneuse. F. h
glandulense. F., pyrén. h
pennee. île de F., s. ch. h
à fruit bleu. F. h (écon.)
 — *crépue*.
odorante. Am. s. h

2. Tige herbacée.

des rochers. F. v
du nord. suède. v (écon.)
des marais. suède. v (écon.)

V. Ovaires supères en nombre défini, autant de capsules renfermant une ou plusieurs graines.

SPIRÆA.

1. Tige herbacée.

filipendula. F. v (orn.)
à grappes. F. v (orn.)
ulmaire. F. v (orn.)
à feuil. lobées. Am. s. v (orn.)
à 5 feuil. Am. s. v (orn.)

2. Tige ligneuse.

à feuil. de sorbier. sib. h (orn.)
à feuil. de saule. sib. h (orn.)
à feuil. lisses. sib. h (orn.)
cotonneux. Am. s. h (orn.)
à feuil. d'hypericum. F. h (orn.)
à feuil. crénelées. sib. h (orn.)
à feuil. d'obier. Am. s. h (orn.)

VI. Un seul ovaire surmonté d'un style, une noix nue ou recouverte d'une pulpe renfermant une ou deux graines.

PRUNIER.

1. Les Cerisiers. Noyau presque rond.

de Caroline. or. h
laurier-cerise. F. h (orn.)
azarero. portug., h (orn.)

padus L.
 — *rubra*.
virginiana L.
serotina Willd.
pumila L.
chamaecerasus Jacq.
mahaleb L.

semperflorens Willd. }
serotina Roth. }
cerasus L.
 — *nana*.
 — *ruberrima*.
 — *suavissima*.
 — *juliana*.
avium L.
 — *sylvestris*.
 — *nigra*.
 — *bigarella*.
persicifolia.

2. *Pruni*. Nucleo ovato sub compresso.

spinosa L.
sinensis.
amygdalus pumila L. }
prostrata Willd.
insititia L.
brigantina Willd.
domestica L.
 — *cerea*.
 — *cereolea*.
 — *daniascena*.
 — *hungarica*.
 — *claudiana*.
myrobolana.
cerasifera Willd. }
aciniaria.

3. *Armeniaca*. Nucleo orbiculari compresso.

armeniaca L.
 — *dulcis*.
 — *nigra*.
 — *macrocarpa*.

merisier à grappes. F. h (orn.)
 — *à fruit rouge*.
de Virginie. h (orn.)
tardif. virginie. h
ragonminier. Am. s. h (orn.)
chamaecerasus. Autriche. h
mahaleb, ou *de Sainte-Lucie*.
 F. h (orn.)

de la Tonssaint. h

cerisier. F. h (écon.)
 — *nain*.
 — *de Montmorency*.
 — *royal*, ou *chêriduc*.
 — *guignier à fruit noir*.
merisier. F. h (écon.)
 — *des bois*, à fruit rouge.
 — *des bois*, à fruit noir.
 — *bigarotier*.
à semill. de pêcher. h

2. Les Pruniers. Noyau oblong, un peu comprimé.

épineux, ou *prunellier*. F. h

de Chine. h (orn.)

conché. orient. h

sauvage. F. h

de Briangon. h

cultivé. F. h (écon.)

— *de Sainte-Catherine*.

— *de mirabelle*.

— *de Damas*.

— *de Damas noir*.

— *de reine Claude*.

de myrobolan. Am. s. h (écon.)

de cerisette. Am. s. h (écon.)

3. Abricotiers. Noyau orbiculaire et comprimé.

abricotier. orient. h (écon.)

— *alberge*.

— *à fruit noir*.

— *pêche*.

AMANDIER

pêcher. perse. h (écon.)

cultivé. Asie. h (écon.)

— *amer*.

AMYGDALUS

persica L.
communis L.
 — *amara*.

nana L.

orientalis H. K. }

argentea Link. }

Genera rosaceis affinia.

CALYCANTHUS

floridus L.

præcox L.

HOMALIUM

racemosum L.

ORDO XI.

LEGUMINOSÆ.

I. Corolla regularis, legumen multiloculare, sæpius bivalve, dissepimentis transversis, loculis monospermis, stamina distincta.

MIMOSA.

1. Foliis simplicibus.

verticillata L'Her.

juniperina L'Her.

linifolia Vent.

floribunda Vent.

obliqua Smith.

longifolia Andr.

falcata.

suaveolens Smith.

striata Andr.

heterophylla Link.

2. Foliis simpliciter pinnatis.

inga L.

fagifolia L.

3. Foliis bi aut trigeminis.

unguis-cati L.

fœtida Jacq.

4. Foliis conjugatis simulque pinnatis.

sensitiva L.

strumbulifera Link.

coronillifolia.

furcata.

nain. sibérie. H (orn.)

satiné. perse. H (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les Rosacées.

CALYCANTHUS

de Virginie. H (orn.)

du Japon. H (orn.)

HOMALIUM

à grappes. Am. m., s. ch. H

ORDRE XI.

LES LÉGUMINEUSES.

I. Corolle régulière, gousse à plusieurs loges monospermes, communément bivalve, séparée par des cloisons transversales, étamines distinctes.

SENSITIVE.

1. Feuilles simples.

verticillée. N. holl., or. H

à feuil. de genévrier. N. holl., or. H

à feuil. de lin. N. holl., or. H

à fleurs nombreuses. N. holl., or. H

oblique. N. holl., or. H

à feuil. longues. N. holl., or. H

falciforme. N. holl., or. H

triangulaire. N. holl., or. H

serrée. N. holl., or. H

à feuil. variables. île de F., s. ch. H

2. Feuilles une fois pennées.

ailec. Am. m., s. ch. H

à feuil. de hêtre. Am. m., s. ch. H

3. Feuilles deux ou trois fois géminées.

griffe de chat. Am. m., s. ch. H

puante. Mexique, s. ch. H

4. Feuilles conjuguées et pennées.

sensible. Brésil, s. ch. H

tire-bouchon. Pérou, s. ch. H

à feuil. de coronille. s. ch. H

bisurquée. Afr., s. ch. H

5. *Foliis duplicato pinnatis.*a. *Aculeata aculeis sparsis.*

pudica L.
asperata L.
sarmentosa.
uncinella.
horridula Mich.
trinervis.
ceratonia L.

rhodacantha.

b. *Spinose spinis axillaribus.*

juliflora Swartz.
guayaquilensis.
mauroceana.
senegal L.
nilotica L.
indica.
farnesiana L.
eburnea L. f. }
leucacantha Jacq. }
cornigera L.

c. *Inermes.*

muricata L.
portoricensis Jacq.
leucocephala Lmk.

lophantha Vent. }
distachia Vent. }
arborescens L. }
filicifolia Lmk. }
julibrissin Scop.
decurrens Vent.
angustifolia Lmk. }
peregrina L. }
lebbek L.
trichodes Jacq.
scandens L.
botrycephala Vent.
lentiscifolia.

angustisiliqua Lmk. }
virgata Jacq. }
pubigera.
glandulosa Mich.
punctata L.

5. Feuilles deux fois pennées.

a. Tige garnie d'aiguillons épars.

commune. Am. m., s. ch. ☉
rude. Am. m., s. ch. h
sarmenteuse. s. ch. h
à crochets. s. ch. h
hérissée. Am. s., or. h
à trois nervures. s. ch. h
à feuil. de caroubier. Am. m.,
 s. ch. h
à épines de rosier. s. ch. h

b. Epines axillaires.

à chatons. Mexique, s. ch. h
de guayaquil. s. ch. h
de Maroc. s. ch. h
à tige blanche. Ég., s. ch. h
du Nil. Égypte, s. ch. h
des Indes. s. ch. h
de Farnèse. Inde, or. h
à épines blanches. Inde, s. ch. h
à grosses épines. Mexique,
 s. ch. h

c. Tige sans épines:

tuberculense. Am. m., s. ch. h
de Porto-Rico. s. ch. h
à têtes blanches. Am. m.,
 s. ch. h
en panache. N. Holl., or. h
en arbre. Am. m., s. ch. h (ora.)
arbre de soie. Asie. h
décurrente. N. Holl., or. h
à feuil. étroites, ou tendre à
caillon. Am. m., s. ch. h
lebbek. Inde, s. ch. h
barbue. Pérou, s. ch. h
grimpanche. Inde, s. ch. h
à grappes. N. Holl., or. h
à feuil. de lentisque. Mexique,
 s. ch. h
à gousses étroites. Am. m.,
 s. ch. h
velue. s. ch. h
glanduleuse. Am. s., or. h
punctuée. Am. m., s. ch. h

lycopodioides.
aqualica Humboldt.

GLEDITSIA

triacanthos L.

— levis.

monosperma H. K. }
carolinensis Lmk. }
siliensis Lmk.
macrocanthos.

GYMNOCLADUS Lmk.

canadensis Lmk. }
guilandina dioica L. }

CERATONIA

siliqua L.

TAMARINDUS

indica L.

PARKINSONIA

aculeata L.

SCOTIA Jacq.

speciosa Jacq. }
guayacum afrum L. }

CASSIA

absus L.
tora L.
bicaularis L.
viminea L.
alata L.
corymbosa Lmk.
falcata L.
occidentalis L.
planisiliqua L.
auriculata L.
stipulacea H. K.
fistula L.

latifolia. }
an atomaria L.? }
senma L.
acutifolia Lmk.

grandiflora. }
corymbosa Ortega. }
biflora L.
tomentosa Lmk. }
multiglandulosa Jacq. }

à feuell. de lycopode. s. ch. ♀
aqualique. mexique, s. ch. ♀

FÉVIER

à trois pointes. Am. s. ♀ (arts,
orn.)

— sans épines.

monosperme. Am. s. ♀ (orn.)

de Chine. ♀ (arts, orn.)

à gross. épines. chine. ♀ (orn.)

GYMNOCLADUS

de Canada, chicot, bonduc. ♀

CAROUBIER

commun. F. m., or. ♀ (écon.)

TAMARIN

des Indes. s. ch. ♀ (méd.)

PARKINSONIA

épinenx. Am. m., s. ch. ♀

SCOTIA

écarlate. cap, or. ♀

CASSE

herissée. égypte. ☉

à fruit grêle. Am. m. ☉

à deux loges. Am. m., s. ch. ♀

sarmenteuse. Am. m., s. ch. ♀

aillée. Am. m., s. ch. ♀

corymbifère. Brésil, s. ch. ♀

falciforme. Am. m. ☉

puante. Am. m., s. ch. ♀ (méd.)

à gousse plate. Am. m., s. ch. ♀

auriculée. inde, s. ch. ♀

à gr. stipules. chili, s. ch. ♀

des boutiques. inde, s. ch. ♀
(méd.)

à larges feuell. Am. m., s. ch. ♀

sené d'Italie. ☉ (méd.)

lanccolee, ou sené de la palte.

égypte, s. ch. ♀ (méd.)

à grandes fleurs. mexique,
s. ch. ♀

à deux fleurs. Am. m., s. ch. ♀

cotonneuse. chili, s. ch. ♀

hirsuta L. f.
glandulosa L.
chamaecrista L.
marylandica L.

velve. am. m., s. ch. 5
glandulense. am. m. ☉
chamaecrista. am. m. ☉
de Maryland. am. s. 7

II. *Corolla regularis, legumen uniloculare bivalve, stamina 10 distincta.*

II. Corolle régulière, gousse bivalve à une loge, 10 étamines distinctes.

SPAENDONCEA Desf.
tamarindifolia Desf. }
cadia purpurea Forsk. }

SPAENDONCEA
à feuill. de tamarin. afr.,
 s. ch. 5

HOFFMENSEGGIA Cav.
falcaria Cav. }
larrea glauca Ortega. }

HOFFMENSEGGIA
falciforme. pérou. 7

MORINGA
nux-ben. }
guilandina moringa L. }
hyperanthera moringa Walp. }

MORINGA
noix de Ben. inde, s. ch. 5
 (écon., méd.)

HÆMATOXYLUM
campechianum L.

CAMPÊCHE
commun. am. m., s. ch. 5
 (arts.)

ADENANTHERA /
pavonina L.

CONDORI
glabre. inde, s. ch. 5

POINCIANA
pulcherrima L. }
cæsalpinia pulcherrima Swartz }

POINCILLADE
élégante. inde, s. ch. 5 (orn.)

CÆSALPINIA
sappan L.
bahamensis Lmk.
vesicaria Lmk.

BRÉSILLET
sapan. inde, s. ch. 5 (arts.)
de Bahama. s. ch. 5
vésiculenx. am. m., s. ch. 5

GUILANDINA
bonducella L.

QUENIQUIER
sarmenteux. inde, s. ch. 5

III. *Corolla subirregularis, stamina definita distincta aut basi tantum coalita, legumen uniloculare bivalve.*

III. Corolle un peu irrégulière, étamines distinctes ou seulement réunies à la base, gousse bivalve à une loge.

HYMENEA
courbaril L.

HYMÉNÆA
courbaril. am. m., s. ch. 5

BAUHINIA
porrecta H. K.
tomentosa L.

BAUHINIA
allongé. am. m., s. ch. 5
cotonneux. inde, s. ch. 5

IV. *Corolla papilionacea, stamina distincta, legumen uniloculare bivalve.*

IV. Corolle papilionacée, étamines distinctes, gousse bivalve à une loge.

CERCIS
siliquastrum L.
canadensis L.

GAINIER
de Judée. orient 5 (orn.)
de Canada. 5 (orn.)

ANAGYRIS

foetida L.

SOPHORA

alopécuroïdes L.

flavescens L.

tomentosa L.

japonica L.

microphylla H. K.

tetraptera H. K.

PODALYRIA Lmk.

capensis Wild. }

sophora capensis L. }

aurea Wild. }

sophora aurea H. K. }

virgilia Lmk. }

robinia subdecandra l'Her. }

australis Wild. }

sophora australis L. }

tinctoria Wild. }

sophora tinctoria L. }

alba Wild. }

sophora alba L. }

lupinoïdes Wild. }

sophora lupinoïdes L. }

cuneifolia Vent.

PULTENÆA

ericoides Vent.

V. Corolla papilionacea, stamina 10 mono
aut diadelphæ, legumen uniloculare bi-
valve.

PLATILOBium Smith.

formosum Smith.

scolopendrium Andr.

ULEX

europæus L.

minor Roth.

GENISTA.

1. Spinosa.

anglica L.

germanica L.

hispanica L.

lusitanica L.

ANAGYRIS

fétide. F. m., or. h

SOPHORA

queue de renard. orient. ψ

jaune. sibérie. ψ

cotonneux. ceylan, s. ch. h

du Japon. h (orn.)

à petites feuil. N. zél., or. h

(orn.)

à quatre ailes. N. zél., or. h

PODALYRIA

du Cap. or. h

à fleurs jaunes. Abyss., s. ch. h

de Caroline. ψ

des teinturiers. Am. s. ψ (arts.)

à fleurs blanches. Caroline. ψ

à feuil. de lupin. Kamtschatka.

ψ

cunéiforme. Cap, or. h

PULTENÆA

à feuil. de bruyère. N. Holl.,
or. h

V. Corolle papilionacée, 10 étamines
monadelphes ou diadelphes, gousse
bivalve à une loge.

PLATILOBium

élégant. N. Holl., or. h

à feuilles de scolopendre.

N. Holl., or. h

AJONC

marin. F. h (écon.)

petit. F. h

GENET.

1. Tige épineuse.

d'Angleterre. F. h

d'Allemagne. F. h

d'Espagne. F. h

de Portugal. F. h

2. *Inermes.*

pilosa L.
sagittalis L.
tinctoria L.
sibirica L.
canariensis L.
candicans L.
junceae.
spartium juncum L. }

SPARTIUM.

1. *Inermia.*

sphaerocarpon L.
monospermum L.
cinereum Willd. }
genista scoparia Vill. }
album Desf. }
multiflorum l'Her. }
genista alba Link. }
multicaule.
genista multicaulis Link. }
purgans L.
scoparium L.
triquetrum Link.
nubigenum H. K. }
fragrans Link. }
patens L.
cytisus pendulinus L. f. }
virgatum H. K.
parviflorum Vent.
radiatum L.
umbellatum Desf.
linifolium Desf. }
genista linifolia L. }

2. *Spinosa.*

aspalathoides Desf.
ferox Desf.
scorpius L.
spinosum L.
lanigerum Desf.
creticum.
 an *aspalathus cretica* L. ? }

CYTISUS

sessilifolius L.
nigricans L.

2. Tige sans épines.

tuberculeux. F. h
ailé. F. h
des teinturiers. F. h (arts.)
de Sibérie. h
des Canaries. or. h
blanchâtre. F. m., or. h
jonciforme, ou d'Espagne.
 F. m. h (orn.)

SPARTIUM.

1. Tige sans épines.

à fruit rond. barbarie, or. h
monosperme. F. m., or. h
cendré. F. m. h
à fleurs blanches. barb., or. h
 (orn.)
très-rameux. mahon, or. h
purgatif. F. h
à balais. F. h (écon.)
triangulaire. esp., or. h
odorant. canaries, or. h
étalé. F. m., or. h
effilé. madère, or. h
à petites fleurs. orient, or. h
à rayons. Italie, or. h
ombellifère. barb., or. h
à feuell. de lin. barb., or. h

2. Tige épineuse.

aspalat. barbarie, or. h
à grosses épines. barb., or. h
scorpius. F. m., or. h
épineux. F. m., or. h
laineux. barb., or. h
de Crète. or. h

CYTISE

à feuell. sessiles. esp. h (orn.)
à épis. Allemagne. h (orn.)

laburnum L.

— *latifolium*.

cajan L.

hirsutus L.

anagyrius l'Her.

austriacus L.

divaricatus l'Her.

spartium complicatum L. }

proliferus L.

foliolosus l'Her.

triflorus l'Her.

biflorus l'Her.

supinus L.

argenteus L.

volgaricus L. f. }

pinnatus Pallas. }

des Alpes, ou *faux ébénier*.

F. h (orn.)

— *à larges feuil.* (orn.)

cajan, ou *pois d'Angole*.

Am. m., s. ch. h

hérissé. F. m. h

anagyris. canaries, or. h

d'Autriche. h

étalé. F. h

prolifère. canaries, or. h

feuilh. canaries, or. h

à trois fleurs. F. m., or. h

à deux fleurs. hongrie. h

conché. F. h

argenté. F., Alpes. h

du Volga. h

CROTALARIA.

1. *Foliis ternatis.*

arborescens Zmk. }

ineaneseens H. K. }

ineana L.

purpurascens Zmk.

2. *Foliis simplicibus.*

sagittalis L.

juneea L.

semperflorens Vent.

retusa L.

bengalensis Zmk.

verrucosa L. }

angulosa Zmk. }

cœrulea Jacq. }

CROTALAIRE.

1. Feuilles ternées.

en arbre. ile de F., s. ch. h

(orn.)

blanche. Am. m. ☉

pourpre. ile de F. ☉

2. Feuilles simples.

sagittée. Brésil. ☉

jouciforme. inde. ☉

toujours fleurie. inde, s. ch. h

émoussée. inde, s. ch. ☉

du Bengale. ☉

tuberculeuse. inde. ☉

RAPHNIA

triflora Thunb. }

crotalaria triflora L. }

retusa Vent.

RAPHNIA

à trois fleurs. cap, or. h

émoussé. N. holl., or. h

LUPINUS

perennis L.

varius L.

angustifolius L.

luteus L.

LUPIN

vivace. Am. s. ♀

bigarré. F. m. ☉ (orn.)

à feuil. étroites. F. ☉

jaune. barbarie. ☉ (orn.)

ONONIS.

1. *Flores purpurei aut albi.*

arborescens *Desf.*
 antiquorum *L.*
 arvensis *L.*
 altissima *Lmk.*
 mitissima *L.*
 cenisia *L.*
 alopecuroïdes *L.*
 cherleri *L.*
 rotundifolia *L.*
 fruticosa *L.*
 tridentata *L.*
 hirta.

2. *Flores lutei.*

viscosa *L.*
 natrix *L.*
 parviflora *Lmk.*
 minutissima *Jacq.* non *Lin.*
 columnæ *All.*
 subocculta *Vill.*
 minutissima *L.*
 saxatilis *Lmk.*
 ornithopodioides *L.*
 vaginalis *Vahl.*

ARACHIS

hypogea *L.*

EBENUS

cretica *L.*
 pinnata *Desf.*

ANTHYLLIS.

1. *Fruticosæ.*

barba-jovis *L.*
 cytisoides *L.*
 hermanniæ *L.*
 erinacea *L.*

2. *Herbaceæ.*

cornicina *L.*
 montana *L.*
 tetraphylla *L.*
 vulneraria *L.*
 — purpurascens.

ONONIS.

1. Fleurs rouges ou blanches.

en arbre. barbarie, or. ♀
 arrête-bœuf. f. ♂ (méd.)
 des champs. f. ♂ (méd.)
 élevé. Allemagne. ♂
 à fleurs serrées. f. m. ♂
 du mont Cénis. ♂
 quene-de-renard. esp. ☉
 de Cherler. f. m. ♂
 à feuil. rondes. f., Alpes. ♂
 arbrisseau. f., Alpes. ♀ (orn.)
 à trois dents. esp., or. ♀
 hérissé. orient, or. ♂

2. Fleurs jaunes.

visqueux. f. m. ☉
 natrix. f. ♀

à petites fleurs. f. ♂

nain. f. ♂

pié-d'oiseau. barbarie. ☉
 à gaines. orient, or. ♀

ARACHIS

pistache de terre. am. m. ☉
 (écon.)

EBENUS

de Crète. or. ♀
 peuné. or. ♂

ANTHYLLIS.

1. Tige ligneuse.

satiné. orient, or. ♀
 à fleurs de cytise. f. m., or. ♀
 d'orient. or. ♀
 épineux. esp., or. ♀

2. Tige herbacée.

cornu. esp. ☉
 de montagne. f. ♂
 à quatre feuil. f. m. ☉
 vulnéraire. f. ☉
 — pourpre.

DALEA

purpurea vent.
petalostemum violaceum mich. }
candida.
petalostemum candidum mich. }
linnæi mich.

DALÉA

violet. am. s., or. ♀
blanc. am. s., or. ♀
de Linné. am. s. ♀

PSORALEA

pinnata L.
odoratissima Jacq.
verrucosa wild. }
angustifolia Jacq. }
aphylla L.
bituminosa L.
palæstina Conan.
glandulosa L.
americana L.
bracteata L.
corylifolia L.

PSORALÉA

à feuell. pennées. cap, or. ♀
odorant. cap, or. ♀
tuberculeux. cap, or. ♀
sans feuell. cap, or. ♀
bitumineux. f. m., or. ♀
de Palestine. or. ♀
glanduleux. pérrou, or. ♀
d'Amérique. s. ch. ♀
à grandes bractées. cap, or. ♀
à feuell. de noisetier. inde. ⊙

MELILOTUS (*Trifolium* L.)

cœrulca L.
indica L.
— minor.
officinalis L.
alba.
dentata Wald.
polonica L.
italica L.
cretica L.
messanensis L.

MÉLILOT

bleu. bohème. ⊙ (écon.)
des Indes. ⊙
— petit.
officinal. f. ♂ (méd., écon.)
blanc. sibérie. ♂ (écon.)
denté. Hongrie. ⊙
de Pologne. ⊙
d'Italie. ⊙
de Crète. ⊙
de Messine. ⊙

TRIFOLIUM.

1. *Lotoïdea. Leguminibus tectis polyspermis.*

lupinaster L.
strictum L.
hybridum L.
repens L.
alpinum L.
involutum Wald.

2. *Lagopoïdea. Calicibus villosis.*

subterraneum L.
cherleri L.
lappaceum L.
rubens L.
pratense L.
diffusum Wald.
alpestre L.

TRÈFLE.

1. Les Lotoïdes. Gousses polyspermes recouvertes par le calice.

à feuell. de lupin. sibérie. ♀
serré. f. ⊙
hybride. f. ♀
rampant. f. ♀
des Alpes. f. ♀
à involucre. ♀

2. Les Lagopodes. Calices velus.

souterrain. f. ⊙
de Cherler. f. m. ⊙
bardane. f. ⊙
rouge. f. ♀ (écon.)
des prés. f. ♀ (écon.)
étalé. Hongrie. ♂
à deux têtes. f., Alpes. ♀

flexuosum Jacq. }
medium Afz. }
pannonicum L.
ochroleucum L.
squarrosum L.
incarnatum L.
 — *pallidum.*
angustifolium L.
arvense L.
saxatile All. }
thymiflorum Vill. }
stellatum L.
clypeatum L.
alexandrinum L.
scabrum L.
glomeratum L.
parviflorum Wild.
striatum L.
suffocatum L.

3. *Vesicaria. Calicibus inflatis ventricos.*

spumosum L.
tomentosum L.
fragiferum L.

4. *Lupulina. Vexillis corollæ inflexis.*

montanum L.
agrarium Wild. }
aureum Pollich. }
spallicum L.
procumbens Smith.
filiforme Smith.

MEDICAGO.

1. *Leguminibus lunatis.*

arborea L.
radiata L.
circinnata L.
sativa L.
falcata L.
lupulina L.

2. *Leguminibus cochleatis.*

prostrata L. f.
marina L.
orbicularis L.
tornata L.
 — *minor.*

tortueux. F., Alpes. ♀

de Hongrie. ♀

jaunâtre. F. ♀

hérissé. F. ☉

incarnat. F. ☉

— *pâle.*

à feuell. étroites. F. m. ☉

des moissons. F. ☉

des rochers. F., Alpes. ♂

étoilé. F. m. ☉

bouclier. orient. ☉

d'Alexandrie. ☉ (écon.)

rude. F. ☉

aggloméré. F. ☉

à petites fleurs. Hongrie. ☉

strié. F. ☉

nain. F. m. ☉

3. Les vésiculeux. Calices renflés.

écumeux. F. ☉

cotonneux. F. ☉

fraise. F. ♀

4. Les Lupulins. Etendard de la corolle abaissé.

de montagne. F. ♀

des champs. F. ☉

brun. F. ☉

tombant. F. ☉

filiforme. F. ☉

LUSERNE.

1. Gousse falciforme.

en arbre. orient, or. ♀

radiée. Italie. ☉

pennée. Italie. ☉

cultivée. F. ♀ (écon.)

fulciforme. F. ♀

des prés. F. ♂

2. Gousse en limaçon.

couchée. Hongrie. ♀

maritime. F. m., or. ♀

orbiculaire. F. ☉

barillet. F. ☉

— *petit barillet.*

elegans *Willd.*
tuberculata *Willd.*
aculeata *Willd.*
rigidula *L.*
intertexta *L.*
globulifera.
tribuloides *LMh.*
ciliaris *L.*
maculata *Willd.* }
arabica *L.* }
coronata *L.*
denticulata *Willd.*
apiculata *Willd.*
minima *L.*
laciniata *L.*

élégante. sicile. ☉
tuberculense. F. m. ☉
à aigillons. ☉
rude. ☉
entrelacée. F. m. ☉
à globules. ☉
à grosses pointes. barbarie. ☉
ciliée. F. m. ☉
tachée. F. ☉
couronnée. F. m. ☉
denticulée. F. m. ☉
à petites pointes. Eur. ☉
velue. F. ☉
laciniée. F. ☉

TRIGONELLA.

1. Flores in pedicello communi.

platicarpus *L.*
corniculata *L.*
cancellata.
prostrata.
laciniata *L.*

2. Flores sessiles.

monspeliaca *L.*
spinosa *L.*
polycerata *L.*
fœnum-grecum *L.*

LOTUS

edulis *L.*
siliquosus *L.*
tetragonolobus *L.*
conjugatus *L.*
peregrinus *L.* }
oligoceros *LMh.* }
hispidus.
arabicus *L.*
creticus *L.*
jacobæus *L.*
ornithopodioides *L.*
prostratus *Desf.*
corniculatus *L.*
 — *major.*
 — *tenuifolius.*
hirsutus *L.*

TRIGONELLE.

1. Fleurs portées sur un pédoncule commun.

à gousses larges. sibérie. ☉
cornue. F. ☉
pié-d'oiseau. ☉
conchée. orient. ☉
laciniée. égypte. ☉

2. Fleurs sessiles.

de Montpellier. ☉
épineuse. crête. ☉
à gousses longues. F. m. ☉
fœnu-grec. F. m. ☉ (méd.)

LOTIER

comestible. orient. ☉
à grosses gousses. F. ☿
à quatre ailes. orient. ☉
conjugué. F. ☉
étranger. barbarie. ☉
hérissé. F. m. ☉
d'Arabie. or. ☿
argenté. orient, or. ☿
à fleurs brunes. Afr., or. ♂
comprimé. esp. ☉
couché. orient, or. ☿
pié-d'oiseau. F. ☿
 — *élevé.*
 — *à feuell. étroites.*
velu. F. m., or. ☿

rectus *L.*
dorycnium *L.*

DOLICHOS

lablab *L.*
— albus.
sinensis *L.*
sesquipedalis *L.*
unguiculatus *L.*
luteolus *Jacq.*
articulatus *Link.*
minimus *L.*

lignosus *L.*
urens *L.*
ensiformis.
acinaciformis *Jacq.* }
gladius *Jacq.*

soja *L.*
biflorus *L.*

PHASEOLUS

vulgaris *L.*
coccineus *Link.* }
multiflorus *Wild.* }
lunatus *L.*
vexillatus *L.*
caracalla *L.*
paniculatus *Mich.*
radiatus *Link.* an *Lin.*?
semi-erectus *L.*
nanus *L.*
stipularis *Link.* }
an dolichos trilobus *L.*? }
sphaerospermus *L.*

ERYTHRINA

herbacea *L.*
corallodendrum *L.*
abyssinica *Link.*
aculeatissima.
portoricensis.

CLITORIA

ternatea *L.*
— alba.
heterophylla *Link.*

brasiliensis *L.*
virginiana *L.*

à tige droite. *F. m.* ☞
dorycnium. *F. m.*, or. ☞

DOLIC

lablab. Égypte. ☉ (orn.)
— à fleurs blanches.
de Chine. ☉
à longues gousses. *Am. m.* ☉
onguiculé. *Am. m.* ☉
jaunâtre. *Am. m.* ☉
articulé. *Am. m.*, s. ch. ☞
à petites gousses. *Am. m.*,
s. ch. ☞
ligneux. inde, or. ☞ (orn.)
brûlant. *Am. m.*, s. ch. ☞
pois-sabre. *Am. m.*, s. ch. ☞
à grandes gousses. *Am. m.*,
s. ch. ☞
soja. japon. ☉
à deux fleurs. inde. ☉

HARICOT

commun. inde. ☉ (écon.)
écarlate. *Am. m.* ☉ (écon.,
orn.)
arqué. inde. ☉ (écon.)
à grand étendart. *Am. m.* ☉
caracolle. inde, or. ☞ (orn.)
en panicule. *Am. s.* ☞
à rayons. ceylan. ☉
pourpre. *Am. m.* ☉
nain. inde. ☉ (écon.)
à grandes stipules. inde. ☉
à graines rondes. inde. ☉

ERYTHRINA

herbacé. caroline, or. ☞
arbre de corail. *Am. m.*, s. ch. ☞
d' Abyssinie. s. ch. ☞
très-épineux. s. ch. ☞
de Porto-Rico. s. ch. ☞

CLITORIA

ternatea s. ch. ♂
— à fleurs blanches.
à feuilles variables. inde,
s. ch. ☞
du Brésil. ☉
de Virginie. ☉

glabella.
galacia glabella *mich.* }

GLYCINE

monoïca L.
caribæa L.
tomentosa L.
bituminosa L.
apios L.
frutescens L.
himaclata *curt.*
rubicunda *curt.*
coccinea *curt.*

ABRUS

precatorius L.

AMORPHIA

fruticosa L.
pumila *mich.*
glabra.

PISCIDIA

erythrina L.

ROBINIA

pseudo-acacia L.

inermis.
viscosa *mich.*
hispida L.
altagana *l'Her.*
caragana L.
pygmæa L.
frutescens L.
chamlagu *l'Her.*
spinosa L.
halodendron L. f.
squamata *vahl.*
tomentosa *wild.* }
panacoco *Aublet.* }

COLUTEA

arborescens L.
alepica *Link.* }
pocokii *wild.* }
orientalis *Link.* }
cruenta H. K. }
frutescens L.

LESSERTIA *dec.*

perennans *dec.* }
colutea perennans L. }

glabre. Am. s.

GLYCINÉ

monoïque. Am. s. ♀
des Antilles. s. ch. ♂
cotonneux. Am. s. ♀
bitumineux. cap, or. ♀
apios. Am. s. ♀
arbrisseau. Am. s. ♂ (orn.)
à deux taches. N. holl., or. ♂
rouge. N. holl., or. ♂
écarlate. N. holl., or. ♂

ABRUS

à chapelets. Am. m., s. ch. ♂

AMORPHA

faux indigo. Am. s. ♂ (orn.)
nain. Am. s. ♂
glabre. Am. s. ♂

PISCIDIA

erythrina. Am. m., s. ch. ♂

ROBINIA

faux acacia: Am. s. ♂ (orn.,
écon.)
sans épines. Am. s. ♂ (orn.)
visqueux. Am. s. ♂ (orn.)
acacia rose. Am. s. ♂ (orn.)
altagana. daurie. ♂
caragana. sibérie. ♂ (orn.)
gréle. sibérie. ♂
arbrisseau. sibérie. ♂
chamlagu. chine. ♂ (orn.)
épineux. sibérie. ♂ (orn.)
satiné. sibérie. ♂
écaillés. Am. m., s. ch. ♂
cotonneux. cayenne, s. ch. ♂

BAGUENAUDIER

arbre. F. m. ♂ (orn.)
d'Alep. orient. ♂ (orn.)
d'orient. ♂ (orn.)
d'Ethiopie. cap, or. ♂ (orn.)

LESSERTIA

vivace. sibérie. ♀

annua *Dec.*
colutea herbacea *L.* }

PHACA

boetica *L.*
astragalina *Dec.*
astragalus alpinus *L.* }
alpina *L.*

OXYTROPIS *Dec.*

campestris *Dec.*
astragalus campestris *L.* }
pilosa *Dec.*
astragalus pilosus *L.* }
defflexa *Dec.*
astragalus defflexus *Pallas.* }
astragalus hians *Jacq.*
astragalus parviflorus *Lmk.* }

ASTRAGALUS.

1. *Stipulis caulinis, floribus rubris.*

austriacus *L.*
annularis *Forsk.*
maculatus *Lmk.*
subulatus *Desf.* }
stella *L.*
sesameus *L.*
vesicarius *L.*
pentaglottis *L.*
purpureus *Lmk.*
hypoglottis *L.*
glaux *L.*
onobrychis *L.*
— alpinus.
— major.
hispidulus *Dec.*
suleatus *L.*

2. *Stipulis caulinis, floribus ochroleucis.*

depressus *L.*
contortuplicatus *L.*
trimestris *L.*
hamosus *L.*
glycyphyllos *L.*
cicer *L.*
galegiformis *L.*
asper *Jacq.*
chloranthus *Pallas.* }

annuel. cap. ☉

PHACA

de Portugal. or. ☿
faux astragale. f. ☿
des Alpes. f. ☿

OXYTROPIS

des champs. f. ☿
velu. f., Alpes. ☿
à fruit pendant. Sibérie. ☿

ASTRAGALE.

1. Stipules adhérentes à la tige, fleurs rouges.

d'Autriche. f. m. ☿
annulaire. Afr. s. ☉
étoilé. f. m. ☉
à fleurs sessiles. f. m. ☉
vésiculeux. f. Alpes. ☿
pentaglotte. Barbarie. ☿
pourpre. f. m. ☿
hypoglotte. f. ☉
glaux. esp. ☉
onobrychis. f. ☿
— des Alpes.
— de Sibérie.
hérissé. Égypte. ☉
silloné. Sibérie. ☿

2. Stipules adhérentes à la tige, corolle d'un blanc jaune.

déprimé. f. ☿
recroquevillé. Sibérie. ☉
hâtif. Égypte. ☉
en hameçon. f. m. ☉
à feuil. de réglisse. f. ☿
pois-chiche. f. ☿
galéga. Sibérie. ☿
rude. Sibérie. ☿

canadensis L.
 uliginosus L.
 odoratus Lmk.
 falcatus Lmk.
 christianus L.
 tomentosus Lmk.
 alopecuroides L.
 narbonensis Gouan.

de Canada. ♀
 des marais. sibérie. ♀
 odorant. orient. ♀
 falciforme. Russie. ♀
 de Judée. or. ♀
 cotonneux. égypte. ♀
 quene de renard. sibérie. ♀
 de Narbonne. F. m. ♀

3. *Stipulis petiolo adhaerentibus, inermes.*

caprinus L.
 exscapus L.
 incanus L.
 mouspessulanus L.

4. *Spinescentes.*

longifolius Lmk. }
 massiliensis Lmk. }
 tragacantha L. }
 sempervirens Lmk. }
 aristatus L'Her. }
 tragacantha Vill. }

BISERRULA

pelecinus L.

GLYCYRRHIZA

echinata L.
 glabra L.
 foetida Desf.

GALEGA

officinalis L.
 rosea Lmk.
 pulchella Scop. }
 stricta H. K. }
 cinerea L.
 coronillaefolia.
 caribaea L.
 pubescens Lmk.
 longifolia Jacq. }
 clitoria micrantha Scop. }

INDIGOFERA

viscosa Lmk.
 tinetoria L.

anil L.
 argentea L. }
 glauca Lmk. }

3. *Stipules adhaerentes au pétiole, feuilles sans épines.*

des chèvres. barbarie, or. ♀
 sans tige. suisse. ♀
 blanc. F. m. ♀
 de Montpellier. F. ♀

4. *Feuilles terminées par une épine.*

à longues feuil. orient. ♀
 de Marseille. F. m. ♀

toujours vert. F., Alpes. ♀

BISERRULA

ruteau. barbarie. ☉

RÉGLISSE

hérissée. tartarie. ♀
 officinale. F. ♀ (méd.)
 puante. barbarie. ♀

GALÉGA

officinal. F. ♀ (écon.)
 rose. cap, or. ♀
 élégant. cap, or. ♀
 cendré. Am. m. ☉
 à feuil. de coronille. s. ch. ♀
 des Antilles. s. ch. ♀
 pubescent. Am. m. ♀
 à longues feuil. Am. m. ♀

INDIGOTIER

visqueux. Am. m., s. ch. ♀
 des teinturiers. inde, s. ch. ♂
 (arts.)
 anil. inde, s. ch. ♂ (arts.)
 argenté. orient, or. ♀ (arts.)

macrostachya Vent.
australis Wild.
cinncaphylla L.

LATHYRUS.

1. *Pedunculis unifloris.*

aphaca L.
missolia L.
axillaris Lmk. }
sphaericus Retz. }
cicera L.
sativus L.
setifolius L.
turgidus Lmk.

2. *Pedunculis bifloris.*

clymenum L.
articulatus L.
odoratus L.
tingitanus L.
annuus L.

3. *Pedunculis multifloris.*

hirsutus L.
tuberosus L.
pratensis L.
sylvestris L.
latifolius L.
palustris L.

PISUM

sativum L.
 — *excorticatum*.
 — *umbellatum*.
arvense L.
maritimum L.
ochrus L.

OROBUS

lathyroïdes L.
vernus L.
luteus L.
tuberosus L.
albus L. f.
sylvaticus L.
niger L.
tomentosus.
lathyrus tomentosus Cav. }
vicia tomentosa Wild. }

à gros épis. chine, or. ☉
austral. N. Holl., or. ☉
à neuf folioles. inde. ☉

GESSE.

1. Pédoncules à une fleur.

aphaca. F. ☉
sans vrilles. F. ☉
axillaire. F. m. ☉
sillonnée. Esp. ☉
cultivée. F. ☉ (écon.)
à feuell. étroites. F. m. ☉
renflée. ☿

2. Pédoncules à deux fleurs.

d'Espagne. ☉
articulée. F. m. ☉
odorante. ceylan. ☉ (orn.)
de Tanger. ☉
jaune. F. m. ☉

3. Pédoncules à plusieurs fleurs.

velue. F. ☉
tubéreuse. F. ☿ (écon.)
des prés. F. ☿
sauvage. F. ☿
à larges feuell. F. m. ☿
des marais. F. ☿

POIS

cultivé. F. ☉ (écon.)
 — *sans parchemin.*
 — *à bouquets.*
des champs. F. ☉
maritime. F. ☿
ailé. F. m. ☉

OROBEE

à feuell. de gesse. sibérie. ☿
printanier. F. ☿
jaune. F., Alpes. ☿
tubéreux. F. ☿
blanc. Autriche. ☿
des bois. F., Alpes. ☿
noir. F. ☿

cotonneux. Pérou, s. ch. ☿

VICIA.

1. *Pedunculis elongatis.*

- pisiformis* L.
dumetorum L.
sylvatica L.
cracca L.
onobrichioides All.
atropurpurea Desf.
bengalensis L.
biennis L.
monanthos. }
ervum monanthos L. }
ervilia wild. }
ervum ervilia L. }

2. *Floribus axillaribus subsessilibus.*

- sepium* L.
sativa L.
 — *angustifolia.*
peregrina L.
torulosa.
lathyroides L.
ervum soloniense L. ex Wild. }
lutea L.
hybrida L.
narbonensis L.

FABA (*Vicia* Lin.)

- major* L.
 — *minor.*
 — *viridis.*

ERVUM

- hirsutum* L.
tetraspermum L.
lens L.
 — *minor.*

CICER

- arietinum* L.

VI. *Legumen articulatum, articulatis monospermis.*

SCORPIURUS

- vermiculata* L.
muricata L.
sulcata L.

ORNITHOPUS

- perpusillus* L.
compressus L.
scorpioides L.

1. Pédoncules allongés,

- pisiforme.* F. ♀
des buissons. F. ♀
des bois. F. ♀
à fleurs nombreuses. F. ♀
à feuil. de sainfoin. F., Alp. ⊙
brun-pourpre. barbare. ⊙
du Bengale. ⊙
bisannuelle. sibérie. ♂
à une fleur. F. ⊙
ers. F. ⊙

2. Fleurs axillaires presque sessiles.

- des haies.* F. ♀
cultivée. F. ⊙ (écon.)
 — *à feuil. étroites.*
échancrée. F. ⊙
bosselée. ⊙
printanière. F. ⊙
jaune. F. ⊙
hybride. F. ⊙
de Narbonne. ⊙

FÈVE

- de marais.* perse. ⊙ (écon.)
 — *petite, ou fèverolle.*
 — *verte.*

LENTILLE

- velue.* F. ⊙
à quatre graines. F. ⊙
cultivée. F. m. ⊙ (écon.)
 — *petite.*

CICER

- pois-chiche.* orient. ⊙ (écon.)

VI. Gousse articulée, articulations monospermes.

CHENILLETTE

- écailleuse.* F. m. ⊙
hérissée. F. m. ⊙
sillonée. F. m. ⊙

PIÈ-D'OISEAU

- petit.* F. ⊙
comprimé. F. m. ⊙
queue de scorpion. F. m. ⊙

HIPPOCREPIS

- unisiliquosa L.
 multisiliquosa L.
 comosa L.
 balcarica H. K.

CORONILLA

- emerus L.
 valentina L. }
 stipularis Lmk. }
 glauca L.
 juncea L.
 minima L.
 varia L.
 globosa Lmk.
 cretica L.
 securidaca L.

HEDYSARUM.

1. *Foliis simplicibus.*

- alliagi L.
 maculatum L.
 vaginale L.
 verpertilionis L. f.

gangeticum L.

2. *Foliis ternatis.*

- junceum L.
 coriaceum.
 canadense L.
 caulescens L. ?
 marylandicum L.
 diffusum.
 gyrans L. f.

3. *Foliis pinnatis.*

- alpinum L.
 obscurum L.
 coronarium L.
 flexuosum L.
 fruticosum L.
 muricatum Jacq.
 lanuginosum.
 onobrychis L.
 saxatife L.
 caput-galli L.
 crista-galli L.

HIPPOCRÉPIS

- à gousses solitaires. F. m. ☉
 à plusieurs gousses. F. m. ☉
 des champs. F. ☿
 de Mahon. or. ♀

CORONILLE

- émérus. F., Alpes. ♀ (orn.)
 à grandes stipules. F. m., or. ♀
 glauque. F. m., or. ♀
 jonciforme. F. m., or. ♀
 petite. F. ☿
 bigarrée. F. ☉ (orn.)
 globuleuse. orient. ☿
 de Crète. ☉
 à gousses plates. F. ☉

SAINFON.

1. Feuilles simples.

- à la manne. syrie. ☿
 panaché. inde. ☉
 à gaines. inde. ☉
 aile d'oiseau. cochinchine ,
 s. ch. ♂
 du Gange. s. ch. ♀

2. Feuilles ternées.

- effilé. sibérie. ☿
 à senill. coriaces. or. ♀
 de Canada. ☿
 blanchâtre. am. s., or. ☿
 de Maryland. ☿
 étalé. s. ch. ♀
 oscillant. bengale , s. ch. ♂

3. Feuilles pennées.

- des Alpes. F. ☿
 à fruit lisse. Alpes. ☿
 d'Espagne. ♂ (écon., orn.)
 tortueux. orient. ☉
 arbrisseau. sibérie. ♀
 herissé. Afr. ☿
 laineux. orient. ☿
 cultivé. F. ☿ (écon.)
 des rochers. F., Alpes. ☿
 tête-de-coq. F. m. ☉
 crête-de-coq. orient. ☉

ÆSCHYNOMENE

grandiflora L.
 sesban L.
 pieta Cav.
 fusca.

ÆSCHYNOMENÉ

à grandes fleurs. inde, s. ch. ♀
 sesban. Égypte, s. ch. ♂
 tacheté. N. Esp., s. ch. ♂
 à fleurs brunes. s. ch. ♀

VII. Corolla papilionacea, legumen capsulare uniloculare submonospermum saepe non dehiscens.

VII. Corolle papilionacée, gousse capsulaire à une loge ordinairement monosperme et ne s'ouvrant point.

DALBERGIA

latiliqua.

DALBERGIA

à gonsses large. Am. m., s. ch. ♀

GEOFFRÆA

inermis Swartz.

GEOFFRÆA

sans épines. Am. m., s. ch. ♀

PTEROCARPUS

ceastaphyllum L.

PTEROCARPUS

à feuilles simples. Am. m., s. ch. ♀

SECURIDACA

volubilis L.

SECURIDACA

sarmenteux. Am. m., s. ch. ♀

ORDO XII.**ORDRE XII.****TEREBINTHACEÆ.****LES TÉRÉBINTHES.**

I. Germen simplex, fructus unilocularis monospermus.

I. Un seul ovaire, fruit à une seule loge monosperme.

ANACARDIUM

occidentale L.

ANACARDE

d'occident, ou noix d'acajou.
 Am. m., s. ch. ♀ (écon.)

MANGIFERA

sativa L.

MANGUIER

cultive. inde, s. ch. ♀ (alim.)

RHUS.**SUMAC.**

1. Foliis pinnatis.

1. Feuilles pennées.

coriaria L.

typhinum L.

glabrum H. K.

vernix L.

copallinum L.

semialatum Murr.

javanicum L.

des corroyeurs. F. m. ♀ (écon.)

de Virginie. ♀ (orn.)

glabre. Am. s. ♀ (orn.)

vernis. Am. s. ♀

ailé. Am. s. ♀

semi-ailé. inde, s. ch. ♀

à feuil. de sorbier. inde, s. ch. ♀

2. Foliis ternis.

2. Feuilles ternées.

toxicodendron L.

radicans L.

aromaticum H. K.

tomentosum L.

dentatum Rhunb.

vénéneux. Am. s. ♀

traçant. Am. s. ♀ (méd.)

aromatique. Am. s. ♀

cotonneux. cap, or. ♀

denté. cap, or. ♀

cuneifolium Thunb.

glaucum.

thezera Desf.

rharnus pentaphyllus L. }

oxyacanthoides.

angustifolium L.

viminale H. K.

levigatum L.

lucidum L.

villosum L. f.

undulatum Jacq.

nervosum.

3. *Foliis simplicibus.*

cotinus L.

II. *Germen simplex, fructus multilocularis, loculis quibusdam interdum abortivis.*

CNEORUM

triccoccum L.

pulverulentum Vent.

COMOCLADIA

ilicifolia L.

dentata L.

AMYRIS

polygama Cav.

SCHINUS

molle L.

PISTACIA

terebinthus L.

trifoliata L. }

vera L. }

chia.

atlantica Desf.

lentiscus L.

BURSERA

gummifera L.

SPONDIAS

monbin L.

III. *Germen multiplex, fructus multicapsularis.*

AYLANTUS Desf.

glandulosa.

cunéiforme. cap, or. h

glauque. cap, or. h

thézera. barbarie, or. h

à feuell. d'aube-épine. orient, or. h

à feuell. étroites. cap, or. h

flexible. cap, or. h

lisse. cap, or. h

luisant. cap, or. h

velu. cap, or. h

ondule. cap, or. h

veiné. cap, or. h

3. Feuilles simples.

fustet. F. m. h (arts)

II. Un seul ovaire, fruit à plusieurs loges dont quelques-unes avortent quelquefois.

CAMELÉE

à trois coques. F. m. h

pulvérulente. canaries, or. h

COMOCLADIA

à feuell. de houx. Am. m.,

s. ch. h

à feuell. dentées. Am. m.,

s. ch. h

AMYRIS

polygame. chili, s. ch. h

SCHINUS

mollé. pérou, s. ch. h

PISTACHIER

térebinte. F. m. h

cultivé. orient, or. h (écon.)

de Chio. or. h

de l'atlas. or. h (écon.)

lentisque. F. m., or. h (écon.)

BURSERA

gommifère. Am. m., s. ch. h

SPONDIAS

monbin. Am. m., s. ch. h

III. Plusieurs ovaires, autant de capsules.

AYLANTE

glanduleux. japon. h (orn.)

BRUCEA *l'her.*
ferruginea *l'her.*

FAGARA
pterota *L.*
microphylla.

ZANTHOXYLUM
fraxinifolium *Marschal.* }
cauliflorum *Mich.* }
clava-herculis *L.*

PTELEA
trifoliata *L.*

DODONÆA
viscosa *L.*
angustifolia *L. f.*
triquetra *Willd.*

JUGLANS
regia *L.*
— serotina.
fraxinifolia *Lmk.*
alba *L.*
pacan *H. K.* }
cylindrica *Lmk.* }
cinerca *L.*
nigra *L.*

BRUCÉA
ferrugineux. *Afr.*, s. ch. h

FAGARA
à feuell. de jasmin. *Am. m.*,
s. ch. h
à petites feuell. *Am. m.*, s. ch. h

ZANTHOXYLUM
à feuell. de frêne. *Am. s.* h
à gros aiguillons. *Am. m.*,
s. ch. h

PTÉLÉA
à trois feuell. *Am. s.* h (orn.)

DODONÆA
visqueux. *Inde*, s. ch. h
à feuell. étroites. *Inde*, s. ch. h
triangulaire. *N. Holl.*, or. h

NOYER
cultivé. *Asie.* h (écon.)
— tardif.
à feuell. de frêne. *Asie.* h
ikori. *Am. s.* h
pacanier. *Am. s.* h (écon.)
cendré. *Am. s.* h
noir. *Am. s.* h

ORDO XIII.

RHAMNI.

I. *Stamina petalis alterna, fructus capsularis.*

SPAPHYLEA
pinnata *L.*
trifoliata *L.*

EVONYMUS
europæus *L.*
latifolius *L.*
americanus *L.*
atropurpureus *Jacq.*
verrucosus *L.*

CELASTRUS
scandens *L.*
cassinoides *P'her.*

ORDRE XIII.

LES NERPRUNS.

I. Étamines alternes avec les pétales, une capsule.

STAPHYLÉA
à feuell. pennées. *F.* h (orn.)
à feuell. ternées. *Am. s.* h (orn.)

FUSAIN
d'Europe. *F.* h (écon.)
à larges feuell. *F.* h (orn.)
d'Amérique. *Am. s.* h
noir-pourpre. *Am. s.* h
galenx. *Autriche.* h (orn.)

CELASTRUS
grim pant. *Am. s.* h
à feuell. de cassiné. *canaries*,
or. h

octogonus *l'Her.*
 lucidus *L.*
 cassine concava *Lmk.* }
 buxifolius *L.*
 pyracanthus *L.*
 senegalensis *Lmk.* }
 phyllacanthus *l'Her.* }
 multiflorus *Lmk.* }
 hispanicus *H. P.* }

octogone. pérou, s. ch. h
à feüll. imisantes. cap, or. h
à feüll. de buis. cap, or. h
à épines rouges. cap, or. h
du Sénégal. s. ch. h
à fleurs nombr. cap, or. h

II. *Stamina petalis alterna*, drupa aut bacca.*

II. Étamines alternes avec les pétales, un drupe ou une baie.

RUBENTIA

mauritiana.
 longifolia.
 clæodendrum orientale *Jacq.* }

RUBENTIA

bois d'olive. île de F., s. ch. h
à longues feüll. s. ch. h

CASSINE

capensis *L.*
 maurocenia *L.*
 xylocarpa *Vent.*

CASSINÉ

du Cap. or. h
à feüll. convexes. cap, or. h
à fruit osseux. Antilles, s. ch. h

ILEX

aquifolium *L.*
 — crassifolium
 — ferox.
 — serratum.
 — variegatum.
 balearica.
 maderiensis *Lmk.* }
 perado *H. K.* }
 cassine *Z.*
 — angustifolia.
 æstivalis *Lmk.* }
 prinoides *H. K.* }
 vomitoria *H. K.* }
 cassine peragua *Z.* }
 canadensis *Mich.*

HOUE

commun. F. h (écon., orn.)
 — à feüll. épaisses.
 — hérisson.
 — en scie.
 — panaché.
de Mahon. h (orn.)
de Madère. or. h
à feüll. de laurier. caroline,
or. h
 — à feüll. étroites.
à feüll. de prinos. carol., or. h
purgatif, apalachine. flo-
ride, or. h
de Canada. h

PRINOS

verticillatus *L.*
 glaber *L.*

PRINOS

verticillé. Am. s. h
lisse. Am. s. h

III. *Stamina petalis opposita, fructus drupaceus.*

III. Étamines opposées aux pétales, un drupe.

RHAMNUS.

I. *Spinosi.*
 catharticus *L.*
 infectorius *L.*

NERPRUN.

I. Tige épineuse.
purgatif. F. h (arts, méd.)
graine d'Avignon. F. m. h
(arts.)

theezans L.
 lycioïdes L.
 buxifolius L.
 oleoïdes L.
 saxatilis L.
 erythroxyllum Pallas.

2. Inermes.

frangula L.
 colubrinus L.
 hybridus L'her. }
 burgundiacus H. P. }
 alpinus L.
 alnifolius L'her.
 pumilus L.
 glandulosus H. K.
 ellipticus H. K. }
 ceanothus reclinatus L'her. }
 alaternus L.
 — angustifolius.
 — hispanicus.
 — rotundifolius.
 — variegatus.

ZIZYPHUS (Rhamnus L.)

sinensis Link.
 inguanea Link.
 lotus L.

saliva.
 spina-christi L.
 volubilis L. f.

PALIURUS (Rhamnus L.)

aculeatus.

IV. Stamina petalis opposita , fructus
 tricoccus.

COLLETHA

obcordata Vent.

CEANOTHUS

africanus L.
 microphyllus Michx.
 americanus Z.
 discolor Vent.

PHYLICA

ericoides L.
 axillaris Link.
 plumosa Z.

de Chine. or. h
 à feüll. linéaires. F. m., or. h
 à feüll. de buis. esp., or. h
 à feüll. d'olivier. esp., or. h
 des rochers. F., Alpes. h
 à longues feüll. sibérie. h

2. Tige sans épines.

bonrgene. F. h (arts.)
 ferrugineux. Am. m., s. ch. h
 hybride. h
 des Alpes. F. h
 à feüll. d'aune. Am. s. h
 nain. F., Alpes. h
 glanduleux. canaries, or. h
 elliptique. Am. m., s. ch. h
 alaterne. F. m. h (orn.)
 — à feüll. étroites.
 — d'Espagne.
 — de Mahon.
 panache. (orn.)

JUBUBIER

de Chine. or. h
 croc-de-chien. Am. m., s. ch. h
 des lotophages. Tunis, or. h
 (écon.)
 cultivé. orient. h (écon., méd.)
 napéca. égypte, s. ch. h (écon.)
 sarmenteux. Am. s. h

PALIURUS

épineux. F. m. h

IV. Étamines opposées aux pétales, fruit
 à trois coques.

COLLËTHA

à feüll. en cœur. pérou, or. h

CEANOTHUS

d'Afrique. cap, or. h
 à petites feüll. Am. s. h
 d'Amérique. Am. s. h
 de deux couleurs. N. Holl., or. h

PHYLICA

bruyère du Cap. or. h (orn.)
 axillaire. cap, or. h
 plumeux. cap, or. h

pubescens *H. K.*
 buxifolia *L.*
 cordifolia *Zmk.*
 myrtifolia *Zmk.*
 ledifolia.
 thymifolia *Vent.*

Genera Rhamnis affinia.

BRUNIA

lanuginosa *L.*

LASIOPETALUM *Smith.*

ferrugineum *Smith.*

GOUANIA

domingensis *L.*
 mauritiana *Zmk.*
 integrifolia *Zmk.*

AUCUBA *Thunb.*

japonica *Thunb.*

pubescent. cap, or. ♀
 à feuell. de buis. cap, or. ♀
 à feuell. en cœur. cap, or. ♀
 à feuell. de myrte. cap, or. ♀
 à feuell. de ledum. cap, or. ♀
 à feuell. de thym. N. Holl., or. ♀

Genres qui ont de l'affinité avec les
 Nerpruns.

BRUNIA

lanugineux. cap, or. ♀

LASIOPÉTALUM

ferrugineux. Botany-Bay, or. ♀

GOUANIA

de Saint-Domingue. s. ch. ♀
 de l'Ile-de-France. s. ch. ♀
 à feuell. entières. s. ch. ♀

AUCUBA

du Japon. or. ♀

CLASSIS XV.

CLASSE XV.

DICOTYLEDONES

DICOTYLEDONS

APETALAE.

SANS PÉTALES.

(*Stamina idiogyna.*)

(Fleurs unisexuelles.)

ORDO I.

ORDRE I.

EUPHORBIAE.

LES EUPHORBES.

I. *Styli plures definiti, sæpius tres.*

I. Styles en nombre défini, ordinairement
 trois.

MERCURIALIS

perennis *L.*
 annua *L.*
 tomentosa *L.*
 elliptica *Zmk.*

MERCURIALE

vivace. F. ♀
 annuelle. F. ☉ (méd.)
 cotonneuse. F. m. ♀
 elliptique. Portugal. or. ♀

EUPHORBIA.

1. *Herbacea, umbella bifida aut nulla.*
 hypericifolia *L.*
 maculata *Jacq.*
 pieta *Jacq.*

EUPHORBE.

1. Tige herbacée, ombelle bifide ou nulle.
 à feuell. d'*hypericum*. inde. ☉
 taché. Am. s. ☉
 panaché. s. ch. ♀

pilulifera L. }
 capitata Lmk. }
 thymifolia L.
 canescens L.
 chamaesyce L.
 peplis L.
 prunifolia Jacq.

2. *Herbaceæ, umbella trifida.*

peplus L.
 falcata L.
 exigua L.

3. *Herbaceæ, umbella quadrifida.*

lathyrus L.

4. *Herbaceæ, umbella quinquifida.*

purpurata Thmil.
 alepica L.
 segetalis L.
 helioscopia L.
 serrata L.
 verrucosa L.
 platiphyllus L.
 bupleuroïdes Desf.

orientalis L.
 hyberna L.
 sylvatica L.

5. *Herbaceæ, umbella multifida.*

illirica Lmk. }
 an pilosa L. ? }
 linariæfolia Lmk.
 pinifolia Lmk.
 cyparissias L.
 palustris L.
 myrsinites L.

6. *Caulibus suffruticosis aut fruticosis.*

characias L.
 paralias L.
 pithyusa L.
 spinosa L.
 mauritanica L.
 virgata. }
 mauritanica Lmk. }
 dendroïdes L.

à globules. inde. ☉

à feüill. de thym. inde. ☉

blanchâtre. Esp. ☉

chamaesyce. F. m. ☉

pèplis. F. m. ☉

à feüill. de prunier. ☉

2. Tige herbacée, ombelle à trois rayons.

pèplus. F. ☉

falciforme. F. ☉

menu. F. ☉

3. Tige herbacée, ombelle à quatre rayons.

épurge. F. ♂ (méd.)

4. Tige herbacée, ombelle à cinq rayons.

purpurin. F. ☉

d'Alep. syrie, or. ♀

des blés. F. ☉

réveille-matin. F. ☉

en scie. F. ♀

tuberculeux. F. ♀

à feüill. larges. F. ☉

à feüill. de buplevre. barbarie,

or. ♀

d'Orient. ♀

à feüill. de laurèole. F. ♀

des bois. F. ♀

5. Tige herbacée, ombelle à plus de cinq rayons.

de Dalmatie. ♀

à feüill. de linair. F. ♀

à feüill. de pin. F. ♀

petit cyprès. F. ♀

des marais. F. ♀

myrsinites. F. m. ♀

6. Tige ligneuse ou presque ligneuse.

à fleurs brunes. F. m. ♀

maritime. F. ♀

à feüill. de genévrier. F. ♀

piquant. F. m., or. ♀

de Mauritanie. or. ♀

effilé. Afr., or. ♀

en arbre. barbarie, or. ♀

longifolia *Lmk.* }
mellifera *H. K.* }
linearis *Retz.*
cotinifolia *L.*

verticillata.
heterophylla *L.*

7. *Carnosæ inermes.*

tithymaloïdes *L.* }
myrtifolia *Lmk.* }
lophogona *Lmk.*
caput-medusæ *L.*
tridentata *Lmk.* }
anacantha *H. K.* }
meloformis *H. K.*

8. *Carnosæ aculeatæ.*

uncinata *Dec.*
canariensis *L.*
hystrix *Jacq.* }
loricata *Lmk.* }
neriifolia *L.*

officinarum *L.*

PHYLLANTHUS.

1. *Fruticosæ.*

grandifolia *L.*
brasiliensis *Poir.*
reticulata *Poir.*

2. *Herbacæ.*

ninuri *L.*
carolinensis *Michx.*

KIRGANELIA *Juss.*
phyllanthoides.

XYLOPHYLLA

falcata *Swartz.*
angustifolia *Swartz.*
latifolia *Swartz.*
ramiflora *H. K.*

KIGGELLARIA
africana *L.*

mellifère. canaries, or. 5
linéaire. Antilles, s. ch. 5
à feuell. de fustet. Am. m.,
s. ch. 5
verticillé. Am. m., s. ch. 5
à feuell. variables. Am. m.,
s. ch. 5

7. Tige charnue sans épines.

à feuell. ovales. Am. m., s. ch. 5
à crêtes. Madagascar, s. ch. 5
tête-de-Méduse. cap, s. ch. 5
à trois dents. cap, s. ch. 5
melon. cap, s. ch. 5

8. Tige charnue garnie d'épines.

à crochets. s. ch. 5
des Canaries. s. ch. 5
hérissé. cap, s. ch. 5
à feuell. de nérium. inde,
s. ch. 5
des boutiques. cap, s. ch. 5

PHYLLANTHUS.

1. Tige ligneuse.

à grandes feuell. Am. m.,
s. ch. 5
du Brésil, ou bois à enivrer.
s. ch. 5
à réseau. île de F., s. ch. 5

2. Tige herbacée.

ninuri. inde. ☉
de Caroline.

KIRGANELIA
à feuell. de phyllanthus. île
de F., s. ch. 5

XYLOPHYLLA

falciforme. Am. m., s. ch. 5
à feuell. étroites. Am. m., s. ch. 5
à feuell. larges. Am. m., s. ch. 5
à fleurs axillaires. Sibérie. 5

KIGGELLARIA
d'Afrique. cap, or. 5

CLUTIA

pulchella Z.
alaternoides Z.

ANDRACHNE

telephioïdes Z.

AGYNEJA

impubes Z.

BUXUS

sempervirens Z.
 — *suffruticosa*.
 — *angustifolia*.
balearica Zmk.

ADELIA

acitodon Z.?

RICINUS

communis Z.
 — *rutilans*.
inermis Jacq.

JATROPHA

curcas Z.
multifida Z.
napæifolia Desrouss.

manihot Z.
gossypifolia Z.

acuminata Zmk. }
panduræfolia Andr. }

ALEURITES Forst.

moluccana. }
croton moluccanum Z. }

CROTON.

1. *Fruticosa*.

sebiferum Z.

penicillatum Vent. }
ciliato-glanduliferum Ortega. }
punctatum Jacq.
balsamiferum Z.
lacerum.

2. *Herbacea*.

dioïcum Cav.
argenteum Z.

CLUTIA

élégant. cap, or. ♀
à feuell. d'alaterne. cap, or. ♀

ANDRACHNÉ

couché. orient. ♂

AGINÉJA

glabre. chine. ☉

BUISS

toujours vert. F. ♀ (arts, orn.)
 — *nain*.
 — *à feuell. étroites*.
de Mahon. ♀

ADÉLIA

acitodon. Am. m., or. ♀

RICIN

commun. barbarie. ♀ (méd.,
 écon., orn.)
 — *pourpre*.
à fruit lisse. inde, s. ch. ♀

JATROPHA

pignon d'Inde. s. ch. ♀ (méd.)
lacinie. Am. m., s. ch. ♀
à feuell. de napæa. Am. m.,
 s. ch. ♀
manioc. Am. m., s. ch. ♀ (alim.)
à feuell. de cotonnier. Am. m.,
 s. ch. ♀
à feuell. pointues. Am. m.,
 s. ch. ♀

ALEURITÈS

noix de Bancoul. inde, s. ch. ♀

CROTON.

1. Tige ligneuse.

arbre à suif. inde, s. ch. ♀
 (écon.)

pénicillé. île de cuba, s. ch. ♀
ponctué. Am. m., s. ch. ♀
balsamique. Am. m., s. ch. ♀
lacéré. s. ch. ♀

2. Tige herbacée.

dioïque.
argenté. Am. m. ☉

tinctorium L.

lobatum L.

ACALYPHA

virginica L.

alopecuroïdea Jacq.

II. *Stylus unicus*.

TRAGIA

volubilis L.

involutrata L.

plumosa.

SAPIUM

laurocerasum.

HIPPOMANE

mancinella L.

HURA

crepitans L.

DALECHAMPIA

villosa Lmk. }

scandens L. }

des teinturiers, ou tournesol.

F. m. ☉

lobé. Am. m., s. ch. ♂

ACALYPHA

de Virginie. ☉

queue-de-renard. ☉

II. Un seul style.

TRAGIA

sarmenteux. inde, s. ch. ♀

à involucre. inde, s. ch. ♀

plumex. Am. m., s. ch. ♀

SAPIUM

à feuell. de laurier - cerise.

Am. m., s. ch. ♀

MANCENILLIER

venéneux. Am. m., s. ch. ♀

SABLIER

élastique. Am. m., s. ch. ♀

DALECHAMPIA

sarmenteux. Am. m. ☉

ORDO II.

ORDRE II.

CUCURBITACEÆ.

LES CUCURBITACÉES.

SICYOS

angulata L.

SICYOS

anguleux. Am. s. ☉

BRYONIA

dioïca Jacq.

africana L.

laciniosa L.

abyssinica Lmk.

pubescens.

BRYONE

dioïque. F. ♂ (méd.)

d'Afrique. cap, or. ♂

laciniée. ceylan, s. ch. ♂

d'Abyssinie. s. ch. ♂

pubescente. s. ch. ♂

MELOTHRIA

pendula L.

MÉLOTRIA

à fruit pendant. Am. s. ☉

MOMORDICA

pedata L.

luffa L.

balsamina L.

elaterium L.

MOMORDICA

en pédale. pérou. ☉

luffa. ceylan. ☉

balsamine. inde. ☉

concombre sauvage. F. m. ☉

CUCUMIS

colocynthis L.

CONCOMBRE

coloquinte. barb. ☉ (méd.)

prophetarum L.
 anguria L.
 acutangulus L.
 lineatus Bosc.
 melo L.
 — saccharinus.
 — cantalou.
 — viridis.
 chate L.
 dudaim L.
 sativus L.
 — minor.
 flexuosus L.

CUCURBITA

leucantha Duchêne.
 — lagenaria.
 — latior.
 — pyrotecha.
 — longa.
 pepo L.
 — luteus.
 — viridis.
 melopepo L.
 — verrucosus.
 — aurantiiformis.
 — pyriformis.
 — clypeatus.
 — radiatus.
 citrullus L.

TRICHOSANTHES

anguina L.

Genera cucurbitaceis affinia.

PASSIFLORA.

1. *Foliis simplicibus.*

maliformis L.
 laurifolia L.
 quadrangularis L.
 serratifolia L.

2. *Foliis bilobis.*

rubra L.
 biflora Lmk.

des prophètes. arabic. ☉
 d'Amérique. ☉
 à angles aigus. inde. ☉
 strié. cayenne. ☉
 melon. asie. ☉ (alim., méd.)
 — brodé.
 — cantalou.
 — vert.
 abdelauui. égypte. ☉
 orange. Afr. s. ☉
 commun. orient. ☉ (alim.)
 — cornichon.
 serpent. inde. ☉

COURGE

à fleurs blanches. Am. m. ☉
 — cougourde.
 — gourde.
 — poire à poudre.
 — calebasse.
 pepon. ☉ (alim.)
 — potiron.
 — vert.
 mélopepon ☉ (alim.)
 — tuberculeux.
 — orange.
 — pyriforme.
 — bonnet d'électeur.
 — artichaut.
 pasteque. orient. ☉ (alim.)

TRICHOSANTHES

anguina. chine. ☉

Genres qui ont de l'affinité avec les Cucurbitacées.

GRENADILLE.

1. Feuilles simples.

à gros fruit. Am. m., s. ch. ☿
 à feuil. de laurier. Am. m.,
 s. ch. ☿
 quadrangulaire. Am. m., s. ch.
 ☿
 à feuil. en scie. Am. m., s. ch. ☿

2. Feuilles bilobées.

rouge. Am. m., s. ch. ☿
 à deux fleurs. Am. m., s. ch. ☿

3. *Foliis trilobis.*

punctata L.
lutea L.
suberosa L.
minima L.
heterophylla H. K.

longifolia Zmk.

holosericca L.
peltata Cav.
fœtida L.
incarnata L.

4. *Foliis multilobis.*

cœrulca L.

CARICA

papaya L.

monoïca Desf.

ORDO III.

URTICÆ.

I. *Flores in communi involucre monophyllo reconditi.*

FICUS

carica L.
 — *violacea*.
mauritiana Lmk.
scabra Jacq.
macrophylla.
laurifolia Lmk.

citrifolia Lmk.

crassincervia.

benghalensis L.
rubiginosa.
populifolia.

religiosa L.
racemosa L.
glaucophylla.
arbutifolia Lmk. }
pertusa L.f. }

3. Feuilles trilobées.

punctuée. Pérou, s. ch. ♀
jaune. Virginie, or. ♀
songueuse. Am. m., s. ch. ♀
à petites fleurs. Am. m., s. ch. ♀
à feuil. variables. Am. m.,
 s. ch. ♀
à longues feuilles. Am. m.,
 s. ch. ♀

veloutée. Mexique, s. ch. ♀
enbouclier. Am. m., s. ch. ♀
fétide. Am. m. ☉
incarnate. Am. m., s. ch. ♀

4. Feuilles à plus de trois lobes.

bleue. Brésil, or. ♀ (orn.)

PAPAYER

commun. Am. m., s. ch. ♀
 (écon., méd.)
monoïque. s. ch. ♀

ORDRE III.

LES ORTIES.

I. Fleurs renfermées dans un involucre monophylle.

FIGUIER

cultivé. F. m. ♀ (écon.)
 — *violet*.
de l'Ile-de-France. s. ch. ♀
à feuil. rudes. Inde, s. ch. ♀
à grandes feuil. N. Holl., or. ♀
à feuil. de laurier. Am. m.,
 s. ch. ♀
à feuil. de citronier. Am. m.,
 s. ch. ♀
à grosses nervures. Am. m.,
 s. ch. ♀
du Bengale. s. ch. ♀
rouillé. N. Holl., or. ♀
à feuil. de peuplier. Am. m.,
 s. ch. ♀
des pagodes. Inde, s. ch. ♀
à grappes. Inde, s. ch. ♀
glauque. s. ch. ♀
à feuil. d'arbusier. Am. m.,
 s. ch. ♀

pumila L.
benjamina L.
scandens Lmk.

réticulé. chine, s. ch. ♪
à feuell. striées. inde, s. ch. ♪
sarmenteux. Am. m., s. ch. ♪

DORSTENIA

contrayerva L.

DORSTENIA

contrayerva. Am. m., s. ch. ♡
(méd.)

II. Flores receptaculo communi multifloro
impositi, aut squamis involucrantibus
capitati, aut distincti sparsi.

II. Fleurs sur un réceptacle commun,
ou réunies en une tête accompagnée
d'écaillés, ou bien distinctes et éparses.

CECROPIA

peltata L.

CÉCROPIA

en bouclier. Am. m., s. ch. ♪

ARTOCARPUS

incisa L.

JAQUIER

arbre à pain. taïti, s. ch. ♪
(alim.)
à feuell. entières. Am. m., s. ch.
♪

integrifolia L.

MORUS

alba L.
italica Lmk.
constantinopolitana.
nigra L.
rubra L.

MURIER

blanc. Asie min. ♪ (écon.)
d'Italie. ♪ (écon.)
de Constantinople. ♪ (écon.)
noir. Asie min. ♪ (écon.)
rouge. Am. s. ♪ (écon.)

BROUSSONETIA

papyrifera L'Her. }
morus papyrifera L. }

BROUSSONÉTIA

mûrier à papier. chine. ♪
(orn., écon.)

URTICA.

1. Foliis alternis.

baccifera L.
nivea L.
canadensis L.
pumila L.

1. Feuilles alternes.

baccifère. Am. m., s. ch. ♪
cotonneuse. inde, or. ♪
de Canada. ♡
naine. Am. s. ♡

2. Foliis oppositis.

cylindrica L.
cannabina L.
dioïca L.
urens L.
pilulifera L.
dodartii L.

2. Feuilles opposées.

cylindrique. Am. s. ♡
de Sibérie. ♡ (écon.)
dioïque. F. ♡
grêche. F. ⊙
à globules. F. m. ⊙
de Dodart. ⊙

FORSKALEA

tenacissima L.
angustifolia Retz.

FORSKALÉA

à larges feuell. barbarie. ⊙
à feuell. étroites. Afr. ⊙

PARIETARIA

officinalis L.

PARIÉTAIRE

officinale. F. ♡ (méd.)

judaïca L.
 lusitanica L.
 cretica L.
 arborea l'Her.
 urtica arborea L. f. }

de Judée. F. ♀
 de Portugal. ☉
 de Crète. ♀
 en arbre. canaries, or. ♀

HUMULUS
 lupulus L.

HOUBLON
 cultivé. F. ♀ (écon.)

CANNABIS
 sativa L.

CHANVRE
 cultivé. inde. ☉ (écon.)

THELIGONUM
 cynocrambe L.

THÉLIGONUM
 cynocrambé. F. ☉

DATISCA
 cannabina L.

DATISCA
 chanvre de Crète. orient. ♀

Genera Urticis affinia.

Genres qui ont de l'affinité avec les Orties.

PIPER
 medium Jacq.
 cuneifolium Jacq.
 magnoliæfolium Jacq.

POIVRE
 moyen. Am. m., s. ch. ♀
 cuneiforme. Am. m., s. ch. ♀
 à feuell. de magnolia. Am. m.,
 s. ch. ♀
 à feuilles obtuses. Am. m.,
 s. ch. ♀
 à longs épis. Am. m., s. ch. ♀
 pointu. Am. m., s. ch. ♀
 luisant. Am. m., s. ch. ☉
 rhomboïdal. s. ch. ♀
 vernissé. s. ch. ♀
 élégant. Am. m., s. ch. ♀

obtusifolium L.

blandum Jacq.

acuminatum L.

pellucidum L.

rhomboidale.

nitens.

pulchellum H. K.

IVA
 frutescens L.

IVA
 arbrisseau. virginie, or. ♀

AMBROSIA
 bidentata Mich.
 artemisiæfolia Lmk.
 maritima L.
 trifida L.

arborescens Lmk.

xanthium fruticosum L. f. }

franscria ambrosioides Cae. }

AMBROISIE
 à deux dents. Am. s. ♀
 à feuell. d'armoise. Am. s. ♀
 maritime. F. ♀
 à trois lobes. Am. s. ☉

en arbre. pérou, or. ♀

XANTHIUM
 strumarium L.
 orientale L.
 spinosum L.

LAMPOURDE
 commune. F. ☉
 d'orient. ☉
 épineuse. F. m. ☉

ORDO IV.

AMENTACEÆ.

I. Flores hermaphroditi.

FOTHERGILLA

- alnifolia L. f.
— lanceolata.

ULMUS

- campestris L.
— latifolia.
— suberosa.
pedunculata Fong. }
effusa Wild. }
americana L.
tomentosa.
pumila L.
chinensis.
crenata H. P. }
polygama Poiret. }
rhaniscarpinifolius Pallas. }

II. Flores diclines.

CELTIS

- australis L.
occidentalis L.
cordata H. P. }
crassifolia Lmk. }
tournefortii Lmk.

SALIX

- helix L.
purpurea L.
vitellina L.
alba L.
pentandra L.
triandra L.
babylonica L.
viminalis L.
amygdalina L.
hastata L.
aurita L.
capræa L.
— ulmifolia.
glauca L.
incubacea L.
arcanaria L.

ORDRE IV.

LES AMENTACÉES.

I. Fleurs hermaphrodites.

FOTHERGILLA

- à feuil. d'aune. Am. S. h
— lancéolé.

ORME

- champêtre. F. h (arts.)
— à larges feuilles.
— fongueux.
à longs pédoncules. F. h
d'Amérique. Am. S. h
cotonneux. Am. S. h
nain. Sibérie. h
de Chine. or. h
crênelé. Sibérie. h

II. Fleurs unisexuelles.

MICOUCOULIER

- de Provence. h (arts, orn.)
de Virginie. h (arts, orn.)
à feuil. en cœur. Am. S. h
(arts, orn.)
de Tournefort. orient. h

SAULE

- hélix. F. h
osier rouge. F. h (écon.)
osier jaune. F. h (écon.)
blanc. F. h (écon.)
à cinq étamines. F. h
à trois étamines. F. h
de Babylone. orient. h (orn.)
à longues feuil. F. h (écon.)
à feuil. d'amandier. F. h
hasté. F. h
auriculé. F. h
marceau. F. h
— à feuil. d'orme.
glauque. F. h
des dunes. F. h
des sables. F. h

lapponum *L.*
 lanata *L.*
 myrsinites *L.*
 retusa *L.*
 reticulata *L.*
 herbacea *L.*

de Laponie. *F.*, Alpes. ♪
laineux. *F.*, Alpes. ♪
myrsinitès. *F.* ♪
émoussé. *F.*, Alpes. ♪
réticulé. *F.*, Alpes. ♪
herbacé. *F.*, Alpes. ♪

POPULUS

alba *L.*
 — grisea.
 tremula *L.*
 tremuloïdes *Mich.*
 græca *H. K.*
 fastigiata. }
 dilatata *H. K.* }
 nigra *L.*
 monilifera *H. K.*
 virginiana *L.*
 angulata *L.*
 heterophylla *L.*
 balsamifera *L.*

PEUPLIER

blanc. *F.* ♪ (orn.)
 — grisaille.
tremble. *F.* ♪
faux tremble. *Am. S.* ♪
d'Athènes. *orient.* ♪ (orn.)
d'Italie. ♪ (orn.)
noir. *F.* ♪
de Canada. ♪ (orn.)
suisse. *Am. S.* ♪ (orn.)
de Caroline. ♪ (orn.)
argenté. *Am. S.* ♪ (orn.)
baumier. *Am. S.* ♪ (méd.)

MYRICA

gale *L.*
 cerifera *L.*
 pennsylvanica *Mich.*
 cordifolia *L.*
 quercifolia *L.*
 trifoliata. }
 rhus suaveolens *L.* }

MYRICA

galé. *F.* ♪
cirier de la Louisiane. ♪
 (écon.)
cirier de Pensylvanie. ♪
 (écon.)
à feuell. en cœur. *cap, or.* ♪
à feuell. de chêne. *cap, or.* ♪
à feuell. ternées. *Am. S.* ♪

BETULA

alba *L.*
 nigra *L.*
 lenta *L.*
 nana *L.*
 pumila *L.*

BOULEAU

blanc. *F.* ♪ (écon.)
noir, ou à canots. *Am. S.* ♪
 (écon.)
merisier. *Am. S.* ♪
nain. sibéric. ♪
à feuell. de marceau. *Am. S.* ♪

ALNUS

communis *L.*
 — laciniata.
 incana *H. K.*
 oblongata *H. K.*
 serrulata *H. K.*

AUNE

commun. *F.* ♪ (écon.)
 — lacinié.
blanc. *F.*, Alpes. ♪
à feuell. oblongues. *Eur.* ♪
à feuell. en scié. *Am. S.* ♪

CARPINUS

betulus *L.*
 — quercifolius.

CHARME

commun. *F.* ♪ (orn., écon.)
 — à feuell. de chêne.

virginiana Mill.
ostrea L.
orientalis Lmk.

de Virginie. h (écon.)
houblon. ital. h (orn.)
d'orient. h (orn.)

FAGUS

castanea L.
pumila L.
sylvatica L.
purpurea.

FAGUS

châtaignier. F. h (arts, alim.)
chincapin. Am. s. h (alim.)
hêtre. F. h (écon.)
pourpre. Am. s. h (orn.)

QUERCUS.

1. Foliis perennantibus.

phellos L.
virens H. K.
ilex L.
— integrifolia.
— longifolia.
suber L.
ballota Desf.

coccifera L.

2. Foliis deciduis.

pseudo suber Desf.
rubra L.
tinctoria Mich.
robur L.
— pedunculata.
— glomerata.
— villosa.
fastigiata Lmk.

cerris L.
— haliphæos.
— tomentosa.

ægylops L.
alba L.
prinus Mich.
insectoria Olivier.

CORYLUS

rostrata H. K.
avellana L.
— alba.
— rubra.
colurna L.

CHÊNE.

1. Feuilles persistantes.

à feuell. de saule. Am. s. h.
vert de Caroline. or. h
yeuse. F. m. h (écon.)
— à feuell. entières.
— à feuell. longues.
liège. F. m. h (écon.)
ballote, ou à glands doux.
barbarie. h (écon.)
au kermès. F. m. h (arts.)

2. Feuilles tombantes.

faux liège. barbarie, or. h
rouge. Am. s. h (écon.)
quercitron. Am. s. h (arts.)
rouvre. F. h (écon.)
— à longs pédoncules.
— à trochets.
— velu.
pyramidal, ou cyprès. F., py-
rénées. h
cerris. F. h
— de Bourgogne.
— de l'Angoumois, ou taus-
sin.
vélani. orient. h (arts.)
blanc. Am. s. h
à feuell. de châtaigner. Am. s. h
à la noix de galle. orient. h
(écon.)

NOISETTIER

cornu. Am. s. h
commun. F. h (écon.)
— avelinier blanc.
— avelinier rouge.
de Byzance. h (écon.)

LIQUIDAMBAR

styraciflua L.
imberbe H. K.

COMPTONIA *l'Her.*

asplenifolia *l'Her.*

PLATANUS

orientalis L.
— acerifolia.
occidentalis L.

COPALME

d'Amérique. Am. s. h (méd.)
d'orient. h

COMPTONIA

à fenill. d'asplénium. Am. s. h

PLATANE

d'orient. h (orn.)
— à fenill. d'érable.
d'occident. Am. s. h (orn.)

ORDO V.

CONIFERÆ.

I. *Calix staminifer.*

EPHEDRA

monostachia L.
distachia L.
altissima Desf.

CASUARINA

equisetifolia L. f.
torulosa H. K.
stricta H. K.

TAXUS

baccata L.

II. *Calix nullus, squamæ staminifera.*

PODOCARPUS

elongata *l'Her.* }
taxus elongata H. K. }

JUNIPERUS

communis L.
— suecica.
oxycedrus L.
drupacea Bill.
bermudiana L.
virginiana L.
phoenicea L.
sabina mas C. B.
sabina foemina C. B.
thurifera H. K.
prostrata Michx.

ORDRE V.

LES CONIFÈRES.

I. Calice renfermant les étamines.

EPHÉDRA

à un épi. sibérie. h
à deux épis. F. h
élevé. barbarie, or. h

CASUARINA

à feuil. de préle. inde, s.ch. h
tuberculeux. N. Holl., or. h
ramassé. N. Holl., or. h

IF

commun. F., Alpes. h

II. Calice nul, écailles staminifères.

PODOCARPUS

allongé. cap, or. h.

GENÉVRIER

commun. F. h (écon.)
— de Suède.
cade. F. h (écon.)
à gros fruit. syrie, or. h
des Bermudes. h
de Virginie. h (orn.)
de Phénicie. F. m. h (orn.)
sabine mâle. F. h (méd.)
sabine femelle. F. h (méd.)
à l'encens. Eur. h
couché. Am. s. h

CUPRESSUS

sempervirens L.
 — horizontalis.
 pendula *l'Her.* }
 lusitanica *Mill.* }
 disticha L.
 thuyoides L.
 juniperoïdes L.

THUYA

occidentalis L.
 orientalis L.
 articulata *Vahl.*

PINUS

sylvestris L.
 — rubra.
 laricio. }
 pinaster *H. K.?* }
 montana *H. K.*
 maritima *Link.*
 pinca L.
 halepensis *Mill.*
 taeda L.
 echinata *Mill.*
 inops *H. K.*
 palustris *Mill.*
 strobus L.
 cembro L.

ABIES (*Pinus* L.)

taxifolia. }
 pinus picea L. }
 balsamea L.
 canadensis L.

nigra *H. K.*

alba *H. K.*

picea. }

pinus abies L. }

LARIX (*Pinus* L.)

europæa L.
 americana. *Mich.*
 cedrus L.

CYPRESS

pyramidal. crête. ♪ (orn.)
 — étalé.

pendant. Goa, or. ♪

chauve. Am. s. ♪ (écon.)

faux thuya. Am. s. ♪

faux genévrier. cap, or. ♪

THUYA

d'occident. Am. s. ♪ (orn.)

de la Chine. ♪ (orn.)

articulé. Barbarie, or. ♪

PIN

de Genève. F. ♪ (écon.)

— rouge d'Ecosse.

laricio. corse. ♪ (écon.)

mugo. F., Alpes. ♪

maritime. F. ♪ (écon.)

à pignons. F. m. ♪ (écon.)

d'Alep, ou de Jérusalem.

F. m., or. ♪

taeda. Am. s. ♪

épineux. Am. s. ♪

de Virginie. ♪

de marais. caroline, or. ♪

de Weinouth. Am. s. ♪ (orn.)

cembro. F., Alpes. ♪

SAPIN

argenté. F. ♪ (écon.)

baumier de Gilead. Am. s. ♪

hemlock - spruce. Am. s. ♪

(écon.)

épinette noire. Am. s. ♪

épinette blanche. Am. s. ♪

épicia. F., Alpes. ♪ (écon.)

MÈLÈZE

d'Europe. F., Alpes. ♪ (écon.)

d'Amérique. ♪

cèdre du Liban. Asie min. ♪

(orn., écon.)

GENERA INCERTÆ SEDIS.

ARDISIA swartz (Badula Juss.)
crenulata Vent.

CHLORANTHUS l'Her.
inconspicuus l'Her.

AZIMA Lmk.
tetracantha Lmk.
monetia barlerioïdes l'Her. }

MONOTROPA
hypopithys L.

DIONÆA
muscipula L.

EUCLEA
racemosa L.

ARISTOTELIA l'Her.
maqui l'Her.

SARRACENIA
purpurea L.
flava L.

BEGONIA
nitida H. K.
obliqua l'Her.
minor Jacq.
purpurea swartz.
hirsuta Aublet. }

SAMYDA
serrulata swartz.

CORIARIA
myrtifolia L.

PANDANUS
odoratissimus L.f.

BILLARDIERA.
scandens Smith.

VISNEA
mocanera L.f.

GENRES NON CLASSÉS.

ARDISIA
crênelé. Am. m., s. ch. h

CHLORANTHUS
à petites fleurs. chine, s. ch. h

AZIMA
à quatre épines. inde, s. ch. h

MONOTROPA
hypopitys. F. ψ

DIONÉE
gobe-mouche. caroline, or. ψ

EUCLÉA
à grappes. cap, or. h

ARISTOTÉLIA
maqui. chili, or. h

SARRACÉNIA
pourpre. Am. s. ψ
jaune. Am. s. ψ

BÉGONIA
luisant. Antilles, s. ch. ψ
hérissé. cayenne, s. ch. ψ

SAMYDA
à feuell. en scie. Am. m., s. ch. h

REDOUL
à feuell. de myrte. F. m. h

VACOUA
odorant. s. ch. h

BILLARDIÈRA.
sarmenteux. N. Holl., s. ch. h

VISNÉA
mocanéra. canaries, or. h

APPENDIX.

POLYPODIUM
decompositum.

ARUM
seguinum L.

POTHOS
cordata L.
lanceolata L.

CINNA
arundinacea L.

PANICUM
miliaceum L.
— nigrum.

AGROSTIS
serotina L. Mant.
festuca serotina L. sp. }

FESTUCA
alopecuros Vahl.
philcoides Desf.
macrostachya.

POA
glomerata.

ERHARTA
panicca Smith.
erecta Lmk.
stipoides Will. }

SMILAX
oblongata Swartz.

dulcis.

RAJANIA
cordata L.

COMMELINA
benghalensis L.

TRADERSCANTIA
cristata Jacq.
commelina cristata L. }

YUCCA
boschii.

APPENDIX.

POLYPODE
décomposé. N. Holl., or. ψ

ARUM
venéneux. Am. m., s. ch. ψ

POTHOS
en cœur. Am. m., s. ch. ψ
lancéolé. Am. m., s. ch. ψ

CINNA
roseau. Am. s. ψ

PANIS
millet. inde ☉ (écon.)
— noir.

AGROSTIS
d'automne. F. m. ψ

FESTUCA
plumeux. barbaric, or. ψ
à épis. F. ☉
à grands épis. ψ

POA
aggloméré. inde. ψ

ERHARTA
à fleurs de panis. cap, or. ψ
à fleurs de stipa. N. Holl., or. ψ

SMILAX
à feuell. oblongues. Am. m.,
s. ch. ψ
sucré. N. Holl., or. ψ

RAJANIA
en cœur. Am. m., s. ch. ψ

COMMELINE
du Bengale. s. ch. ψ

ÉPHÉMÈRE
à crêtes. ceylan, s. ch. ψ

YUCCA
de Bosc. s. ch. ψ

BULBOCODIUM verum <i>L.</i>	BULBOCODE <i>printanier. F. ψ</i>
PANCRATIUM amœnum <i>salisb.</i>	PANCRATIUM <i>élegant. guyane, s. ch. ψ</i>
HELICONIA humilis <i>jacq.</i>	HÉLICONIA <i>à feuell. de balisier. am. m., s. ch. ψ</i>
ARISTOLOCHIA indica <i>L.</i>	ARISTOLOCHE <i>des Indes. s. ch. ψ</i>
PASSERINA grandiflora <i>L.</i> spicata <i>L. f.</i>	PASSÉRINE <i>à grandes fleurs. cap, or. ψ à épis. cap, or. ψ</i>
BANKSIA grandis <i>willd.</i>	BANKSIA <i>sinué. n. holl., or. ψ</i>
ATRIPLEX albicans <i>H. K.</i>	ARROCHE <i>blanchâtre. cap, or. ψ</i>
CHENOPODIUM incisum.	ANSERINE <i>incisée.</i>
ERIOGONUM tonnentosum <i>mich.</i>	ÉRIOGONUM <i>colonneux. caroline, or. ψ</i>
CELOSIA paniculata <i>L.</i>	CÉLOSIA <i>paniculé. am. m., s. ch. ψ</i>
GOMPHRENA prostrata.	GOMPHRENA <i>couché.</i>
JUSTICIA spinosa <i>L.</i> nasuta <i>L.</i> coccinea <i>L.</i> paniculata <i>vahl.</i>	JUSTICIA <i>épineux. am. m., s. ch. ψ tubuleux. inde, s. ch. ψ écarlate. cayenne, s. ch. ψ paniculé. inde. ☉</i>
NOTELEA rigida. longifolia <i>vent.</i>	NOTÉLÉA <i>à feuell. coriaces. n. holl., or. ψ à longues feuell. mers du sud, or. ψ</i>
MONARDA purpurea.	MONARDA <i>pourpre. ψ</i>
LAVANDULA heterophylla.	LAVANDE <i>à feuell. variables. or. ψ</i>
MENTHA lavandulæfolia.	MENTHE <i>à feuell. de lavande. or. ψ</i>
STACHYS scordioïdes.	STACHYS <i>à feuell. de scordium. maroc, or. ψ</i>

OCYUM

cochleatum.

HORMINUM

caulescens *ortéga*.

COLUMNEA

hirsuta *swartz*.

SOLANUM

subrepandum.

vespertilio *H. K.*coagulans *Forsk.*

argenteum.

POGONIA

debilis *Andr.*

CORDIA

patagonula *H. K.*

VARRONIA

mollis.

TOURNEFORTIA

lucida.

ECHIUM

giganteum *L. f.*

ANCHUSA

hispida *Forsk.*

CYNOGLOSSUM

micranthum.

CONVOLVULUS

scoparius *L. f.*

TABERNÆMONTANA

angustifolia *H. K.*

STAPELIA

verrucosa *Masson.*

DIOSPYROS

obovata *Jacq.*

SONCHUS

pinnatus *H. K.*

LAGASCA

mollis *Cav.*

CENTAUREA

diffusa *Lmk.*

CONYZA

chrysocomoides *Desf.*

BASILIC

en cuiller. ☉

HORMIN

jaune. mexique, or. ♀

COLUMNEA

hérissé. am. m., s. ch. ♀

SOLANUM

festonné. am. m., s. ch. ♀*vespertilio.* canaries, or. ♀*coagulant.* arabie, s. ch. ♀*argenté.* s. ch. ♀

POGONIA

grêle. n. holl., or. ♀

CORDIA

des Patagons. or. ♀

VARRONIA

velouté. am. m., s. ch. ♀.

TOURNEFORTIA

luisant. am. m., s. ch. ♀

VIPÉRINE

gigantesque. canaries, or. ♀.

BUGLOSE

hérissée. égypte. ☉

CYNOGLOSSE

à petites fleurs.

LISERON

effilé. canaries, or. ♀

TABERNÆMONTANA

à feuell. étroites. am. s. ♀

STAPÉLIA

tuberculeux. cap, or. ♀

PLAQUEMINIER

ovale-renversé. s. ch. ♀

LAITRON

penné. madère, or. ♀

LAGASCA

velouté. la havane. ☉

CENTAURÉE

étalée. orient, or. ♀

CONYSE

chrysocome. barbarie, or. ♀

CALENDULA

chrysanthemifolia *vent.*flaccida *vent.*

ASTER

cymbalariae *H. K.*reflexus *L.*

OEDERA

prolifera *L.*

SPERMACOCE

rubra *Jacq.*

PLOCAMA

pendula *H. K.*

VAUGUERIA

commersonii.

APIUM

prostratum *Bill.*

BUPLEVRUM

difforme *L.*

DELPHINIUM

punicum *L. f.*

COSSIGNIA

pinnata *Lmk.*

ELÆOCARPUS

serratus *Vahl.*

OXALIS

rubella *Jacq.*

PAVONIA

parviflora.

HIBISCUS

radiatus *Willd.*

macrophyllus.

PELARGONIUM

abrotanifolium.

hirtum *Jacq.*tenuifolium *V. Her.*rapaceum *H. K.*

LARREA

nitida *Cav.*

RUTA

pinnata *L. f.*

SOUCI

à feuell. de chrysantème. cap,

or. 1.

rougeâtre. cap, or. 5

ASTER

cymbalaire. cap, or. 5

reflechi. cap, or. 5

OEDERA

prolifère. cap, or. 5

SPERMACOCÉ

rouge. ☉

PLOCAMA

fétide. canaries, or. 5

VAUGUERIA

de Commerson. île de F.,

s. ch. 5

APIUM

couché. N. holl., or. 5

BUPLEVRE

difforme. cap, or. 5

DELPHINIUM

ponceau. sibérie. 5

COSSIGNIA

à feuell. pennées. île de F.,

s. ch. 5

ELÆOCARPUS

à feuell. en scie. inde, or. 5

OXALIS

rouge. cap, or. 5

PAVONIA

à petites fleurs.

HIBISCUS

rayonné. ☉

à grandes feuilles. s. ch. 5

PELARGONE

à feuell. d'aurone. cap, or. 5

velu. cap, or. 5

à feuell. menues. cap, or. 5

à grosses racines. cap, or. 5

LARRÉA

luisant. BUÉNOs-AYRES, s. ch. 5

RUE

à feuell. pennées. canar., or. 5

CRASSULA*calycina.***SEDUM***sexfidum marsch.***LEPTOSPERMUM***lanigerum.***EUCALYPTUS***oppositifolia.**angustifolia.***DAVIESIA***denudata vent.**pultenea juncea wild.***MELASTOMA***cymosa vent.***HEDYSARUM***triquetrum L.**gangeticum L.***POMADERRIS***apetala Bill.***PITTOSPORUM***undulatum vent.**coriaceum Andr.***BURSERA***paniculata Lmk.***LOUREIRIA***cuneifolia Cav.**mozinna spathulata orièga.***MYRICA***serrata Lmk.***PLANERA***ulnifolia Michx.***CASUARINA***quadridentata.***PACHISANDRA***prostrata Michx.***BALANOPTERIS***tothila Gærtner.***CRASSULE***à grand calice. N. holl., or. ♀***SÉDUM***à six divisions.***LEPTOSPERMUM***laineux. N. holl., or. ♀***EUCALYPTUS***à feuell. opposées. N. holl., or. ♀**à feuell. étroites. N. holl., or. ♀***DAVIËSIA***à tiges nues. N. holl., or. ♀***MÉLASTOMA***corymbifère. Am. m., s. ch. ♀***SAINFOIN***triangulaire. Inde, s. ch. ♀**du Gange. s. ch. ♀***POMADERRIS***apétale. N. holl., or. ♀***PITTOSPORUM***ondulé. canaries, or. ♀**coriace. canaries, or. ♀***BURSÉRA***bois de colophane. île de F.,**s. ch. ♀***LOUREIRIA***cunéiforme. Mexique, s. ch. ♀***MYRICA***à feuell. en scie. Cap, or. ♀***PLANÉRA***à feuell. d'orme. Am. s. ♀***CASUARINA***à quatre dents. N. holl., or. ♀***PACHISANDRA***couché. Am. s. ♀***BALANOPTÉRIS***tothila. Inde, s. ch. ♀*

INDEX GENERUM.

A

Abies.	Page 216	Albuca.	Page 27
Abroma.	148	Alcea.	145
Abronia.	46	Alchimilla.	176
Abrus.	192	Aletris.	24
Acalypha.	207	Aleurites.	206
ACANTHI.	51	ALGÆ.	2
Acanthus.	<i>Ibid.</i>	Alisma.	25
Acer.	155	Allionia.	110
ACERA.	<i>Ibid.</i>	Allium.	27
Achillea.	105	Allophyllus.	155
Achras.	79	Alnus.	215
Achyranthes.	44	Aloe.	25
Aconitum.	126	Alopecurus.	11
Acorus.	8	Alpinia.	53
Acrosticum.	4	Alsine.	155
Actæa.	126	Alstroemeria.	28
Adansonia.	148	Althæa.	145
Adelia.	206	Alyssum.	151
Adenantha.	185	AMARANTHI.	45
Adiantum.	5	Amaranthus.	<i>Ibid.</i>
Adonis.	124	Amaryllis.	29
Adoxa.	164	Ambrosia.	211
Æcidium.	1	Amellus.	108
Ægilops.	14	AMENTACEÆ.	212
Ægiphila.	55	Amelhytea.	55
Ægopodium.	116	Ammi.	120
Æschynomene.	198	Amonum.	55
Æsculus.	155	Amorpha.	192
Æthusa.	118	Amygdalus.	179
Agaricus.	2	Amyris.	199
Agapanthus.	28	Anacardium.	198
Agave.	<i>Ibid.</i>	Anacyclus.	99
Ageratum.	98	Anagallis.	47
Agrimonia.	176	Anagyris.	184
Agriphyllum.	109	Anamœnia.	124
Agrostemma.	159	Anarrhinum.	65
Agrostis.	15 et 218	Anastatica.	155
Agynœia.	206	Achusa.	73 et 220
Aira.	14	Ancistrum.	176
Ajuga.	57	Andrachne.	206
Aizoon.	166	Andromeda.	83

Andropogon.	Page 14	Arnica.	Page 101
Androsace.	48	AROIDÆ.	7
Andryala.	90	Artedia,	121
Anemone.	123	Artemisia.	95
Anethum.	117	Artocarpus.	210
Angelica.	119	Arum.	8 et 218
Anona.	150	Arundo.	18
ANONÆ.	<i>Ibid.</i>	Asarum.	35
Anthemis.	104	Asclepias.	78
Anthericum.	25	ASPARAGI.	20
Anthistiria.	14	Asparagus.	<i>Ibid.</i>
Anthoceros.	3	Asperugo.	75
Antholyza.	31	Asperula.	111
Anthospermum.	112	Asphodelus.	26
Antioxanthum.	11	Asplenium.	5
Anthyllis.	187	Aster.	102 et 221
Antirrhinum.	65	Astragalus.	195
Aphyllantes.	22	Astrantia..	121
Apium.	117 et 221	Athamanta.	120
APOCYNÆ.	77	Athanasia.	99
Apocynum.	78	Atractylis.	92
Aquilegia.	125	Atragene.	125
Arabis.	128	Atraphaxis.	38
Arachis.	187	ATRIPLICES.	40
Aralia.	116	Atriplex.	42 et 219
ARALIÆ.	<i>Ibid.</i>	Atropa.	68
Arbutus.	85	Aucuba.	205
Arctium.	92	Avena.	18
Arctotis.	109	AURANTIA.	158
Ardisia.	217	Auricularia.	2
Arcca.	19	Axyris.	45
Arenaria.	156	Ayenia.	149
Arctia.	48	Aylantus.	199
Argemone.	126	Aytomia.	159
Aristolochia.	55 et 219	Azalea.	80
Aristotelia.	217	Azima.	217

B

Baccharis.	97	Bauhinia.	183
Balanites.	158	Befaria.	80
Balanopteris.	222	Begonia.	217
Ballota.	61	Bellis.	99
Balsamita.	94	Bellium.	100
Baltimora.	106	BERBERIDES.	150
Banisteria.	156	Berberis.	<i>Ibid.</i>
Banksia.	57 et 219	Beta.	42
Basella.	41	Betonica.	60

Betula.	Page 213	Bromus.	Page 16
Bidens.	108	Broussonetia.	210
Bignonia.	75	Browallia.	66
BIGNONIÆ.	<i>Ibid.</i>	Brucea.	200
Billardiera.	217	Brunia.	203
Biscutella.	131	Brunnichia.	38
Biserrula.	194	Brunsfelsia.	70
Bistropogon.	59	Bryonia.	207
Bixa.	152	Bryum.	3
Blasia.	3	Bubon.	118
Blechnum.	5	Bucida.	36
Blitum.	43	Budleia.	64
Bocconia.	127	Bufonia.	155
Boerhaavia.	46	Bulbocodium.	219
Boletus.	2	Bulliarda.	161
Boltonia.	102	Bunias.	133
Bombax.	148	Bunium.	120
Bontia.	70	Buphtalmum.	106
BORRAGINÆ.	<i>Ibid.</i>	Buplevrum.	121 et 221
Borago.	73	Bursera.	199 et 222
Boronia.	154	Butomus.	23
Bosea.	41	Buxbaumia.	3
Brassica.	128	Buxus.	206
Briza.	18	Byssus.	2
Bromelia.	29	Bytneria.	149

C

Cacalia.	97	CAMPANULÆ.	84
Cachrys.	120	Camphorosma.	41
CACTI.	164	Canarina.	84
Cactus.	165	Canna.	32
Cæsalpinia.	183	CANNÆ.	<i>Ibid.</i>
Cakile.	133	Cannabis.	211
Caladium.	8	CAPPARIDÆ.	134
Calceolaria.	66	Capparis.	<i>Ibid.</i>
Calca.	98	Capraria.	64
Calendula.	100 et 221	CAPRIFOLIA.	114
Calla.	8	Capsicum.	70
Callicarpa.	54	Cardamine.	130
Calligonum.	40	Cardiospermum.	135
Callitriche.	7	Carduus.	91
Caltha.	126	Carex.	9
Calycanthus.	180	Carica.	209
Calyptanthus.	171	Carissa.	78
Camellia.	138	Carlina.	92
Cameraria.	78	Carpesium.	95
Campanula.	84	Carpinus.	213

Carthamus.	Page 92	Chrysosplenium.	Page 164
Carum.	117	Cicer.	196
CARYOPHYLLÆ.	155	Cichorium.	90
Caryophyllus.	171	Cicuta.	118
Caryota.	19	Cinara.	92
Cassia.	182	Cineraria.	103
Cassine.	201	Cinna.	218
Casuarina.	215 et 222	Cireæa.	169
Catananche.	99	Cissampelos.	150
Catesbæa.	112	Cissus.	159
Caucalis.	120	CISTÏ.	152
Ceanothus.	202	Cistus.	<i>Ibid.</i>
Cecropia.	210	Citharexylum.	54
Cedrela.	159	Citrus.	158
Celastrus.	200	Clathrus.	1
Celosia.	44 et 219	Clavaria.	2
Celsia.	66	Claytonia.	166
Celtis.	212	Clematis.	122
Cenchrus.	14	Cleome.	154
Centaurea.	95 et 220	Cleonia.	65
Centunculus.	47	Clerodendrum.	55
Cephalanthus.	114	Clethra.	85
Gerastium.	156	Cliffortia.	176
Ceratonia.	182	Clinopodium.	62
Ceratophyllum.	6	Clitoria.	191
Cerbera.	78	Clusia.	137
Cercis.	185	Clutia.	206
Cercodea.	168	Clypeola.	151
Cerinthæ.	71	Cneorum.	199
Cestrum.	70	Cnieus.	91
Chærophylum.	117	Cobæa.	75
Chamærops.	19	Coccoloba.	58
Chara.	6	Cochlearia.	152
Cheiranthus.	129	Cocos.	19
Chelidonium.	127	Coffea.	115
Chelone.	75	Coix.	19
Chenopodium.	42 et 219	Colchicum.	25
Cherleria.	156	Colletia.	202
Chiococca.	115	Collinsonia.	57
Chionanthus.	52	Columnnea.	66 et 220
Chironia.	76	Colutea.	192
Chlora.	<i>Ibid.</i>	Comarum.	177
Chloranthus.	217	Commelina.	22 et 218
Chloris.	14	Comoeladia.	199
Chondrilla.	86	Comptonia.	215
Chrysanthemum.	100	Conserua.	2
Chrysocoma.	98	CONIFERÆ.	215
Chrysophyllum.	79	Conium.	120

Conocarpus.	Page 36	Crescentia.	Page 70
Convallaria.	21	Cressa.	75
CONVOLVULI.	73	Crinum.	28
Convolvulus.	75 et 220	Crithmum.	120
Conyza.	97 et 221	Crocus.	32
Corchorus.	151	Crotalaria.	186
Cordia.	70 et 220	Croton.	206
Coreopsis.	107	Crovea.	154
Coriandrum.	118	Crucianella.	112
Coriaria.	217	CRUCIFERÆ.	128
Coris.	47	Crypsis.	11
Corispermum.	45	Cucifera.	19
Cornucopiæ.	19	Cucubalus.	159
Cornus.	115	Cucumis.	207
Cornutia.	54	Cucurbita.	208
Coronilla.	197	CUCURBITACEÆ.	207
Coronopus.	152	Cuminum.	118
Correa.	154	Cupania.	135
Corrigiola.	166	Cuphea.	172
Cortusa.	48	Cupressus.	216
Corylus.	214	Curcuma.	35
Corypha.	19	Cuscuta.	75
Cosmos.	107	Cycas.	6
Cossignia.	221	Cyclamen.	48
Costus.	53	Cynanchum.	78
Cotula.	99	Cynoglossum.	75 et 220
Cotyledon.	161	Cynosurus.	15
Crambe.	153	CYPEROÏDEÆ.	9
Crassula.	161 et 222	Cyperus.	11
Cratægus.	173	Cypripedium.	54
Crepis.	88	Cytisus.	185

D

Dactylis.	15	Dentaria.	131
Dahlia.	106	Dianella.	20
Daïs.	37	Dianthus.	157
Dalbergia.	198	Dichondra.	71
Dalca.	188	Dictamnus.	154
Dalechampia.	207	Diervilla.	114
Daphne.	56	Digitalis.	66
Datisca.	211	Dillenia.	149
Datura.	67	Diodia.	112
Davallia.	5	Dionæa.	217
Daucus.	120	Dioscoræa.	21
Daviesia.	222	Diosma.	155
Decumaria.	171	Diospyros.	79 et 220
Delphinium.	125 et 221	Diotis.	99

DIPSACEÆ.	Page	109	Dorstenia.	Page	210
Dipsacus.	<i>Ibid.</i>		Draba.		152
Dirca.		36	Dracæna.		20
Disandra.		50	Dracocephalum.		62
Dodartia.		64	Dracontium.		8
Dodecatheon.		48	Drepania.		88
Dodonæa.		200	Drosera.		154
Dolichos.		191	Dryas.		177
Dombeya.		148	Duranta.		54
Doronicum.		101			

E

Ebenus.	187	Erharta.	218
Echinaria.	14	Erica.	81
Echinophora.	121	ERICÆ.	<i>Ibid.</i>
Echinops.	94	Erigeron.	102
Echioïdes.	75	Erinus.	50
Echites.	77	Ernodea.	113
Echium.	72 et 220	Erioccephalus.	100
Eclypta.	106	Eriogonum.	219
Ehretia.	71	Eriophorum.	10
ELÆAGNI.	55	Eriospermum.	27
Elæagnus.	36	Ervum.	196
Elæocarpus.	221	Eryngium.	122
Elaïs.	19	Erysimum.	129
Elatine.	156	Erythrina.	191
Elephantopus.	94	Erythronium.	24
Eleusine.	15	Erythroxylum.	136
Ellisia.	71	Eucalyptus.	171 et 222
Elymus.	15	Euclea.	217
Elytraria.	52	Eucomis.	26
Embothrium.	37	Eugenia.	171
Empetrum.	84	Evolvulus.	75
Encelia.	106	Evonymus.	200
Ephedra.	215	Eupatorium.	98
Epidendrum.	34	Euphorbia.	203
Epigæa.	84	EUPHORBIÆ.	<i>Ibid.</i>
Epilobium.	169	Enphoria.	155
Epimedium.	150	Euphrasia.	50
Equisetum.	6		

F

Faba.	196	Fagus.	214
Fabricia.	170	Ferraria.	50
Fagara.	200	Ferula.	119
Fagonia.	154	Festuca.	17 et 218

FICOIDEÆ.	Page 166	Forskalea.	Page 210
Ficus.	209	Fothergilla.	212
Filago.	96	Fragaria.	177
FILICES.	4	Frankenia.	160
Fissilia.	158	Fraxinus.	52
Flacurtia.	151	Fritillaria.	24
Flagellaria.	20	Fuchsia.	170
FLOSCULOSÆ.	91	Ficus.	2
Fontanesia.	52	Funaria.	127
Fontinalis.	3	FUNGI.	1

G

Gaillarda.	108	Globba.	52
Galanthus.	29	Globularia.	48
Galaxia.	31	Glycine.	192
Galega.	194	Glycyrrhiza.	194
Galenia.	41	Gnaphalium.	96
Galeopsis.	60	Gnidia.	57
Galinsoga.	108	Gomphrena.	44 et 219
Galium.	111	Goodenia.	86
Gardenia.	113	Gordonia.	148
Garidella.	125	Gorteria.	101
Gaultheria.	84	Gossypium.	148
Gaura.	169	Gouania.	205
Genipa.	115	GRAMINEÆ.	11
Genista.	184	Grangea.	95
Gentiana.	76	Gratiola.	66
GENTIANÆ.	<i>Ibid.</i>	Grewia.	151
Geoffræa.	198	GUAIACANÆ.	79
GERANIA.	140	Guaiacum.	154
Geranium.	140 et 221	Guarea.	159
Geropogon.	90	Guazuma.	148
Gesneria.	85	Guettarda.	115
Gemm.	177	Guilaudina.	185
Githago.	159	Gundelia.	94
Gladiolus.	51	GUTTIFERÆ.	157
Glaux.	172	Gymnocladus.	182
Glecoma.	60	Gymnostyles.	95
Gleditsia.	182	Gypsophila.	157
Glinus.	166		

H

Hæmānthus.	28	Halleria.	64
Hæmatoxylum.	183	Hamamelis.	150
Hakea.	57	Hamelia.	115
Halesia.	80	Hasselsquistia.	12

Hebenstreitia.	Page 55	Hippuris.	Page 6
Hedera.	116	Hoffmenseggia.	183
Hedychium.	33	Holcus.	15
Hedysarum.	197 et 222	Holosteum.	155
Helenium.	101	Homalium.	180
Helianthemum.	152	Hopea.	80
Helianthus.	107	Hordeum.	15
Heliconia.	32 et 219	Horminum.	65 et 220
Helicteres.	149	Hortensia.	115
Heliocarpus.	151	Hottonia.	47
Heliotropium.	72	Houstonia.	112
Helleborus.	125	Humulus.	211
Helminthia.	89	Hura.	207
Helonias.	23	Hyacinthus.	26
Helvella.	2	Hydnum.	2
Hemerocallis.	28	Hydrangea.	164
Hemitomus.	66	HYDROCHARIDES.	34
HEPATICÆ.	3	Hydrocharis.	<i>Ibid.</i>
Hieracium.	119	Hydrocotyle.	122
Hermannia.	151	Hydrophyllum.	71
Hernandia.	58	Hymenæa.	183
Herniaria.	45	Hyosciamus.	67
Hesperis.	129	Hyoseris.	89
Heterosperma.	108	Hypecoum.	127
Heuchera.	163	HYPERICA.	137
Hibiscus.	147 et 221	Hypericum.	<i>Ibid.</i>
Hieracium.	87	Hypnum.	3
Hippia.	95	Hypocharis.	90
Hippocratea.	156	Hypoxis.	29
Hippocrepis.	197	Hyptis.	60
Hippomane.	207	Hyssopus.	58
Hippophae.	56		

I

Jasione.	86	Iresine.	44
JASMINEÆ.	52	IRIDES.	50
Jasminum.	55	Iris.	<i>Ibid.</i>
Jatropha.	206	Isatis.	134
Jberis.	152	Isuardia.	172
Jlex.	201	Isoëtes.	6
Jilceebrium.	44	Isopyrum.	125
Illicium.	149	Itea.	80
Impatiens.	145	Iva.	211
Imperatoria.	117	Juglans.	200
Indigofera.	194	Junci.	22
Inula.	101	Juncus.	<i>Ibid.</i>
Ipomæa.	74	Jungermannia.	3

Juniperus.
Jussiaea.
Justicia.

Page 215 Ixia.
169 Ixora.
51 et 219

Page 31
113

K

Kæmpferia.
Kalankoe.
Kalmia.
Kiggellaria.
Killigia.

55 Kirganelia.
161 Kitaibelia.
80 Knautia.
205 Koelreuteria.
11 Kuhnia.

205
144
110
135
98

L

LABIATÆ.
Lachenalia.
Lactuca.
Lagasca.
Lagerstromia.
Lagoëcia.
Lagunea.
Lagurus.
Lamium.
Lampsana.
Lantana.
Larix.
Larrea.
Laserpitium.
Lasiopetalum.
Latania.
Lathræa.
Lathyrus.
Lavandula.
Lavatera.
LAURI.
Laurus.
Lausonia.
Ledum.
Leersia.
LEGUMINOSÆ.
Lemna.
Leontodon.
Leonurus.
Lepidium.
Leptospermum.
Lessertia.
Leucoium.
Lichen.

55 Ligusticum.
26 Ligustrum.
86 LILIA.
220 Lilium.
172 Limodorum.
122 Limonia.
147 Limosella.
15 Linaria.
60 Lindernia.
86 Linnæa.
54 Linum.
216 Liquidambar.
221 Liriodendrum.
119 Lithospermum.
203 Littorella.
19 Lobelia.
51 Lolium.
195 Loniceræ.
59 et 219 Lopezia.
145 Lotus.
38 Loureiria.
Ibid. Lunaria.
172 Lupinus.
80 Lychnis.
12 Lycium.
180 Lycoperdon.
7 Lycopodium.
89 Lycopsis.
61 Lycopus.
153 Lygeum.
170 Lysimachia.
192 LYSIMACHIÆ.
29 Lythrum.
2

119
53
24
Ibid.
34
158
48
64
66
114
160
215
149
72
45
85
15
114
169
190
222
151
186
159
70
1
3
75
55
18
47
Ibid.
172

M

Madia.	Page 100	Mesembryanthemum.	Page 167
Magnolia.	149	Mespylus.	174
MAGNOLIE.	<i>Ibid.</i>	Messerschmidia.	71
Mahernia.	151	Methonica.	24
Malachra.	145	Metrosideros.	170
Malope.	144	Michauxia.	84
Malpighia.	156	Micropus.	96
MALPIGHIE.	<i>Ibid.</i>	Milium.	12
Malva.	144	Milleria.	100
MALVACEÆ.	<i>Ibid.</i>	Mimosa.	180
Malvaviscus.	147	Mimulus.	66
Malus.	173	Minuartia.	155
Mammica.	157	Mirabilis.	46
Mangifera.	198	Mitchella.	114
Manulea.	50	Mitella.	164
Maranta.	55	Mœrtingia.	156
Marchantia.	5	Mogorium.	53
Marrubium.	61	Motucella.	61
Marsilea.	6	Mollugo.	155
Martynia.	76	Momordica.	207
Matricaria.	99	Monarda.	55 et 219
Medeola.	20	Monotropa.	217
Medicago.	189	Monsonia.	145
Melaleuca.	170	Montia.	166
Melampyrum.	51	Moræa.	50
Melastoma.	172 et 222	Morina.	109
MELASTOMEÆ.	172	Moringa.	185
Melia.	159	Morus.	210
MELLE.	<i>Ibid.</i>	Mucor.	1
Melianthus.	154	Murraia.	158
Melica.	15	Musa.	52
Melicocca.	135	MUSE.	<i>Ibid.</i>
Melilotus.	188	Muscari.	26
Melissa.	62	Musci.	5
Mellitis.	65	Myagrurn.	155
Melochia.	148	Myosotis.	75
Melothria.	207	Myosurns.	125
MENISPERMA.	150	Myrica.	215 et 222
Menispermum.	<i>Ibid.</i>	Myriophyllum.	168
Mentha.	59 et 219	Myristica.	58
Menziesia.	80	Myrsine.	79
Menyanthes.	49	Myrti.	170
Mercurialis.	205	Myrtus.	171
Merendera.	25		

N

Naiades.	Page 6	Nicandra.	Page 68
Naias.	7	Nicotiana.	67
Napæa.	146	Nidularia.	2
NARCISS.	28	Nigella.	125
Narcissus.	29	Nitraria.	166
Nardus.	18	Nolana.	73
Narthecium.	25	Notelæa.	219
Nemesia.	65	NYCTAGINES.	46
Nepeta.	58	Nymphæa.	53
Nerium.	77	Nyssa.	56

O

Oelna.	149	ORCHIDEÆ.	33
Ocymum.	65 et 220	Orchis.	<i>Ibid.</i>
OEdera.	221	Origanum.	62
OEnanthe.	118	Ornithogalum.	27
OEnothera.	169	Ornithopus.	196
Oldenlandia.	112	Orobanche.	51
Olea.	52	Orobis.	193
ONAGRÆ.	168	Ortega.	155
Onoclea.	4	Oryza.	18
Ononis.	187	Osmunda.	4
Onopordon.	92	Osteospermum.	100
Onosma.	72	Osyris.	56
Opercularia.	114	Othomna.	104
Ophioglossum.	4	Oxalis.	145
Ophrys.	54	Oxytropis.	195

P

Pachisandra.	222	Paris.	21
Pæderia.	113	Parkinsonia.	182
Pæonia.	126	Parnassia.	154
Palava.	144	Paronychia.	44
Paliurus.	202	Parthenium.	106
Pallasia.	40	Paschalia.	108
PALME.	19	Paspalum.	12
Panax.	116	Passerina.	57 et 219
Pancratium.	29 et 219	Passiflora.	268
Pandanus.	217	Pastinaca.	117
Panicum.	12 et 218	Paullinia.	155
Papaver.	127	Pavonia.	145 et 221
PAPAVERANCEÆ.	126	Pectis.	101
Parietaria.	210	PEDICULARES.	49

Pedicularis.	Page 50	Platanus.	Page 215
Peganum.	154	Platilobium.	184
Pentapetes.	148	Plectrantus.	63
Penthorum.	165	Plocama.	221
Peplis.	172	PLUMBAGINES.	46
Perilla.	59	Plumbago.	<i>Ibid.</i>
Periploca.	78	Plumeria.	77
Petiveria.	41	Poa.	17 et 218
Peucedanum.	119	Podalyria.	184
Peziza.	2	Podocarpus.	215
Phaca.	195	Podophyllum.	126
Phalangium.	26	Pogonia.	220
Phalaris.	12	Poinciana.	183
Phallus.	2	POLEMONIA.	75
Pharnaceum.	155	Polemonium.	<i>Ibid.</i>
Phaseum.	3	Polianthes.	28
Phaseolus.	191	Polycarpon.	155
Phellandrium.	118	Polycarpea.	<i>Ibid.</i>
Philadelphus.	172	Polycnemum.	41
Phillyrea.	53	Polygala.	49
Phleum.	12	Polygonatum.	21
Philomis.	61	POLYGONEÆ.	38
Phlox.	75	Polygonum.	39
Phoenix.	19	Polymnia.	106
Phormium.	26	Polypodium.	4 et 218
Phylica.	202	Polypogon.	13
Phyllanthus.	205	Polytrichum.	5
Phyllis.	112	Pomaderris.	222
Physalis.	68	Pontederia.	32
Phyteuma.	85	Populus.	213
Phytolacca.	40	Portesia.	139
Picridium.	89	Portulaca.	165
Picris.	<i>Ibid.</i>	PORTULACEÆ.	<i>Ibid.</i>
Pittosporum.	222	Portulacaria.	166
Pilularia.	6	Potamogeton.	7
Pimpinella.	116	Potentilla.	176
Pinguicula.	49	Poterium.	175
Pinkneia.	112	Pothos.	8 et 218
Pinus.	216	Prasium.	64
Piper.	211	Prenanthes.	86
Piscidia.	192	Primula.	48
Pisonia.	46	Prinos.	201
Pistacia.	199	Proserpinaca.	168
Pism.	195	Protea.	37
Pitcairnia.	25	PROTEÆ.	<i>Ibid.</i>
Planera.	222	Prunella.	63
PLANTAGINES.	45	Prunus.	178
Plantago.	<i>Ibid.</i>	Psidium.	171

Psoralea.	Page 188	Pulmonaria.	Page 72
Psychotria.	113	Pultenæa.	184
Ptelea.	200	Punica.	171
Pteranthus.	41	Pyrola.	83
Pteris.	5	Pyrus.	173
Pterocarpus.	198		

Q

Quercus.	214	Queria.	155
----------	-----	---------	-----

R

RADIATÆ.	99	Ribes.	164
Rafnia.	186	Riceia.	5
Rajania.	218	Rieinus.	206
Randia.	112	Ricotia.	131
RANUNCULACEÆ.	122	Rivina.	41
Ranunculus.	124	Robinia.	192
Raphanus.	128	Rondeletia.	113
Ravenala.	52	Rosa.	174
Rauvolfia.	78	ROSACEÆ.	175
Reaumuria.	166	Rosmarinus.	55
Redutea.	147	Rottbollia.	14
Reseda.	154	Royena.	79
Reticularia.	1	Rubentia.	201
Rhagadiolus.	86	Rubia.	112
RHAMNI.	200	RUBIACEÆ.	111
Rhamnus.	201	Rubus.	178
Rhapis.	20	Rudbeckia.	107
Rheum.	40	Ruellia.	51
Rhinantus.	51	Rumex.	59
RHODODENDRA.	80	Ruppia.	7
Rhododendrum.	<i>Ibid.</i>	Ruseus.	21
Rhodora.	<i>Ibid.</i>	Ruta.	154 et 221
Rhus.	198	RUTÆ.	154

S

Sabal.	19	Salvinia.	6
Saccharum.	15	Sambucus.	115
Sagina.	155	Samolus.	49
Sagittaria.	25	Samyda.	217
SALICARÆ.	172	Sanguinaria.	126
Salieornia.	45	Sanguisorba.	175
Salix.	212	Sanicula.	121
Salsola.	41	Sansevieria.	24
Salvia.	55	Santolina.	99

Sanvitalia.	Page 107	Sesuvium.	Page 166
SAPINDI.	135	Sherardia.	11
Sapindus.	<i>Ibid.</i>	Sibbaldia.	176
Sapinum.	207	Sibthorpia.	50
Saponaria.	157	Sicyos.	207
SAPOTÆ.	79	Sida.	146
Sarothra.	160	Sideritis.	59
Sarracenia.	217	Sideroxylum.	79
Satureia.	58	Sigesbeckia.	106
Satyrrium.	34	Silene.	158
Saururus.	7	Silphium.	106
Saxifraga.	163	Sinapis.	128
SAXIFRAGÆ.	<i>Ibid.</i>	Sison.	118
Scabiosa.	109	Sisymbrium.	150
Scandix.	117	Sisyrinchium.	30
Scheuchzeria.	25	Sium.	118
Schinus.	199	Smilacina.	21
Schœnus.	10	Smilax.	21 et 218
Scilla.	27	Smyrnum.	117
Scirpus.	10	Solandra.	68
Scleranthus.	166	SOLANÆ.	66
Sclerocarpus.	106	Solanum.	68 et 220
Scolymus.	90	Soldanella.	48
Scoparia.	64	Solidago.	103
Scorpiurus.	196	Sonchus.	87 et 220
Scorszonera.	89	Sophora.	184
Scotia.	182	Sorbus.	174
Scrophularia.	64	Spaendonca.	185
SCROPULARIÆ.	<i>Ibid.</i>	Sparganium.	9
Scutellaria.	65	Spartium.	185
Secale.	16	Spergula.	156
Securidaca.	198	Spermacoce.	112 et 221
Sedum.	162 et 222	Sphæranthus.	94
Selago.	55	Sphæria.	1
Selinum.	120	Sphagnum.	5
SEMIFLOSCULOSÆ.	86	Spielmannia.	54
SEMPERVIVÆ.	160	Spigelia.	77
Sempervivum.	162	Spilanthus.	108
Senebiera.	152	Spinacia.	42
Senecio.	105	Spiraea.	178
Serapias.	34	Splachnum.	5
Serjania.	155	Spondias.	199
Seriola.	90	Stachys.	60 et 219
Serissa.	115	Stachelia.	92
Serratula.	92	Stapelia.	77 et 220
Sesamum.	75	Staphylea.	200
Seseli.	117	Statice.	46
Sesleria.	15	Stellaria.	157

Stellera.	Page 57	Stuartia.	Page 148
Sterculia.	149	Styrax.	80
Stevia.	98	Swertia.	76
Stipa.	15	Swietenia.	159
Stratiotes.	54	Symphoricarpos.	114
Strelitzia.	52	Symphytum.	72
Struthiola.	57	Syringa.	52
Strychnos.	78		

T

Tabernæmontana.	77 et 220	Tordylium.	121
Tagetes.	101	Tormentilla.	176
Talinum.	165	Tournefortia.	71 et 220
Tamarindus.	180	Trachelium.	85
Tamarix.	166	Tradescantia.	22 et 218
Tannus.	21	Tragia.	207
Tanacetum.	95	Tragopogon.	90
Taraxacum.	89	Tragus.	14
Tarchonanthus.	99	Trapa.	168
Taxus.	215	Tremella.	2
Tectona.	54	Trianthes.	166
Telephium.	166	Tribulus.	154
TEREBINTHACÆ.	198	Trichia.	1
Terminalia.	56	Trichilia.	159
Ternstroemia.	158	Trichomanes.	5
Tetragonia.	168	Trichosanthes.	208
Teucrium.	57	Trientalis.	48
Thalia.	55	Trifolium.	188
Thalictrum.	125	Triglochin.	25
Thapsia.	117	Trigonella.	190
Thea.	158	Trigonina.	156
Theligonum.	211	Trillium.	20
Theobroma.	148	Triopteris.	156
Theophrasta.	79	Triosteum.	114
Thesium.	55	Tripsacum.	14
Thlaspi.	152	Triticum.	16
Thuya.	216	Triumfetta.	151
Tymbra.	62	Trollius.	125
THIMELEÆ.	56	Tropæolum.	145
Thymus.	62	Tuber.	1
Tiarella.	164	Tulipa.	24
Tigridia.	50	Turnera.	166
Tilia.	152	Turritis.	128
TILIACÆ.	151	Tussilago.	97
Tillæa.	160	Typha.	9
Tillandsia.	29	TYPIÆ.	<i>Ibid.</i>

U

Ubium.	Page 21	Urena.	Page 145
Ulex.	184	Urospermum.	90
Ulmus.	212	Urtica.	210
Ulva.	2	URTICÆ.	209
UMBELLIFERÆ.	116	Utricularia.	49
Uniola.	18	Uvularia.	24

V

Vaccinium.	84	Veronica.	49
Valantia.	112	Viburnum.	115
Valeriana.	110	Vicia.	196
Vallisneria.	34	Vinca.	77
Vangueria.	221	Viola.	155
Varronia.	71 et 220	Viscum.	114
Velezia.	160	Visnea.	217
Vella.	133	VITES.	159
Veratrum.	25	Vitex.	55
Verbascum.	67	VITICES.	<i>Ibid.</i>
Verbena.	54	Vitis.	159
Verbesina.	108	Volkameria.	55

W

Wachendorfa.	52	Westeringia.	55
Waltheria.	151	Winterania.	159

X

Xanthium.	211	Ximenesia.	106
Xeranthemum.	96	Xylophylla.	205

Y

Yucca.	24
--------	----

Z

Zacintha.	89	Zizania.	18
Zamia.	6	Ziziphora.	55
Zanichellia.	7	Ziziphus.	202
Zanthorhiza.	126	Zoëgea.	95
Zanthoxylum.	200	Zostera.	7
Zea.	19	Zygophyllum.	154
Zinnia.	108		

Hidden, is all that you can find now
the land is all that you can find



